

AZBANY 250 SC

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



KUJDES

“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

Azbany 250 SC është një fungicid sistemik me aktivitet mbrojtës, terapeutik dhe antisporigjen në një sërë sëmundjesh kërpudhore. Azoksistrobina bën pjesë në grupin e strobilurinave, ka veprim mbrojtës me efekt difuzioni të pjesshëm dhe pengon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit dhe prodhimin e sporeve. Në nivelin biokimik, veprimi i tij konstatohet në kompleksin III të zinxhirit të frymëmarrjes.

Përmbajtja: Azoxystrobin 25% ë/ë

Formulimi: Suspension i koncentruar (SC)

Pamja: Lëng me ngjyrë të bardhë

Fjalë Sinjalizuese:

Shumë toksik për organizmat ujorë, me efekte afatgjata.

- Përmban 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.

- Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

Masat parambrojtëse:

- P101: Nëse është e nevojshme tregojeni mjekut ambalazhin ose etiketën e produktit.
- P102: Mbajeni larg fëmijëve
- Mbajeni larg pijeve dhe ushqimeve për njerezit dhe kafshët.
- P261: Shmangni thithjen e pluhurit, avujve, gazet, spërklart me anë të frymëmarrjes
- P271: Përdoreni vetëm jasht ose në zona të ajrosura mirë.
- H332 I dëmshëm nëse thithet nga rrugët e frymëmarrjes.
- EUH208: Përmban 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -one. Mund të prodhojë reaksion alergjik.
- EUH401: Të evitohen rreziqet e shëndetit të njeriut dhe ambjentit, në përpunueshmëri me instruksionet për përdorim.
- P391: Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- Simptomat e helmimit mund të ndodhin edhe pas 48 orësh pas kontaminimit. Tregoni ambalazhin ose etiketën e produktit mjekut.
 - P304+P340: Nëse thithet nga rrugët e frymëmarrjes, Nxirreni personin në ajër të pastër dhe mbani në pozicion që të marrë frymë lehtësisht.
 - P312: Nëse nuk ndiheni mirë: Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore ose telefononi një mjek ose qendrën e helmimeve
 - P501: Shkatërimi i permbajtjes /shisheve ne perputhje me rregullat në fuqi.
 - Pas thithjes me anë të frymëmarrjes: Nxirreni në ajër të pastër, mbajeni në ngrohtë konsultohuni me mjekun në rast përkeqësimi, Në rast të pavetëdijes mbajeni të dëmtuarin në pozicion të përshtatshëm që të mari frymë lehtësisht.
 - Pas kontaktit me lëkurën: Shplajeni menjëherë me ujë të rrjedhshëm dhe sapun. konsultohuni me mjekun në rast përkeqësimi,
 - Pas kontaktit në sy: Shpëlani sytë me ujë të rrjedhshëm dhe me qepallat e syut hapur. Në rast se simptomat zgjasin atëherë konsultohuni me ndonjë mjek.
 - Pas gjëllitjes: Mos provokoni të vjella, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.
- Nuk ka antidot specifik në dispozicion. Trajtoni simptomatikisht.

Përdorimi:

Përdoret në kulturat si vijon:

Grurë, tritë, tërshërë: për kontrollin e hirit (*Erysiphe (Blumeria) graminis tritici*), ndryshkut (*Puccinia recondita/tritica* dhe *Puccinia hordei*), septoriozës (*Septoria (Leptosphaeria) nodorum* dhe *Septoria*

tritici), *Mycosphaerella graminicola*, *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*, me 0.25 lit l.v/ha në 100-300 lit ujë.

Hardhi (vere dhe tavoline): për kontrollin e hirit (*Uncinula necator*) dhe vrugut (*Plasmopara viticola*), me 0.075- 0.15 lit l.v/ha në 400-1 200 lit ujë.

Kastravec (fushë & serë): për kontrollin e hirit (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fulginea*), me 0.075-0.15 lit l.v/ha në 500-800 lit ujë si dhe të vrugut (*Pseudoperonospora cubensis*), me 0.1-0.2 lit l.v/ha në 500-1 500 lit ujë.

Pjepër, shalqi: për kontrollin e hirit (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fulginea*), me 0.075- 0.15 lit l.v/ha në 500-800 lit ujë si dhe të vrugut (*Pseudoperonospora cubensis*), me 0.1-0.2 lit l.v/ha në 500-1 000 lit ujë.

Domate, spec: për kontrollin e hirit (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.), me 0.1-0.3 lit l.v/ha në 500-1 000 lit ujë, të vrugut (*Pseudoperonospora cubensis*), *Cercospora beticola*, si dhe të alternaries (*Alternaria dauci* sp. *solani*), me 0.1-0.25 lit l.v/ha në 500-1 000 lit ujë.

Panxhar sheqeri: për kontrollin e hirit (*Erysiphe communis*), *Cercospora beticola*, me 0.1-0.2 lit l.v/ha në 400 lit ujë.

Lule shtrydhe: për kontrollin e hirit (*Sphaerotheca humuli*), me 0.2 lit l.v/ha në 500-800 lit ujë.

Karrotë: për kontrollin e ndryshkut (*Puccinia asparagi*), me 0.2-0.25 lit l.v/ha në 300 lit ujë.

Qepë, hudhër: për kontrollin e ndryshkut (*Puccinia allii*) dhe të vrugut (*Peronospora destructor*), me 0.2-0.25 lit l.v/ha në 300 lit ujë.

Mënyra e përgatitjes së solucionit spërkatës:

Mbushni rezervuarin e mjetit spërkatës përgjysmë me ujë. Holloni sasinë e nevojshme të preparatit në një sasi të vogël uji, duke e përzier dhe më pas hidheni tretësirën në enën e spërkatjes. Shtoni pjesën tjetër të ujit, duke e përzier vazhdimisht.

Numri maksimal i aplikimeve për sezon vegjetativ/intervali i ndërhyrjeve:

Gruri, triticalet, tërshëra: 2 aplikime çdo 14-21 ditë; Elbi, thekra: 2 aplikime çdo 10-21 ditë; Fistiku*: 3 aplikime çdo 14-21 ditë

Hardhi (vere dhe tavoline), kastravec (F&S), pjepër (F&S), kungull (F&S), shalqi (F&S), angjinarija 3 aplikime çdo 10 ditë. Domate (S), patëllxhan (S)*, luleshtrydhe (F), karrotë, qepë, hudhër 3 aplikime çdo 7 ditë; Spec (F&S) 2 aplikime çdo 7 ditë; Asparagus 2 aplikime çdo 10 ditë; Panxhar sheqeri 2 aplikime çdo 21 ditë.

Fitotoksiciteti:

Ne dozat dhe bimet e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Vërejtje për përdorimin:

Doza është proporcionale me shkallën e infektimit dhe fazën e rritjes së kulturës. Aplikoni spërkatje me mbulim gjethor dhe në mënyrë parandaluese ose sapo të shfaqen simptomat e para. Siguroni mbulim të mirë dhe depërtim në sipërfaqen gjethre të solucionit spërkatës. Për rezultate më të mira, aplikimi duhet bërë përpara shfaqjes së infeksionit.

Të kryhet një aplikim spërkatje në çdo 3 operatione. - Shmangni aplikimet e njëpasnjëshme. - Të përdoret në spërkatje të alternuara me fungicide me një mënyrë tjetër veprimi. - Përdorni në dozat e rekomanduara për çdo kulturë. - Aplikoni në mënyrë parandaluese dhe në një fazë të hershme të sëmundjes, shmangni aplikimet terapeutike.

Ndikimi në ekosistem:

H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos ndotni ujrat dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e produktit, nëse është e mundur të lihet një brez prej 10-20 m të pa trajtuar. Pak helmues për gjitarët. Mesatarisht helmues për zogjte dhe bletët.

Karenca:

Gruri, triticalet, tërshëra, elbi, thekra 35 ditë; Panxhar sheqeri 30 ditë; Hardhi (vere dhe tavoline) 21 ditë; Qepë, hudhër 14 ditë; Karrotë 10 ditë; Kastravec (fushë & serë), spec, pjepër, shalqi, domate, lule shtrydhe 3 ditë.

Magazinimi:

Ruhet për 3 vjet, në ambalazhimin e tij origjinal, në mjedis të thatë, të freskët dhe të ajrosur mirë.

Nr dhe data e regjistrimit: , datë ;

Sasia neto e PMB-së, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 Lit.

Bar kodi përkatës:;

Data e prodhimit:;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vite;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese: *Printuar nga makineria në amabalazh...*;

Tipi i ambalazhit bazë: Shishe COEX ose HDPE.

Kërkuesi: Nufarm GmbH & Co. KG. Adresa: Linz, Austri;

Prodhuesi: Nufarm S.A.S. Adresa: Gennevilliers Cedex, France.