

BRAI

PRODUKT PER MBROJTEN E BIMEVE



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

Fjale sinjalzuese: RREZIK

Rregullator i rritjes së insekteve. Efektiv kundër breshkezave dhe insekteve me veprim çpues-thithës. Për të shmangur rreziqet për njerëzit dhe mjedisin ndiq udhëzimet për përdorim sipas kesaj etikete.

Klasifikimi i mënyrës së veprimit të substancave aktive sipas IRAC:

GRUPI 7C INSEKTICID

Formulimi: Koncentrat i emulsionueshem (EC)

Përmbajtja: Pyriproxyfen: 10% (100 g/lit).

Deklaratat e rrezikut:

H304-Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

H315- Shkakton irritim të lëkurës.

H317-Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.

H318- Shkakton dëmtime serioze të syve.

H410 - Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Deklaratat e masave paraprake:

P261 Evitoni mjegullën me frymëmarrje.

P264- Lahuni mirë pas trajtimit.

P280 Vishni doreza mbrojtëse, veshje dhe mbrojtje për sytë dhe fytyrën.

P331 Mos nxitni të vjella.

P301+P310 NESE GËLLTITET: Menjëherë telefononi një QENDER HELMIMI ose mjek/mjek.

P302+P352 NËSE MBI LËKURË: Lahuni me shumë sapun dhe ujë.

P305+P351+P338 NËSE NË SY: Shpëllajini me kujdes me ujë për disa minuta. Hiq lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t'u bërë.

P273 - Evitoni çlirimin në mjedis.

P391 - Mblidhni derdhjen.

P391 -Asgjesimi i përmbajtjes/kontenierit në përputhje me rregulloren kombëtare mbi mbetjet e rrezikshme.

Udhëzime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

Kontakti me kete produkt mund te shkaktoj irritim te syve, lëkurës dhe mukozës. Pneumoni te sistemit aspirativ, sensitivitet ne lekure.

Ndihma e parë: Largoni te aksidentuarin nga zona e ndotur. Hiqni rrobat e ndotura me produktin.

Nese bien e sy: lajini sytë me ujë të bollshëm të paktën gjatë 15 minutave. Mos harroni të hiqni lentet e kontaktit nese perdoren. Nëse bie ne lekure: lani zonat e prekura të trupit me ujë dhe sapun të bollshëm, duke shmangur fërkimin e këtyre zonave. Në rast se meret me ingestions, mos i jepni personit asgjë nga goja dhe mos i shkaktoni të vjella. Vendoseni te aksidentuarin në pozicion pushimi. Mbani temperaturën e trupit të nivel optimal. Kontrolloni frymëmarrjen e tij. Nëse është e nevojshme, aplikoni frymëmarrjen artificiale. Nëse personi është i pavetëdijshëm, shtrijeni me kokën më ulët se pjesa tjetër e trupit dhe gjunjët e përkulur. Nëse gjendja rendohet kerkoni ndihme ne nje qender spitalore duke mare me vete edhe produktin.

MOS E LINI VETEM PERSONIN E AKSIDENTUAR NË ASNJË MOMENT.

Këshilla terapeutike për mjekët dhe profesionistët shëndetësorë: Ky produkt nuk ka antidot specifik. Terapia sipas simptomave.

PERDORIMI:

BRAI është një insekticid i grupit IGR, rregullues i rritjes, me veprim kontakti dhe gëlltitje. Produkti vepron gjatë rritjes së insektit, duke penguar proceset natyrore të zhvillimi si metamorfoza, embriogjeneza dhe riprodhimi, e cila çon në eliminimin e parazitit. Produkti ka një qëndrueshmëri të lartë duke siguruar një kontroll afatgjatë të insekteve.

Ne agrume: kundër breshkezes së kuqe (*Aonidiella aurantii*), breshkezes gri (*Parlatoria pergandei*), breshkezes së bardhe të limonave (*Aspidiotus neri*), breshkeza gungore të agrumeve (*Ceroplastes sinensis*), breshkeza në formë presje (*Lepidosaphes beckii*), me 40-50 ml/hl duke përdorur vëllime uji 1000-2250 l/ha (doza maksimale 1,125 l/ha). Ndërhyni midis majit dhe qershorit ose midis gushtit dhe shtatorit, kur shfaqen format e para të larvave, mundësisht të gjeneratës së parë. Kryeni vetëm një trajtim në vit.

Ne domate dhe patllixhan (në serë): kundër krahebardhave (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), me 50-75 ml/hl duke përdorur vëllime uji 1000-1500 l/ha (maks. 0.8 l/ha). Aplikohet kur shfaqen insektet e ritura, duke kryer maksimumi dy trajtime në vit me një interval midis aplikimeve prej 10 ditësh.

Ne peme frutore farore dhe berthamore: kundër breshkezes së Kalifornise San José (*Quadraspidotus perniciosus*), kryeni trajtimin para lulëzimit me 40-50 ml/hl (maksimumi 0,5 l/ha) duke përdorur vëllime uji 700-1000 l/ha. Kryeni vetëm një trajtim në vit.

Ullishte: kundra breshkëzave (*Saissetia oleae*, etj.), Kryhet një trajtim në vit një muaj para lulëzimit, me 25-50 ml/hl, me një volum uji 700-1200 lit/ha.

Vreshtari në trush tavoline ose për verë: kundra breshkëzave (*Planococcus ficus*, *Parthenolecanium corni*, *Pulvinaria vitis*), Kryhet një trajtim në vit duke nderhyre një muaj para lulëzimit, me 50-75 ml/hl (0.25-0.75 lit/ha), me një volum uji 500-1000 lit/ha.

Ne hurma: Kunder krahebardhave dhe breshkezave kryhet një trajtim para lulëzimit me 40-50 ml/100 lit ujë (0,04-0,05%), me një vëllim përzierjeje 700-1000 l/ha pa i kaluar 0,5 lit. produkt/ha.

Ne kultura arore: - bajame, ara, lajthi, geshtenja, pistakio: kryhet një trajtim para lulëzimit me dozë 40-50 ml/100 lit ujë (0,04-0,05%) me 700-1000 l/ha, pa i kaluar 0,5 lit produkt/ha për kontrollin e breshkezave të ndryshme dhe krahebardhave.

Ne pambuk: për kontrollin e krahebardhave kryhet një trajtim i vetëm në sezon përpara se të hapen boçet me një dozë nga 0,5 deri në 0,75 l/ha me një vëllim përzierjeje 1000 l/ha.

Verejtje për përdorimin:

Për të pasur një efikasitet të lartë, kryeni një spërkatje që gjatë gjeneratës së parë në fazat e hershme larvare të insekteve.

Për të shmangur cfaqien e rezistencës mos trajtoni me BRAI ose ndonjë produkt tjetër që përmban pyriproxyfen për më shumë se 1 aplikim në sezon për kontrollin e breshkezave dhe 2 aplikime për krahebardhat.

Fitotoksiciteti:

BRAI nuk rezulton fitotoksik në kulturat bujqesore nëse përdoret sipas udhëzimeve të kësaj etikete.

Nidikimi në ekosistem

Mbuloni kosheret e bleteve gjatë aplikimit për 48 orë pas trajtimit.

SPe3: Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një zonë tampon prej ujërave sipërfaqësorë prej 20 m ose 10 m me sprucator të reduktuar 75% të driftit për agrumet, 25 m ose 15 m me sprucator të reduktuar 75% të spërkatjes në pemët frutore.

SPe8: Për të mbrojtur insektet pjalmuese në domatet në serra, mbuloni kosheret gjatë aplikimit dhe për 48 orë pas trajtimit.

Mos pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujit sipërfaqësor/Evitoni ndotjen nëpërmjet kanaleve kulluese nga fermat dhe rrugët).

Shmangia e rrezikut ndaj operatorëve gjatë trajtimit:

Përdoruesit e produktit duhet të përdorin doreza mbrojtëse kimike gjatë përzierjes/ngarkimit, aplikimit dhe kur rihynë në parcelën e trajtuar. Gjatë aplikimit në agrume dhe domate duhet të përdoren veshje mbrojtëse të tipit 3 ose 4 (të padepertueshme ndaj produkteve të lëngshme) dhe në domate duhet të përdoret edhe një maskë e tipit FFP2. Si gjatë aplikimit ashtu edhe gjatë pastrimit të pajisjeve do të përdoren të njëjtat pajisje mbrojtëse.

Mos hyni në parcele për shërbime derisa produkti të jetë tharë. Lani të gjitha veshjet mbrojtëse pas përdorimit. Ventiloni serrat e trajtuara derisa spërkatja të jetë tharë para se të rihyni.

Paketimet e boshatisura. Shplani fuqishëm tre here çdo shishe të përdorur, duke derdhur shplarjen në rezervuarin e spërkatësit. Përdoruesi është i detyruar të kthejë paketimin bosh dhe mbeturinat në pikat e Sistemit të Integruar të Menaxhimit SIGFITO. Mos e ripërdorni paketimin.

Magazinimi

Ruajeni në një vend të ftohtë, të thatë dhe të ajrosur të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë.

Karenca:

Midis trajtimit të fundit dhe vjeljes, duhet të ketë një minimum kohe prej:

- 3 ditë për patëllxhan dhe domate;
- 30 ditë për agrumet.
- Nuk ka nevojë për një periudhë sigurie për kulturat e tjera të përmendura në këto etikete.

KUJDES: Rekomandimet dhe informacionet e dhëna janë rezultat i kërkimeve dhe testeve të gjera dhe rigorozë. Megjithatë, gate përdorimi shumë faktorë të tjerë janë jashtë kontrollit tonë mund të ndërhyjnë (përgatitja e përzierjeve, aplikimi, meteorologjia etj.). Prodhuesi garanton përbërjen, formulimin dhe përmbajtjen. Përdoruesi është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar (mungesa e efikasitetit, toksiciteti i përgjithshëm, mbetjet, etj.) për shkak të mospërputhjes totale ose të pjesshme me udhëzimet në etiketë.

Numri dhe data e regjistrimit:_____;

Sasinë neto të PMB-së, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri 1 liter;

Numrin e serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;

Data e prodhimit:_____;

Datën e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje:_____;

Llojin e ambalazhit bazë: shishe COEX, HDPE;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Lainco, S.A. **Adresa:** Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona, Spanje;

Emri dhe adresa e kërkuesi: Lainco, S.A. **Adresa:** Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona, Spanje;

Linjat e prodhimit: Lainco, S.A. **Adresa:** Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona, Spanje.