

KATANGA EXPRESS

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



GHS07

GHS09

“Rrezik”

“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

KATANGA EXPRESS është një fungicid sistemik në formë mikro granulare i tretshëm në ujë, efektiviteti i të cilit garantohej edhe nga lëvizshmëria e tij e madhe në bimë. Ai depërton shpejt në indet e bimëve, prandaj nuk paraqet rreziqe që lidhen me larjen dhe shfaq një sistem ngjitjeje dhe zbritjeje që lejon gjithashtu mbrojtjen e gjetheve të formuara pas trajtimit.

GRUPI	P07	FUNGICID
--------------	------------	-----------------

Lënda vepruese: Fosetyl-Al 800 gr/kg (80% w/w).

Formulimi: Granula të tretshme në ujë WG.

Deklaratat e rrezikut:

H317 Ndjeshmëri/Sensitizim-Lëkura. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës;

H410 E rrezikshme për mjedisin ujor-Rreziku Kronik. Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata;

Elementë/informacion shtesë të etiketës për disa përzierje

Deklaratat parandaluese:

P102 Mbajeni larg fëmijëve;

P261 Mos thithni pluhurin/tymin/gazin/mjegullën/avujt/spërkatjen;

P273 Shmangni shkarkimet, derdhjet në mjedis;

P280 Vishni dorashka mbrojtëse/rroba mbrojtëse/mbrojtëse për fytyrën /sytë;

P302+P352 Në rast KONTAKTI ME LËKURËN: lahuni mirë me sapun dhe ujë;

P333+P313 Nëse shfaqet acarim ose skuqje e lëkurës: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore;

P362+P364 Hiqni rrobat e kontaminuar dhe lajini përpara ripërdorimit;

P391 Mblidhni derdhjet;

P501 Shkatërroni përmbajtjen/kontejnerin në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Informacion për mjekun:

Nuk ka raste të njohura të intoksikimit të njerëzimit dhe/ose gjitarëve. Në rast aksidenti ose nëse nuk ndiheni mirë, kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor ose një qendër kontrolli helmimi.

Informacion për ndihmën e parë:

Në rast thithjeje, nxirreni në ajër të pastër dhe nëse është e nevojshme jepni oksigjen ose siguron frymëmarrje artificiale, duke konsultuar menjëherë mjekun tuaj.

Në rast kontakti të zgjatur me lëkurën, lani menjëherë dhe me bollëk me sapun dhe ujë.

Në rast kontakti të zgjatur me sytë, shpëlajeni menjëherë dhe me bollëk me ujë, gjithashtu nën qepallat, për të paktën 15-20 minuta dhe konsultohuni me mjekun. - Në rast të gjellitjes, pini 1 ose 2 gota ujë dhe shmangni nxitjen e të vjellave pa këshillën e mjekut. Mos i jepni asgjë nga goja një personi pa ndjenja.

Terapia: simptomatike

Kujdes:

Në rast urgjence, lajmëroni menjëherë dhe qendrat për trajtimin në rast helmimesh.

Përdorimi:

Agrumet (Portokalli, Limon, Qitro, Lime, Mandarine): kundër *Phytophthora* spp., bëni spërkatje gjethore (maksimumi 3 trajtime në vit), me 250-300 gr/100 lit ujë. Trajtimi i parë duhet të kryhet pranverë në fillim të lulëzimit, i dyti në korrik dhe i treti në tetor/nëntor. Në rastin e bimëve të dobësuar nga sëmundja, aparati gjethor i të cilave nuk është më në gjendje të përthithë produktin mirë, këshillohet që të integrohen

aplikimet gjethore me “brushing” të të njëjtit solucion (250-300 gr/100 lit) tek të infektuarit ne zonat e trungut dhe të degëve.

Rrush per vere dhe tavoline: kundër *Plasmopara viticola*, kryeni maksimumi 4 trajtime në vit, me 250-300 gr/100 lit ujë. Filloni ndërhyrjet në paralulëzimin dhe vazhdoni ato në intervale 10-14 ditë në varësi të kushteve klimatike dhe presionit të patogjenit.

Peme frutore: kundër *Phytophthora spp.*, kryeni maksimumi 3 trajtime në vit, me 250-300 gr/100 lit ujë. Kryeni trajtimin e parë në prill, të dytin në korrik dhe të tretin në shtator/tetor.

Luleshtrydhe (fushë+sera): kunder *Phytophthora cactorum*, me 250 gr/100 lit uje.

Domate (fushë+sera): kunder vrugut (*Phytophthora infestans*), me 250-300 gr/100 lit uje.

Kastravec: kunder vrugut (*Pseudoperonospora cubensis*), me 250-300 gr/100 lit uje.

Pjeper, shalqin dhe kungullore: kunder vrugut (*Pseudoperonospora cubensis*), me 250-300 gr/100 lit uje.

Marule, sallate jeshile: kunder vrugut (*Bremia latucae*), me 200-300 gr/100 lit uje.

Ne bimet zbukuruese: kunder vrugut (*Phytophthora spp.*), me 250 gr/100 lit uje.

Karenca:

Trajtimi i fundit para vjeljes: Kastravec (f+s), kungull i njome (f+s), pjeper dhe shalqin (f+s) 3 dite; Lule shtrydhe (f+s) me zhytjen e rrenjeve dhe ne lule 0 dite; Lule shtrydhe (f+s) dhe domate (f+s) 14 dite; Agrume dhe peme frutore 15 dite; Rrush per vere dhe tryeze 28 dite.

Ndikimi në ekosistem:

EUH401: Për te shmangur risqet ndaj shëndetit njerëzor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet për përdorimin.

Ruajtja dhe magazinimi:

Ruajeni te mbyllur ne ambalazhin origjinal, ne ambient te thate, te ventiluar mire dhe sigurojeni nga rreziku i zjarrit.

Numri dhe data e regjistrimit:_____;

Sasinë neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 1 kg;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;

Data e prodhimit:_____;

Data e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: 3 vjet;

Iloji i ambalazhit bazë: Material 3-shtresor për mbrojtjen nga lagështia;

Emri dhe adresa e kërkuarit: Proplan Plant Protection Company SLU. **Adresa:** C/Valle del Roncal 12. Oficina 7. 28232- Las Rozas, Madrid, Spanjë;

Emri dhe adresa e prodhuesit: PROPLAN Plant Protection Company SLU. **Adresa:** C/Valle del Roncal 12. Oficina 7. 28232- Las Rozas, Madrid, Spanjë.