

TROJAN

Produkt per mbrojtjen e bimeve

Insekticid sistemik për kontrollin e specieve kryesore të afideve dhe krahebardhave ne kultura te ndryshme bujqesore si (agrumë, mollë, dardhë, pjeshkë, kumbull, domate, pjeper, kastravec, shalqi, kungull dhe kungulleshke (ne fushe te hapur dhe ne sera)). Flonicamidi eshte perberes aktiv i cili deperton shpejt ne bimet e trajtuara. Ai ka veprim translaminar i cili ofron mbrojtje uniforme te bimes. Mekanizmi i veprimit IRAC 29.

Lënda vepruese: FLONICAMID 50 % (500 gr/kg)

Formulimi: Granula të tretshme në ujë (WG)



KUJDES

DEKLARATAT E RREZIKUT:

H319 - Shkakton irritim serioz te syve.

H412 - I dëmshëm për organizmat ujorë me efekte afatgjata.

DEKLARATA PARAMBROJTESE:

P102 - Mbajeni larg arritjes nga femijet.

P264 - Lani duart, parakrahët dhe fytyrën tërësisht pas përdorimit.

P270 - Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni produktin.

P273 - Mos e derdhni në mjedis.

P280 - Vishni doreza dhe veshje mbrojtëse. Mbroni sytë dhe fytyrën tuaj.

P305+P351+P338 - Ne rast kontakti me syte: shpëljajeni tërësisht për disa minuta. Hiqni çdo lente kontakti nëse është e lehtë për ta bërë këtë. Vazhdoni shpëlarjen. P337+P313 Nëse acarimi i syve vazhdon, merrni këshilla/vëmendje mjekësore.

P401 - Mbajeni larg ushqimit, ushqimit te kafsheve dhe pijeve.

P501- Hidhni produktin/kontenierin në përputhje me rregulloret aktuale kombëtare.

EUH208 - Përmban malat natriumi (371-47-1). Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.

EUH401 - Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

UDHEZIME PER NDIHMEN E PARE

Në rast helmimi, thirrni mjekun për ndihmën e parë të zakonshme.

PERDORIMI:

Ne agrumë: Kundër afideve (*Aphis citricola*), (*Aphis gossypii*), (*Myzus persicae*), morrit te agrumeve (*Toxoptera aurantii*), aplikohet në fillim të infektimit, përgjithësisht në fillim të pranverës kur shfaqen lastarët e parë. Perdoret në një dozë 0,1 Kg/ha, të shpërndara me vëllime uji 1000-2000 L ujë për ha që i përgjigjen 5-10 g/hl. Përsëritni trajtimet (maksimumi 2 në vit) 14 ditë më vonë.

Mollë dhe dardhë: Kundër afideve të mollës (*Dysaphis plantaginea*) dhe (*Aphis pomi*) dhe afideve të dardhës (*Dysaphis pyri*), aplikohet kur shfaqet infektimi, përgjithësisht në fillim të pranverës kur zhvillohen lastarët e parë, në dozën 0,12-0,14 kg/ha. Përdorni vëllime uji prej 200-1000 L/ha. Rekomandohet përdorimi i dozës më të lartë (0.14 kg/ha) për kontrollin e afideve gri te mollës. Përsëritni trajtimet (maksimumi 3 në vit) cdo 14-21 ditë.

Pjeshkë dhe kumbull: Kundër afideve (*Myzus persicae*), (*Brachycaudus helichrysi*) dhe afideve mielllore të kumbullës (*Hyalopterus pruni*), aplikohet kur shfaqet infektimi, përgjithësisht në fillim të pranverës kur zhvillohen lastarët e parë, në një dozë prej 0,12-0,14 kg/ha në varësi të ashpërsisë së sulmit; për infektimet fillestare përdorni dozën më të ulët. Përdorni vëllime uji prej 200-1000 L/ha. Përsëritni trajtimet (maksimumi 2 në vit) 14-21 ditë larg.

Domate (në fushë dhe në serë): Kundër afideve (*Myzus persicae* dhe *Aphis gossypii*), aplikohet kur shfaqet infektimi (veçanërisht në serra kur më shumë se 5% e gjetheve janë të infektuara nga një ose më shumë individë), në një dozë prej 0,1-0,12 kg/ha. Përdorni vëllime uji prej 400-1000 L/ha në varësi të zhvillimit të bimësisë. Përsëritni trajtimet (maksimumi 3 në vit) 7-14 ditë larg.

Kungullore (pjepër, kastravec, tranguj, shalqi, kungull) si në fushë ashtu edhe në serë: kundër afideve (*Aphis gossypii*) në një dozë prej 0.1 kg/ha. Përdorni vëllime uji prej 400-1000 L/ha në varësi të zhvillimit të bimësisë. Përsëritni trajtimet (maksimumi 3 në vit) 7-14 ditë larg.

Në perime (domate dhe kunguj): produkti mund të aplikohet edhe nëpërmjet sistemit të ujitjes me pika kunder krahebardhes (*Trialeurodes vaporariorum* dhe *Bemisia tabaci*). Pasi tretet në pak ujë, futet në sistemin e ujitjes dhe më pas shpërndahet në tokë. Tretësira duhet të përgatitet menjëherë përpara trajtimit dhe të aplikohet në fund të ciklit të ujitjes. Rekomandohet të kryhen 2 trajtime me dozë 0,2 kg/ha në interval 10-14 ditë.

VEREJTJE PER PERDORIMIN:

Mos bëni më shumë se 3 aplikime në vit. Nëse Trojan përdoret për të kontrolluar krahebardhen duke përdorur sistemin e ujitjes me pika (maksimumi 2 aplikime), rekomandohet të kryhet vetëm një trajtim me spërkatje me gjethe (kontrolli i afideve) në mënyrë që të mos tejkalohen 3 aplikimet totale në vit. Kujdes: kur përzihet me formulime të tjera, duhet të respektohen rregullat paraprake të përshkruara për produktet më toksike.

FITOTOKSICITETI:

Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas dozave të rekomanduara.

NDIKIMI NE MJEDIS:

Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni materialin e aplikimit pranë ujit sipërfaqësor. Mesatarisht toksike për bletët. Për të mbrojtur bletët dhe pjalmuesit e tjerë, mos e aplikoni gjatë fazës së lulëzimit. Në serë: për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos e përdorni produktin ku bletët janë në aktivitet.

KARENCA:

Ndaloni trajtimet 3 ditë para vjeljes për domaten, pjepërin, kastravecin, shalqinin, kungullin dhe kungulleshken; 14 ditë në pjeshkë; 21 ditë në mollë dhe dardhë, 35 ditë në kumbulla, 60 ditë në agrume.

MAGAZINIMI:

Ruani në ambalazh origjinal, në vende të thata, të ajrosura dhe të pa ekspozuara nga drita e diellit.

Nr dhe data e regjistrimit:

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 0,01 - 5 Kg

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesëve të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: shishe plastike HDPE; qese 3-shtresore alumini.

Emri dhe adresa e Aplikantit: Sharda Cropchem España S.L. Adresa: Qendra e Biznesit Edificio Atalayas, Carril Condomina nº3, Kati 2 - 30006 Murcia, Spanjë.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se:

1. Solfotecnica Italiana S.p.A. Adresa: Via Giacomo Matteotti, 16 – 48123 Ravenna, Italy
2. Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd. Adresa: Economic Development Zone, Boxing County, Shandong Province, 256500, Kina

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë): SHEGAJ AGR shpk. Adresa: Dobrac, Shkoder.

