

ZORVEC ENTECTA

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“Rrezik”

“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

ZORVEC ENTECTA është fungicid sistemik parandalues, për kontrollin e vrugut në kulturat e patates, domates dhe patëllxhanit.

Përmbajtja: *Oxathiapiproline 48 g/lit+Amisulbrom; 240 g/Lit.*

Formulimi: *Suspo-emulsion (SE).*

Pamja: *Lëng me ngjyrë kafe.*

Masat parambrojtëse:

Evitoni kontaktin e produktit me lëkurën dhe sytë;

Gjatë punës mos hani dhe mos pini lëngje e duhan;

Para fillimit të punës vishni rrobat e punës dhe paisjet mbrojtëse për sytë dhe fytyrën;

Lani duart dhe pjesët e ekspozuara të lëkurës me ujë dhe sapun;

Pas përfundimit të punës lani të gjitha paisjet.

Rrezik

H 351-Dyshohet për shkaktimin e kancerit;

H 410-Shumë toksik për mjedisin ujor me efekte afatgjata;

R201-Duhet të lexoni udhëzimet për përdorim përpara përdorimit;

P280-Përdorni doreza mbrojtëse/rroba mbrojtës/mbrojtje për sytë/mbrojtje për fytyrën;

P308+P313-Në rast ekspozimi ose shqetësimi, kërkoni këshilla/vëzhgim mjekësor;

P391-Mblidhni derdhjet.

P501-Hidhni përmbajtjen/ambalazhin në përputhje me rregulloret lokale dhe kombëtare.

EUH401: Respektoni udhëzimet për përdorim për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

SPo2-Pas aplikimit të produktit për mbrojtjen e bimëve, lani rrobat mbrojtëse.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Në rast marrje me organet e frymëmarrjes, nxireni të dëmtuarin në ajër të pastër. Kërkoni ndihmë mjekësore;

Në rast kontakti me lëkurën, hiqni rrobat e ndotura, lani menjëherë pjesët e kontaminuara me ujë të bollshëm dhe sapun. Kërkoni ndihmë mjekësore nëse irritimi i lëkurës vazhdon;

Në rast kontakti me sytë, shplajini ata me ujë të bollshëm. Konsultojuni me mjekun;

Në rast se produkti është gëlltitur, mos shkaktoni të vjella. Shpëlani menjëherë gojën. Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore;

Mund të sjellë rrezik për pneumoni aspiruese. Trajtimi Trajtoni në mënyrë simptomatike. Në rast të gëlltitjes duhet të bëhet lavazh stomaku merren parasysh në rastet e gëlltitjeve të konsiderueshme vetëm brenda 2 orëve të para. Megjithatë, përdorimi i qymyrit aktiv dhe sulfat natriumi është gjithmonë i këshillueshëm. Nuk ka antidot specific.

Përdorimi:

ZORVEC ENTECTA është një fungicid parandalues për kontrollin e vrugut (*Phytophthora infestans*) në patate, domate dhe patëllxhan. Aplikohet kur patatja është në fazën e lastarit të parë të dukshëm (< 5 cm) deri në fazën kur bimët janë në lulëzimin e parë, dhe ne domate dhe patëllxhan kur janë në fazën nga kërcelli i parë i dukshëm deri në pjekjen e plotë: frutat kanë një ngjyrë tipike të pjekurisë (fazat 21-89 të shkallës BBCH).

Numri trajtimve gjatë një sezoni: patate 4 trajtime, në domate dhe patëllxhan 3 trajtime. Përsëriteni trajtimin nëse infeksioni vazhdon. Intervali midis trajtimeve duhet të jetë minimumi 7 ditë.

Përdoret me 0,25 lit/ha (2,5 ml/10 m²), ne 200-1000 lit/ha (2-6 lit/100 m²) solucion. Aplikohet nga gjethet.

Shmangia e rezistences:

Përdorimi i përsëritur i të njëjtave produkte për të kontrolluar patogjenët e veçantë të bimëve mund të çojë në izolimin e sforcimeve rezistente të kërpudhave dhe të rezultojë në një rënie në efektshmërinë e kontrollit të vrugut.

Mënyra e veprimit të oxathiapiprolinës i përket grupit FRAC me kodin 49. Oxathiapiprolinën frenon një nga proteinat që lidhen me oksisterolin.

Midis proceseve të tjera, proteinat që lidhin oksisterolin janë të përfshira në lëvizjen e lipideve midis membranave qelizore. Frenimi i proteinave që lidhen me oksisterolin mund të prishë procese të tjera në qelizën kërpudhore, si sinjalizimi, forcimi i membranave qelizore dhe formimi i lipideve më komplekse që janë të rëndësishme për mbijetesën e qelizës patogjene.

Amisulbrom, është një fungicid quinone dhe i përket grupit inhibitor intrinsic quinone. Ky grup kimik konsiderohet një me rrezik të mesëm deri të lartë për zhvillimin e rezistencës.

Një program i kontrollit të sëmundjeve që përfshin kombinimin dhe/ose përzierjen me fungicide të tjera që kanë mënyra të ndryshme veprimi është thelbësor për të zvogëluar rrezikun e rezistencës së patogjenit.

Vërejtje për përdorimin:

Thahet shpejt në gjethë dhe nëse bie shi 20 min pas trajtimit, agjenti nuk do të lahet nga gjethet.

Fitotoksiciteti:

Nëse produkti përdoret në sasi të përcaktuara dhe në mënyrën e përcaktuar në etikete, nuk është fitotoksik për kulturat për të cilat është aprovuar.

Ndikimi në ekosistem:

SPe3-Për mbrojtjen e organizmave ujorë, duhet të respektohen zonat e sigurisë prej 20 m nga sipërfaqja e ujit. Për organizmat ujorë: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata. Parandaloni hyrjen e produktit në ujë (rrjedha ujore, liqene, puse, burime uji dhe furnizimi me ujë) dhe në rrjetin e ujërave të zeza.

Për ujera: Gjatë trajtimit, duhet të respektohen zonat mbrojtëse të ujit dhe të parandalohet ndotja e ujërave sipërfaqësore (rrjedha ujore, liqene), sistemet e kullimit, sistemet e hapura të kullimit ose vendet ku është e mundur të derdhet shiu nga sipërfaqet e trajtuara në ujërat sipërfaqësore, duke trajtuar të paktën 20 m larg tyre. SP1-Parandalimi i ndotjes së ujit nga produktet e mbrojtjes së bimëve ose ambalazhit të tij. Mos i pastroni pajisjet mbrojtëse të bimëve pranë ujërave sipërfaqësore. Parandaloni ndotjen e kanaleve kulluese nga zonat bujqësore dhe rrugët.

Karenca:

7 ditë për patatën dhe 3 ditë për domatën.

Ruajtja dhe magazinimi:

Ruhet në ambalazh origjinal e të mbyllura mirë, në një vend të thatë me ajrosje të mirë, dhe jo në rrezet direkte të diellit, në temperatura 0°C deri 30°C.

Numri dhe data e regjistrimit:_____;

Sasia neto e PMB-së, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 lit;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;

Data e prodhimit:_____;

Data e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: 2 vjet;

Lloji i ambalazhit bazë: Material COEX/PA ose HDPE/EVOH;

Emri dhe adresa e Kërkuesit: Corteva Agriscience International Sàrl. **Adresa:** Versoix, Zvicër;

Emri dhe adresa e Prodhuesit: Corteva Agriscience International Sàrl. **Adresa:** Versoix, Zvicër.