

SACRON 45 WG

FUNGICID ME VEPRIM ANTIPERONOSPORIK
NË GRANULA TË DISPEGUESHME NE UJË PËR PËRDORIM PROFESIONAL



GHS 07 GHS08 GHS09
Fjalë sinjalizuese (CLP) : Kujdes

MEKANIZMI I VEPRIMIT:

GRUPI	27	FUNGICID
-------	----	----------

PËRMBAJTJA:

100 gram produkt përmban:

- CIMOXANIL i pastër 45 g
- Bashkëformuluesit q.s. në 100 g

Deklaratat e rrezikut (CLP) :

H302 - I dëmshëm nëse gëlltitet.

H361fd - Dyshohet për dëmtim të fertilitetit. Dyshohet për dëmtim të fetusit.

H373 - Mund të shkaktojë dëmtime në organe (sy, gjak, timus) nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.

H410 - Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata.

Deklaratat e masave paraprake (CLP) :

P201 - Merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit.

P202 - Mos e përdorni derisa të keni lexuar dhe kuptuar të gjitha masat paraprake të sigurisë.

P260 - Mos thithni pluhur/tym/gaz/mjegull/avuj/spërkatje.

P264 - Lani duart, parakrahët dhe fytyrën tërësisht pas trajtimit.

P270 - Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.

P273 - Mos e lëshoni në mjedis.

P280 - Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje për sytë/mbrojtje për fytyrën/mbrojtje për dëgjimin.

P301+P312 NËSE GËLLITET: Telefononi QENDRËN/MJEKEN E HELMIMIT nëse nuk ndiheni mirë.

P308+P313 - NËSE ekspozoheni ose shqetësoheni: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.

P314 - Merrni këshilla/vëmendje mjekësore nëse nuk ndiheni mirë.

P330 - Shpëlajeni gojën.

P391-Mblidhni derdhjet. P405-ruajeni te mbyllur.

P501- Asgjësoni përmbajtjen/kontenierin në përputhje me rregulloret lokale.

Shprehjet EHU:

EUH401 - Për të evituar rreziqet ndaj shëndetit të njeriut dhe mjedisit, veproni në përputhje me udhëzimet e përdorimit.

EUH208 - Përmban cymoxanil (ISO), Maleic acid, potassium salt. Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

KUJDES SHITESË: Mos ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni materialin e aplikimit pranë ujit sipërfaqësor. Shmangni ndotjen e sistemeve të kullimit të fermave dhe rrugëve. Vishni doreza dhe tuta/veshje pune gjatë përzierjes/ngarkimit të produktit dhe fazave të aplikimit. Mos rihyni në zonën e trajtuar derisa bimësia të jetë tharë plotësisht. Mos kryeni operacione manual në kulturat e trajtuara derisa të kenë kaluar të paktën dy ditë nga aplikimi i fundit. INFORMACION PËR MJEKUN: Produkti përmban Cimoxanil (derivat ure). Terapia: Simptomatike. Paralajmërim: Telefononi QENDRËN E HELMIMIT.

KARAKTERISTIKAT: SACRON 45 WG është një fungicid, në granula të dispergueshme në ujë me një përqendrim të lartë Cimoxanili, i karakterizuar nga aktivitete citotropike dhe translaminare, veçanërisht efektiv kundër në luftimin e vrugjeve të gjinive *Phytophthora*, *Peronospora*, *Pseudoperonospora* e *Bremia* në hardhi, domate, kukurbitace, patate dhe kulturat tjera. SACRON 45 WG ka veprim parandalues, kurativ dhe eradikant (duke qenë në gjendje të kontrollojë infeksionet tashmë në zhvillim) me një qëndrueshmëri veprimi 4-5 ditë në varësi të kushteve klimatike që ndodhin pas aplikimit dhe gjendjes fenologjike dhe zhvillimore të kulturave. Këshillohet gjithmonë aplikimi i SACRON 45 WG i përzier me produkte kontakti dhe/ose endoterapeutike me mekanizma dhe mënyra të ndryshme veprimi. Kmbinimi me BORDOLEZ DISPERS ose OPTIX-R DISPERS është prioritar.

PERDORIMI

NE VESHTARI

Kundër vrugut (*Plasmopara viticola*): përdorni 270 g/ha në një vëllim uji midis 200 dhe 1000 L/ha në varësi të gjendjes vegetative të kulturës. SACRON 45 WG mund të aplikohet nga faza e 3-4 gjetheve të vërteta deri në ngjyrim, duke ndërhyrë me një qasje parandaluese dhe duke respektuar një interval ndërmjet trajtimeve prej 7-10 ditësh. Numri maksimal i trajtimeve/vit: 4.

Në rrushin e verës SACRON 45 WG nuk ka efekte të padëshiruara në proceset e prodhimit të verës dhe nuk ndryshon vetitë organoleptike të verës.

NE DOMATE, KUNGULLORE

Kundër vrugut (*Phytophthora*, *Pseudoperonospora*): përdorni 220 g/ha në një vëllim uji midis 200 dhe 1000 L/ha në varësi të gjendjes vegetative të kulturës. SACRON 45 WG mund të aplikohet nga faza e 3-4 gjetheve të vërteta deri në pjekjen e frutave, duke respektuar një interval ndërmjet trajtimeve prej 7-10 ditësh. Numri maksimal i trajtimeve/ciklit të mbjelljes: 5.

Në kultura të tjera si duhan, spinaq, qepe, sallatë për luftimin e vrugut me 0.05% pr j me pake se 250 gr/ha

NE PATATE

Kundër vrugut (*Phytophthora infestans*): përdorni 270 g/ha në një vëllim uji ndërmjet 200 dhe 1000 L/ha në varësi të gjendjes vegetative të kulturës. SACRON 45 WG mund të aplikohet që nga shfaqja infeksioneve të para, duke respektuar një interval ndërmjet trajtimeve prej 7-10 ditësh.

Numri maksimal i trajtimeve/vit: 6.

VEREJTJE PER PERDORIMN :

Përgatitja e përzierjes: Hdhjet SACRON 45 WG direkt në fuçinë e mbushur $\frac{3}{4}$ me ujë, duke e mbajtur peraieresi aktiv; pastaj shtoni sasinë e mbetur të ujit të kërkuar për përdorim. Në zonat ku uji ka fortësi të ulët, rekomandohet përdorimi i agjentëve kundër shkumës.

Shamngi e rezistences: Për të shmangur ose vonuar fillimin e rezistencës, SACRON 45 WG duhet të përdoret gjithmonë si masë parandaluese. Gjithashtu rekomandohet gjithmonë përdorimi i tij në përzierje ose në alternim me produkte që kanë një mekanizëm të ndryshëm veprimi, siç tregohet në etiketë. Mos e tejkaloni numrin maksimal të aplikimeve të treguara.

Perzierja me produkte tjera: SACRON 45 WG është fizikisht i përputhshëm me produktet e mbrojtjes së bimëve që përmbajnë mancozeb, maneb, metiram, folpet dhe me përzierjet Bordeaux me origjinë UPL Europe Ltd., në përqendrimet e rekomanduara për përdorim. Paralajmërim: Gjatë përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karences. Duhet të respektohen gjithashtu masat paraprake të përshkruara për produktet më toksike. Në rast helmimi, informoni mjekun tuaj për përzierjen e kryer.

Ndikimi ne ekosistem:

Nuk eshte demtues ndaj bleteve. Eshte demtues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore.

Magazinimi: Ruhet ne vende te thata, te ajrosura, te erreta, ne ambalazhin origjinal dhe ne temperature 5 -45⁰ C.

Karenca:

Ne rrush vere dhe tavoline: 28 ditë

Domte per industri: 10 ditë

Domate tavoline, Kungullore: 3 ditë

Patate: 7 ditë

Nr. Regjistrimit :

Data e prodhimit :

Afati i ruajtjes :

Loti :

Aplikanti: UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A 4818 CP Breda, The Netherlands

Sasia neto e PMB-së, në ambalazhin bazë: 50 gr, 100 gr, 250 gr ,500 gr, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

Emri dhe adresa e distributorit: AGROHELP SHPK, L.Nr.1, Rr. A. Durrsaku, Nr. 1076, Durres, Albania

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (nese ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise) :.....

Prodhuesi : UPL EUROPE Ltd, The Engine Rooms, 1st floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, United Kingdom Stabilimenti i prodhimit:

- Solfotecnica Italiana S.p.A, Via Evangelista Torricelli, 2 24801, Cotignola (Ra), Italia

- CEREXAGRI S.A.S. – Mourenx, Plateforme Chem’Pole 64 – Avenue du Lac, 64150 Mourenx (Francia);

- UPL Europe Ltd., Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire, CW11 3QQ (Gran Bretagna);
- Cerexagri, 14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens (Francia);
- Cerexagri, 8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet (Francia)
- Superform Chemistries Limited (UPL group)., 117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, (India),
- Superform Chemistries Limited (UPL group), 3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002 (India);
- UPL Ltd., 3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002 (India);
- Superform Chemistries Limited (UPL group)., 3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat (India);
- Superform Chemistries Limited (UPL group), Plot No 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat (India);
- Cerexagri, Arysta LifeScience Ougrée Production sprl, Rue de Rénory, 26/2 , B-4102 Ougrée (Belgio).
- Arysta LifeScience SAS (UPL group), Route d'Artix B.P. 80 64150 Nogueres (Francia)
- Laoting Yoloo Bio-Technology Co.Ltd, No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development Zone, plant in Hebei, China
- UPL Ltd. (UPL group), Plot No. D/2/CH/150, G.I.D.C., Dahej-II, Bharuch, Gujarat, India
- UPL Ltd. (UPL group), 3210 3201/A, G.I.D.C., Ankleshwar, Bharuch - 393002, Gujarat India
- Superform Chemistries Limited (UPL group) S.No.225, Village-Gopipura, Tal: Halol, Dist. – Panchmahal, Gujarat, India
- UPL Ltd. (UPL group) Industrial Growth Centre, Samba, Jammu, (J& K) 184121, India
- Superform Chemistries Limited (UPL group) Durgachak, Haldia, Dist. Midnapore - 721 602, West Bengal, India
- M/S ARYSTA LIFESCIENCE INDIA LIMITED, 50 A, G.I.D.C., Kalol, Survey No.317-318, Kankarna Muvada, Derol Dist., Panchmahal-389320, Gujarat, India
- Superform Chemistries Limited (UPL group), UNIT-12 , PLOT NO. :- 3/6 ,GIDC-111 , VILLAGE : KADODARA ,TA. VAGRA , DIST :- BHARUCH ,(GUJRAT)-392165, India
- M/s Optima Farm Solutions Limited, Industrial Growth Centre, Samba, Jammu, India
- M/S ARYSTA LIFESCIENCE INDIA LIMITED, EOU Unit-II, SURVEY NO. 229-330, KALOL NOTIFIED AREA, DEROL-KALOL, DIST.- PANCHMAHAL – 389330, India
- M/s UPL Limited, 1457 Eastland Avenue, Kingstree, SC 29556, United States of America
- M/s UPL Limited, CÔNG TY TNHH UPL VIỆT NAM,ĐƯỜNG AMATA, KCN LONG BÌNH (AMATA), Public PHƯỜNG LONG BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM MST: 3600807993, Vietnam