

VITIPEC WG ADVANCE

“Produkt per mbrojtjen e bimeve”



“Lexo fletëudhësuesin para përdorimit”

“Lexo fletudhësuesin para përdorimit”

Fungicid me veprim translaminar dhe kontakti për luftimin e vrugut ne vreshta,perime dhe patate.

Lenda vepruese: Cymoxanil 8 % + Folpet 66%

Formulimi:: granula të dispergueshme në ujë (WG)

Deklaratat e rrezikut:

H317-Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës;

H319 -Shkakton acarim serioz të syve;

H332 -E dëmshme nëse thithet;

H351 -Dyshohet se mund te shkaktoje kancer;

H361fd -Dyshohet për dëmtim të fertilitetit. Dyshohet për dëmtim të fëmijës së palindur;

H410 -Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata;

EUH401- Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

Deklarata parandaluese:

P101 -Nëse kërkohet këshilla mjeksore atëhere tregoni etiketën e produktit mjekut.

P102 - Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa arriteshme nga femijet.

P260 -Shmangni frymemarjen e aerosolit

P201 -Merrni udhëzime te vecanta përpara përdorimit.

P270 - Gjate perdorimit te tij mos hani e mos pini uje dhe duhan.

P280- Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.

P337+P313- Nese vazhdon iritimi i syrit kerkoni ndihmen e mjekut.

P312 - Ne rast helmimi lajmeroni qendren shendetesore me te afert dhe i tregoni mjekut etiketen

P362+P364 - Hiqni rrobat e kontaminuara dhe lajini përpara ripërdorimit.

P391 - Mblidhni dhe pastroni derdhjet.

P501 - Mblidhni amballazhet ne kontejnere dhe beni shkaterimin e tyre sipas regullave ne fuqi.

SP1- Mos ndotni ujin dhe burimet ujore me produktin ose amballazhin e tij

Mos pastroni materialet dhe mjetet e trajtimit pranë ujrave sipërfaqësore.

Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.

SPe3: Për të mbrojtur organizmat ujorë, mbani një zonë tampon të pa spërkatur 20 metra, prej te cilave 20 m eshte nje zone bimore mbrojtese per aplikime te hershme.

Për të mbrojtur artropodët jo të synuar, mbani një zonë tampon 20 m të pa spërkatur.

Gjatë operacioneve të përzierjes/ngarkimit dhe gjatë aplikimit, vishni veshje mbrojtëse dhe doreza nitrili.

Për aplikime manuale vishni një maskë gjysmë-fytyre me filtër P3 për operacionet e përzierjes dhe ngarkimit dhe sperkatjes.

Kthehuni në zonën e trajtuar duke veshur doreza nitrili dhe pantallona të gjera. Mos rihyni në zonat e trajtuara përpara se bimësia të jetë tharë plotësisht.

KARAKTERISTIKAT

VITIPEC® WG ADVANCE është një fungicid depërtues, me veprim parandalues, kurues dhe antisorulues ndaj mykut të derit të hardhisë, patateve.

dhe domate

VITIPEC WG ADVANCE është një fungicid në granula të shpërndara në ujë me veprim parandalues, kurues dhe antisorulues kundër vrugut të hardhisë,patates dhe domateve.

VITIPEC WG ADVANCE është një përzierje e dy përbërësve aktivë: Cymoxanil që ka veprim të shpejtë dhe efekt bllokues dhe Folpet me aktivitet parandalues. Formulimi i veçantë në granula të shpërndara në ujë garanton lehtësinë maksimale të përdorimit dhe sigurinë për operatorin, pasi produkti nuk prodhon pluhur gjatë operacioneve të përgatitjes së tretësirës së pesticideve.

Dozat dhe mënyra e përdorimit

Dozat e treguara i referohen trajtimeve me pajisje me volum normal. Në rastin e trajtimeve me volum të ulët doza duhet të modifikohet siç duhet, në mënyrë që të administrohet e njëjta sasi produkti për njësi të sipërfaqes.

-Rrush per vere,tavoline si dhe hardhitë mëmë dhe fidanishtet e hardhisë : kundër vrugut (*Plasmopara viticola*) dhe eskoriozes (*Phomopsis Viticola*), aplikohet VITIPEC WG ADVANCE në dozë 1,5 kg/ha, e holluar në 100-1000 litra ujë; të fillojë ndërhyrjet kur kultura të ketë arritur në fazën vegetative në të cilën fillon rreziku i infeksioneve dhe të kryhen deri në 2 aplikime në vit cdo 7-10 ditë.

-Ne perimet solanore dhe kungullore (spec, domate, patellxhan, kungull, pjeper, kastravec, etj.): Per kontrollin e vrugjeve, alternarieve me 150 gr/100 lit uje (1.5 kg/ha), duke perdorur 600-1000 lit/ha solucion.

-Ne patate: Per kontrollin e vrugut, alternaries, me 150 gr/100 lit uje, duke perdorur 300-1000 lit/ha solucion.

-Ne sallate: Per kontrollin e vrugut (Bremia lactuca), me 150 gr/100 lit uje, duke perdorur 600-1000 lit/ha solucion. Kryhen deri tre trajtime/sezon, me interval 10-15 dite.

Menaxhimi i rezistences:

Produkti duhet të aplikohet paraprakisht. Këshillohet që përdorimi i VITIPEC WG ADVANCE të alternohet me produkte me mekanizma të ndryshëm veprimi.

Karenca:7 ditë në patate dhe domate ne fushe; 14 ditë në bimët e domates në serë,21 dite per perime e tjera,42 ditë në hardhi për prodhimin e verës dhe 28 dite per ate te tavolines.

PARALAJMËRIM: Të përdoret ekskluzivisht për përdorimet dhe kushtet e treguara në këtë etiketë. Kushdo që përdor produktin është përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga përdorimi jo i duhur i preparatit. Pajtueshmëria me të gjitha udhëzimet e përfshira në këtë etiketë është një kusht thelbësor për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të shmangur dëmtimin e bimëve, njerëzve dhe kafshëve.

Fitotoksiciteti:

Ne dozat dhe bimët e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Magazিনি:

Ruhet ne vende te thata, te ajrosura, te erreta, ne ambalazhin origjinal, ne temperatura deri 40° C.

Nr dhe data e regjistrimit:..... , datë..... ;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 15 kg.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit bazë: Material tre shtresor, i pa përshkueshem nga lagështia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: Ascenza Agro, SA Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias

2910-440 Setúbal - Portugal

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: Ascenza Agro, SA, Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal - Portugal

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet në Republikën e Shqipërisë): .