

BORDOFLOW NEW®

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



Përbërja: **10 % baker metalik** (ne formën e pastës bordoleze)
Formulimi: **Koncentrat i Suspensueshëm (SC)**

DEKLARATA TE RREZIKUT: Shumë toksike për organizmat ujorë me efekte afatgjata. Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

KËSHILLA PARANDALUESE: Vishni doreza dhe veshje mbrojtëse. Mblidhni materialin e derdhur. Hidhni produktin/kontenierin në përputhje me rregulloret kombëtare.

INFORMACIONE SHITESË: Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni materialin e aplikimit pranë ujrave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.

Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një zonë sigurie të patrajtuar nga trupat ujorë sipërfaqësorë të:

- 5 metra, duke përdorur sprucatorë që zvogëlojnë lëvizjen me 75% ose 20 metra për aplikime në kivi, pemë frutore (aplikime të vonshme)
- 5 metra për aplikime në hardhi (aplikime të hershme), perime me fruta, patate, perime gjethore, me bulba ose perime me rrënjë, bishtajore, lule dhe dekorative;
- 10 metra duke përdorur sprucatorë që reduktojnë lëvizjen me 75% ose 20 m për aplikime në ullinj dhe agrume;
- 20 metra duke përdorur sprucatorë që reduktojnë lëvizjen me 75% për aplikim në bimë zbukuruese dhe fruta me lëvozhgë (aplikime të hershme).

INFORMACION PËR MJEKUN

Simptomat: denatyrim i proteinave me leziona në nivel mukozale, dëmtime të mëlçisë, veshkave dhe SNQ, hemolizë. Të vjella me emetim të materialit të gjelbër, urth gastroezofageal, diarre të përgjakshme, dhimbje barku, verdhëz hemolitik, dështim të mëlçisë dhe veshkave, konvulsione, kolaps. Ethe nga thithja e metaleve. Iritues i lëkurës dhe syve.

TERAPIA: gastroluzi me tretësirë lakto-albumine, nëse kupremi të lartë përdorin kelatorë, penicilaminë nëse rruga orale është e realizueshme ose CaEDTA intravenoze dhe BAL intramuskular; përndryshe terapi simptomatike. Paralajmërim: Konsultohuni me Qendrën e Kontrollit të Helmimeve.

KARAKTERISTIKAT

BORDOFLOW NEW është një fungicid në suspension të lëngshëm i bazuar në përzierjen e pastës bordoleze, me veprim parandalues dhe me efektivitet dhe qëndrueshmëri të dukshme. Shkalla e lartë e mikronizimit të grimcave të bakrit siguron mbulim homogjen dhe uniform të vegjetacionit të trajtuar edhe në dozat më të ulëta. Formulimi i pastës së rrjedhshme garanton ngjitje dhe rezistencë të lartë ndaj shpëlarjes, e kombinuar me dozimin praktik dhe sigurinë për operatorin

MENYRA E PËRDORIMIT

Hidhni dozën e përshkruar direkt në ujë. Nëse përdoren spërkatës me volum të ulët, dozat e përshkruara duhet të rriten proporcionalisht në mënyrë që të shpërndahet e njëjta sasi produkti për njësi të sipërfaqes.

FUSHAT E PËRDORIMIT DHE DOZA

BORDOFLOW NEW duhet të përdoret duke ndjekur kalendarët normale të kontrollit në varësi të kushteve të temperaturës dhe lagështisë (në rastin e një sezoni veçanërisht me shi, duhet të përdoren doza më të mëdha, duke zvogëluar intervalin kohor midis një trajtimi dhe një tjetër). Dozat e treguara i referohen trajtimeve me vëllim normal (800-1000 l/ha në hardhi, pemë frutore, lule dhe bimë zbukuruese; 400-800 l/ha për kulturat barishtore dhe hortikulturë). Në rast të përdorimit të vëllimeve më të ulëta se ato të treguara (p.sh. fillimi i sezonit në kulturat e pemëve), sugjerohet përdorimi i dozës/hl.

Kultura	SEMUNDJET	Koha e Përdorimit	Doza e Përdorimit	Doza/ha	N° maks i trajtimeve në sezon	Intervali mes trajtimeve (ditë)
Bërthamore (Mollë, dardhë, ftua, etj.)	Kroma (<i>Venturia inaequalis</i>) Kanceri i degëve (<i>Nectria galligena</i>), Bakteriozat	Nga fundi i lulëzimit deri në vjeljen paraprake	200-500 ml/hl	2,0-5 L	6	
		Nga fundi i vjeljes deri në hapjen e sythave të luleve.	800-1200 ml/hl	8,0-12,0 L	4	15
PEME FRUTORE (Pjeshka, kajsi, Nektarina, Qersh, Kumbull) Vetem Pjeshka, nektarina, Kajsi për trajtimet pas lulëzimit	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>), Corineo (<i>Coryneum sp.</i>)	Nga fundi i vjeljes deri në hapjen e sythave.	800-1200 ml/hl	8,0-12,0 L	4	15
	Bakterioza	Pas lulëzimit deri në vjelje	200-300 ml/hl	2,0-3,0 L	6	-
VITE	Vrugu (<i>Plasmopara viticola</i>)	Pas lulëzimit deri në vjelje	300-800 ml/hl	3,0-8,0 L	8	7
OLIVO	Syri i palloit (<i>Spilocaea oleagina</i>)	Trajtimet nga fundi i dimrit deri në fillim të pjekjes, si edhe pas vjeljes	750-1000 ml/hl	7,5-10,0 L	4	20
Karçof	Vrugu (<i>Bremia spp.</i>)	Kur verifikohen kushte të favorshme për sëmundjen	500-750ml/hl	4,0-6,0 L	4	7
ASPARAG	Stemfiliosi (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Ndërhyni pasi të jenë mbledhur boçet.	400-750ml/hl	3,2-6,0 L	4	12
AGRUME (Portokall, Limon, Mandarina, etj.)	Gomoza (<i>Phytophthora citricola</i>)	Trajtimet duke filluar nga fundi i dimrit	800-1000 ml/hl	8,0-10,0 L	4	8
Kiwi	Bakterioza (<i>Pseudomonas spp.</i>)	Trajtime me rënien e gjetheve dhe dimërore	800-1000 ml/hl	8,0-10,0 L	4	15
		Pas lulëzimit deri në vjelje	300-400 ml/hl	3,0-4,0 L	8	
Arrë, Lajthi, fruta të tjerë me lëvozhgë	Bakterioza (<i>Xanthomonas spp. arboricola pv. corylina.</i>)	Trajtimet vjeshtë-dimër	800-1000 ml/hl	8,0-10,0 L	4	10
Sallata, Perime gjethore të ndryshme në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Bremia lactucae</i>), Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>), Bakterioza	Kur verifikohen kushte të favorshme për sëmundjen	400-750 ml/hl	3,2-6,0 L	6	7-8
Lakra (Lakra, brokoli, lulelakër)	Vrugu (<i>Phytophthora brassicae</i>), Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i>)		500-750 ml/hl	4,0-6,0 L	4	
KUNGULLORE (kastravec, kungull, pjepër, shalqi, etj.) në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Vrugu cubensis</i>)		400-750 ml/hl	3,2-6,0 L	6	7
Domate, Patëllxhan në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Phytophthora spp.</i>), Alternaria (<i>Alternaria porri</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)		500-750 ml/hl	4,0-6,0 L	8	7
PATATE	Vrugu (<i>Phytophthora infestans</i>), Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)		500-750 ml/hl	4,0-6,0 L	8	7-8
PERIME ME RRENJE (karrotë, panxhar i kuq, rrepë, selino, majdanoz, çikore, etj.)	Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>), Cercosporiosi (<i>Cercospora spp.</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)		400-750 ml/hl	3,2-6,0 L	6	7-8

BISHTAJORE	Antraknoza e bizeles (<i>Ascochyta pisi</i>), Vrugu (<i>Phytophthora phaseoli-pisi</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>), Ndryshku (<i>Uromyces spp.</i>)	400-750 ml/hl	3,2-6,0 L	4	7
PERIME ME BULBA (hudhër, qepë, qepujka, etj.)	Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>), Vrugu (<i>Vrugu destructor</i>)	400-750 ml/hl	3,2-6,0 L	6	7
Lule dhe Bimë dekorative në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Vrugu spp.</i>), Kalbja (<i>Monilia spp.</i>), Bakterioza (<i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Xanthomonas spp.</i>)	400-750 ml/hl	3,2-6,0 L	6	7
Pemë dekorative		800-1000 ml/hl	8,0-10,0 L	6	10

Për të minimizuar akumulimin e mundshëm të tokës dhe ekspozimin ndaj organizmave jo të synuar, duke marrë parasysh kushtet agro klimatike, mos e tejkaloni aplikimin total prej 28 kg bakër për hektar gjatë 7 viteve. Rekomandohet respektimi i sasisë mesatare të aplikuar prej 4 kg bakër për hektar në vit.

PAJTUESHMËRIA: Produkti mund të përziehet me sqfur te lagshem dhe koloidal.

Kujdes: Kur përziehet me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karencës. Për më tepër, duhet të respektohen rregullat paraprake të përshkruara për produktet më toksike. Nëse ndodhin raste helmimi, informoni mjekun për përzierjen e kryer.

FITOTOKSICITETI – Nuk duhet të trajtohet gjatë lulëzimit. Në disa pemë frutore dhe në varietetet e mollës (*) dhe dardhës () të ndjeshme ndaj bakrit, produkti mund të jetë fitotoksik nëse shpërndahet në bimësi të plotë; në raste të tilla nuk rekomandohet përdorimi i tij në vegjetacion të plotë.**

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avanches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Pezulloni trajtimet 3 ditë para vjeljes për domatet e konsumit të freskëta, patëllxhanët, patatet, perimet me bulba, kungujt me fara; 7 ditë për bishtajore, angjinare, kungullore me lëvore të pangrënshme, perime me rrënjë, marule dhe sallata të tjera dhe perime të tjera me gjethe, bërthamore (pas lulëzimit), hardhi; 10 ditë për domatet industriale; 14 ditë për lakër (brokoli, lulëlakër), ullinj; 20 ditë për agrumet, kiwi; 21 ditë për pjeshkë, nektarinë dhe kajsi.

KUJDES

Për t'u përdorur ekskluzivisht për përdorimet dhe kushtet e treguara në këtë etiketë.

Kushdo që përdor produktin është përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga përdorimi jo i duhur i preparatit.

Pajtuëshmëria me të gjitha udhëzimet e përfshira në këtë etiketë është një kusht thelbësor për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të shmangur dëmtimin e bimëve, njerëzve dhe kafshëve.

Mos aplikoni me aeroplan

Mos ndotni kultura të tjera, ushqime dhe pije ose ujëra sipërfaqësorë.

Përdoreni në mungesë të erës.

Të mos shitet e hapur

Ambalazhi i boshatisur nuk duhet të hidhet në mjedis

Ambalazhi nuk mund të riperdohet

Nr dhe data e regjistrimit: xxxxxx

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 100 ml deri 20 lit.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: shishe PET, COEX ose HDPE.

Emri dhe adresa e Aplikantit: MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Emri dhe adresa e Distributorit në Shqipëri: **AGROBLEND GROUP, 1032 Vore, Tirana, Shqipëri. www.agroblend.com,**

email : info@agroblend.com tel : +355682055831, +355682055832, +355682055836

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë):