

CUPRA®

PRODUKT PER MBROJTEN E BIMEVE

FUNGICID ME BAZE BAKRI NE FORMENE OKSIKLORURIT NE FORMULIM TE SUSPENSIOIT TE KONCENTRUAR

LEXONI ME KUJDES ETIKETËN PARA SE TË PËRDORNI KËTË PRODUKT.

PËR TË SHMANGUR RREZIQET PËR NJERËZIT DHE
MJEDISI NDIQ UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Mekanizmi i veptimit FRAC M1

Formulimi : Suspension i koncentruar (SC)
Përmbajtja : Baker metalik: 520 g/L

Fjale sinjalizuese:
KUJDES



Deklaratat e rrezikut :

H410 - Shumë toksik për organizmat ujore me efekte afatgjata.

Deklaratat e masave paraprake :

P261- Evitoni frymemarjen mbi avujt dhe mjegullen sperkatese. P264-Lani me kujdes duart me uje dhe sapun pas punes. P270- Mos hani, pini dhe tymosni duhan gjate punes. P391- Grumbulloni mbetjet.

P501 – Asgjeroni mbetjet/enet e ndotura në përputhje me rregulloret mbi mbetjet e rrezikshme

Informacion shtesë për rrezikun: EUH401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, respektoni udhëzimet për përdorim.

Udhëzime për ndihmen e pare dhe keshilla për mjekun

INFORMACION PËR MJEKUN

Simptomat: denatyrim i proteinave me leziona mukozale, dëmtime të mëlçisë, veshkave dhe SNQ, hemolizë. Të vjella me emetim të materialit të gjelbër, djegie gastroezofageale, diarre të përgjakshme, dhimbje barku, verdhëz hemolitik, dështim të mëlçisë dhe veshkave, konvulsione, kolaps. Ethet e thithjes së metaleve. Iritues i lëkurës dhe syve.

Terapia: gastroliza me tretësirë laktalbumine, nëse koperemia jepet kelator me përdorim të lartë, penicilaminë nëse rruga orale është e realizueshme ose CaEDTA intravenoze dhe BAL intramuskulare; përndryshe terapi simptomatike. Paralajmërim: Konsultohuni me Qendrën e Kontrollit të Helmimeve.

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME: CUPRA është një produkt suspensioni i koncentruar me bazë bakri në formën e oksiklorurit për kontrollin e sëmundjeve të ndryshme keqpurdhore.

DOZAT DHE MËNYRA E PËRDORIMIT

Ne ullishte : Per kontrollin e *Syrit te Palloit* dhe *Tuberkulozit (Pseudomonas spp.)* kryhet nje trajtim dimeror me 0.3% dhe dy trajtime pranverore me 0.25% (2.4-3 lit/ha) te alternuara me SYLLIT 400 SC.

Ne Vreshta : (Per vere dhe tavoline) : kunder *Vrugut*, *Antraknozes (Elsinoe ampelina)*, *Eskoriozes*, *Bakteriozes(Xanthomonas spp.)* dhe semundjeve te tjera qe dimerojne ne pjesen drunore, kryhet nje trajtim dimeror sapo jane fryre sythat dhe 2 trajtime pas lulezimit me 0.3% (0.25% ne rrushin e tavoline) (1.8-3 lit/ha).

Ne agrume : kunder *Fitoftores (Phytophthora spp.)* ne trajtimet dimerore kryhet nje trajtim me 0.1% (1.8-3 lit/ha).

Ne molle, dardhe dhe farore te tjera : Per kontrollin e *Kromes*, *Tharjes se degeve (Nectria galligena)* *Bakteriozes (Pseudomonas spp)* Rekomandohet nje trajtim pas vjeljes dhe nje trajtim i dyte dimeror para fryrjes se sythave me doze 0.3% (1.8-3 lit/ha).

Ne Pjeshke, Nektarina, Kajsi dhe brthamore te tjera : Kunder *Tafrinias*, *Coryneumit*, *Cytorpores*, *Polistigmes* dhe *Bakteriozes(Pseudomonas spp.)* me doze 0.25%-0.3% (2-3 lit/ha) kryhet nje trajtim me fillimin e renies se gjetheve dhe nje para fryrjes se sythave.

Ne kumbull, qersh: Kunder *Taphrina deformans*, *Coryneumit*, *Monlies*, *Venturia carpophilla*, *Polystigma* dhe *Baktriozes (Pseudomonas spp)* me doze 0.25%-0.3% (2-3 lit/ha), kryhet nje trajtim me fillimin e renies se gjetheve dhe nje para fryrjes se sythave.

Ne bajame : Kunder *Tafrinias*, *Coryneumit(flete birueses)*, *Monilies*, *Venturia carpophila* me doze 0.25%-0.3% (2-3 lit/ha) kryhet nje trajtim me fillimin e renies se gjetheve dhe nje me fryrjen e sythave.

Ne lajthi, ara, geshtenja : Kunder *Moniles* dhe *Bakteriozave* me doze 0.25%-0.3% (2-3 lit/ha) kryhet nje trajtim me fillimin e renies se gjetheve dhe nje para celjes se sythave.

Ne domate dhe Patllixhan ne sera dhe fushe : Kunde *Vrugut (Phytophthora spp.)*, *Sptoriozes*, *Alternariozes* duke fillua nga fazat e para te zhvillimit bimor dhe deri 3 dite para vjeljes me doze 0.25%- 0.3% (1.8-2.4 lit/ha)

Ne Sallate dhe frut gjethore te tjera : Kunder *Pronosporës (Bremia Lactuca)*, *Antraknozes*, *Alternaries* doze 0.25%- 0.3% (1.5-2.4 lit/ha) me konstatimin e shenjave te para te infeksionit.

Ne Patate : Kunder *Vrugut*, *Septoriozes*, *Alternaries*, *Antraknozes* me 0.3% (1.5-3 lit/ha) duke filluar nga fazat e para te zhvillimit bimor e deri ne vjelje.

Ne Spinaq: Kunder *Alternaries*, *Vrugut (Peronospora farinosa)* dhe *Bakteriozave*, duke fillua nga fazat e para te zhvillimit bimor dhe deri 3 dite para vjeljes me doze 0.25%- 0.3% (1.8-2.4 lit/ha)

Ne bime ornamentale dhe shkure : Kundr semundeve te ndryshme kepurdhore dhe bakteriale si *Peronospora spp.*, *Antaknoza*, *Koltotrikum*, *Septoria sp.*, *Ndryshqet*, *Kormat (Venturi sp.)* e te tjera me doze 0.25%- 0.3% gjate vegjetacionit.

Verejtje per perdorimin :

Kompatibilitet : Është ***i papajtueshëm*** me produktet që përmbajnë merkur, polisulfid, acid hidrocianik ose përbërës aktivë me reaksione të forta acide ose alkaline. Në rast të përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohen rregullat paraprake të përshkruara për produktet më toksike si dhe të respektohet periudha me e gjatë e karesës dhe masat paraprake për shendetin për produktin më toksik.

KUFIZIMET SHITESË: Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një zonë sigurie të patrajtuar sipërfaqësorë :

Ne ullinj dhe agrume prej 25 metrash nga basenet ujore ose një reduktim të materialit të sperkates prej 95%; Në vresht 14 metra ose një reduktim prej 90%; Ne pemefe frutore 25 metra ose një reduktim prej 98%; Në domatet për konsum dhe patëllxhanët (fushë dhe serë), patatet, marulet dhe sallatat, (fushë dhe serë) 3 metra ose një reduktim të materialit të sperkates 75%. Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos pastroni materialet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësor. Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit nga fermat dhe rrugët. Shpëlani depozitën e zbrazët të paktën 3 herë pas përdorimit.

Nidikimi ne ekosistem

Për të minimizuar akumulimin e mundshëm në tokë dhe ekspozimin ndaj organizmave jo të synuar, duke marrë parasysh kushtet agro-klimatike, nuk duhet të tejkalohet një aplikim kumulativ prej 28 kg bakër për hektar gjatë një periudhe 7-vjeçare. Rekomandohet respektimi i sasisë mesatare të aplikuar prej 4 kg bakër për hektar në vit.

Magazinimi

Ruhet në vende të fresketa, të thatë dhe të ajrosur të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë dhe larg aritjes prej të miturve.

Karenca: 3 ditë para vjeljes në domatet e tryezës dhe patëllxhanët. 10 ditë për domate për industri; 15 ditë në hardhi (verë dhe tavolinë), ullinj, marule dhe sallata (fushë e hapur), patate, agrume. Në frutat farore dhe berthamore pezulloni trajtimet përpara lulëzimit.

Numri dhe data e regjistrimit: _____;

Sasinë neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri 5 liter

Numrin e serisë ose shenja të tjera identifikuese: _____;

Data e prodhimit: _____;

Datën e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: _____;

Llojin e ambalazhit bazë: COEX, HDPE

Emri dhe adresa e prodhuesit: LAINCO, S.A. Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona SPANJE

Emri dhe adresa e kërkuesit: LAINCO, S.A. Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona SPANJE

Linjat e prodhimit: LAINCO, S.A. Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona SPANJE