

IDROX 25 WG

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

Fungicid për përdorim ne bujqesi me bazë hidroksid bakri
Mekanizmi i veprimit:: FRAC M1



“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

Lënda vepruese: bakër metalik 250gr/kg (në formë hidroksid bakri)

Formulimi: Granula të tretshme në ujë (WG)

DEKLARATA TE RREZIKUT:

H302 E dëmshme nëse gëlltitet.

H319 Shkakton acarim serioz të syve.

H410 Shumë toksike për organizmat ujorë me efekte afatgjata.

Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

DEKLARATA PARANDALUESE:

P270 Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.

P280 Përdorni mbrojtje për sytë/fytyrën.

P301+P312 NËSE GËLLITET: Telefononi QENDRËN/MJEKEN E HELMIMIT nëse nuk ndiheni mirë.

P305+P351+338 NËSE NË SY: Shpëljani me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni çdo lente kontakti që mbani nëse është e përshtatshme ose e lehtë për ta bërë këtë. Vazhdoni shpëlarjen.

P337+P313 Nëse acarimi i syve vazhdon: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.

P391 Mblidhni derdhjet. P501 Hidhni përmbajtjen/kontejnerin në përputhje me rregulloret lokale të mbetjeve të rrezikshme.

EUH401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, respektoni udhëzimet për përdorim.

INFORMACIONE SHITESË: Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni materialin e aplikimit pranë ujrave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.

Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një zonë sigurie të patrajtuar nga trupat ujorë sipërfaqësorë të:

- 5 metra, duke përdorur sprucatorë që zvogëlojnë lëvizjen me 75% ose 20 metra për aplikime në kivi, pemë frutore (aplikime të vonshme)
- 5 metra për aplikime në hardhi (aplikime të hershme), perime me fruta, patate, perime gjethore, me bulba ose perime me rrënjë, bishtajore, lule dhe dekorative;
- 10 metra duke përdorur sprucatorë që reduktojnë lëvizjen me 75% ose 20 m për aplikime në ullinj dhe agrume;
- 20 metra duke përdorur sprucatorë që reduktojnë lëvizjen me 75% për aplikim në bimë zbukuruese dhe fruta me lëvozhgë (aplikime të hershme).

INFORMACION PËR MJEKUN

Simptomat: denatyrim i proteinave me lezime në nivel mukozale, dëmtime të mëlçisë, veshkave dhe SNQ, hemolizë. Të vjella me emetim të materialit të gjelbër, urth gastroezofageal, diarre të përgjakshme, dhimbje barku, verdhëz hemolitik, dështim të mëlçisë dhe veshkave, konvulsione, kolaps. Ethe nga thithja e metaleve. Iritues i lëkurës dhe syve.

TERAPIA: gastroluzi me tretësirë lakto-albumine, nëse kupremi të lartë përdorin kelatorë, penicilaminë nëse rruga orale është e realizueshme ose CaEDTA intravenoze dhe BAL intramuskular; përndryshe terapi simptomatike.

Paralajmërim: Konsultohuni me Qendrën e Kontrollit të Helmimeve.

KARAKTERISTIKAT

IDROX 25 WG është një fungicid në granula të shpërndara në ujë me bazë hidroksid bakri me veprim parandalues, me efikasitet, aktivitet, qëndrueshmëri dhe rezistencë të dukshme ndaj kullimit. Hidroksidi i bakrit siguron një disponueshmëri të shpejtë të joneve të bakrit, ideale në periudhat e presionit më të madh të sëmundjes ku nevojiten formulime me veprim të shpejtë.

Formulimi tipik Manica garanton suspenzibilitet të shkëlqyeshëm, shpërndarje dhe lagështueshmëri të përshtatshme për t'u siguruar një mbulim homogjen dhe uniform i bimësisë në kohën e trajtimeve.

MENYRA E PËRDORIMIT

Hidhni dozën e përshkruar direkt në ujë. Nëse përdoren spërkatës me volum të ulët, dozat e përshkruara duhet të rriten proporcionalisht në mënyrë që të shpërndahet e njëjta sasi produkti për njësi të sipërfaqes.

FUSHAT E PËRDORIMIT DHE DOZA

Dozat e treguara i referohen trajtimeve me volum normal (500-1000 L/ha për hardhitë dhe pemët frutore; 200-1000 L/ha për kulturat barishtore dhe perimore, 1000-2000 L/ha për agrumet). Nëse përdorni vëllime më të larta ose më të ulëta se ato të treguara, përdorni dozat/hL për të respektuar dozën e treguar për hektar.

Kultura	Sëmundjet	Periudhat e përdorimit	Dozat g/hL (për aplikim)	Dozat kg/ha (për aplikim) Duke marrë parasysh një vëllim uji të barabartë me 1000l/ha	Maks. numri i trajtimeve në vit	Intervali ndërmjet trajtimeve (ditë)
BERTHAMORE (mollë, dardhë, ftua,)	Kanceri i degëve (<i>Nectria galligena</i>)	Trajtimet e vjeshtës/dimrit dhe para-lulëzimit	280-400 g/hL	2,8-4,0 kg	4	7-21
HARDHI	Vrugu (<i>Plasmopara viticola</i>)	kur ndodhin kushte të favorshme për sëmundjen	200-270 g/hL	2,0-2,65 kg	6	7-14
ULLINJ	Syri i palloit (<i>Spilocaea oleagina</i>); Bakterioza (<i>Pseudomonas savastanoi</i>),	kur ndodhin kushte të favorshme për sëmundjen	300-400 g/hL	3,0-4,0 kg	4	14-30
Agrumet (portokall, qitro, limon, lime, mandarine, etj.)	Gomoza (<i>Phytophthora citricola</i>)	kur ndodhin kushte të favorshme për sëmundjen	320-400 g/hL	3,2-4,0 kg	4	7-14
KUNGULLORE (kastravec, tranguj, kungull i njomë,) në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	kur ndodhin kushte të favorshme për sëmundjen	200-400 g/hL	2,0-4,0 kg	4	7-14
PATATE	Vrugu (<i>Phytophthora infestans</i>)	kur ndodhin kushte të favorshme për sëmundjen	200-400 g/hL	2,0-4,0 kg	4	7-14
PERIME ME BULBA (hudhër, qepë, qepë, qepujka)	Vrugu (<i>Peronospora destructor</i>)	kur ndodhin kushte të favorshme për sëmundjen	280-400 g/hL	2,8-4,0 Kg	4	7-14

PËRGATITJA E PËRZIERJES: Hidhni produktin në rezervuarin e spërkatës të mbushur pjesërisht me ujë dhe duke e mbajtur masën të trazuar, sillni në vëllimin e dëshiruar. IDROX 25 WG duhet të përdoret sipas kalendarëve normalë të kontrollit të dëmtuesve në varësi të kushteve të temperaturës dhe lagështisë (në rastin e një sezoni veçanërisht me shi, dozat më të larta duhet të përdoren në intervalin më të shkurtër kohor).

PAJTUESHMËRIA: Produkti mund të përziehet me sqfur të lagshëm dhe koloidal.

Kujdes: Kur përziehet me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karencës. Për më tepër, duhet të respektohen rregullat paraprake të përshkruara për produktet më toksike. Nëse ndodhin raste helmimi, informoni mjekun për përzierjen e kryer.

FITOTOKSICITETI – Nuk duhet të trajtohet gjatë lulëzimit. Në disa pemë frutore dhe në varietetet e mollës (*) dhe dardhës () të ndjeshme ndaj bakrit, produkti mund të jetë fitotoksik nëse shpërndahet në bimësi të plotë; në raste të tilla nuk rekomandohet përdorimi i tij në vegjetacion të plotë.**

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avanches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Pezulloni trajtimet 3 ditë para vjeljes për domatet e konsumit të freskëta, patëllxhanët, patatet, perimet me bulba, kungujt me fara; 7 ditë për bishtajore, angjinare, kungullore me lëvore të pangrënshme, perime me rrënjë, marule dhe sallata të tjera dhe perime të tjera me gjethe, bërthamore (pas lulëzimit), hardhi; 10 ditë për domatet industriale; 14 ditë për lakër (brokoli, lulëlakër), ullinj; 20 ditë për agrumet, kiwi; 21 ditë për pjeshkë, nektarinë dhe kajsi.

KUJDES

Për t'u përdorur ekskluzivisht për përdorimet dhe kushtet e treguara në këtë etiketë.

Kushdo që përdor produktin është përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga përdorimi jo i duhur i preparatit.

Pajtureshmëria me të gjitha udhëzimet e përfshira në këtë etiketë është një kusht thelbësor për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të shmangur dëmtimin e bimëve, njerëzve dhe kafshëve.

Mos aplikoni me aeroplan

Mos ndotni kultura të tjera, ushqime dhe pije ose ujëra sipërfaqësorë.

Përdoreni në mungesë të erës.
Të mos shitet e hapur
Ambalazhi i boshatisur nuk duhet të hidhet në mjedis
Ambalazhi nuk mund të riperdohet

Nr dhe data e regjistrimit: xxxxxx

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 50 gr deri 10 kg.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesëve të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise së mallit (serise) ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: qese alumini me 3 shtresore, të papershkueshme nga lageshtia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Emri dhe adresa e Distributorit në Shqipëri: **AGROBLEND GROUP, 1032 Vore, Tirana, Shqipëri. www.agroblend.com,**

email : info@agroblend.com tel : +355682055831, +355682055832, +355682055836

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë):