

MANAMID® 100 SC

FUNGICID PER KONTROLLIN E VRUGUT DHE FITOFTORES NE PATATE, DOMATE DHE HARDHI

Lënda vepruese: *Cyazofamid i pastër: 9.5 g (= 100 g/L) (lëndë mbyshëse deri në 100 g*
Formulimi: *Koncentrat i Suspensueshëm (SC)*

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



GHS09
KUJDES!

“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

EUH 401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, zbatoni udhëzimet për përdorim.

EUH208: Përmban 1,2-benzisothiazolin-3-one. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.

H410: Shumë toksik për gjallesat ujore duke shkaktuar efekte të dëmshme afatgjata.

P102 Mbajeni larg fëmijëve.

P270 Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.

P273 Shmangni lëshimin në mjedis

P391 Mblidhni derdhjet.

P333+P313 Në rast acarimi ose dëmtimi të lëkurës, telefononi një mjek.

P401 Ruajeni larg ushqimit ose ushqimit dhe pijeve.

P501 Asgjeroni përmbajtjen/kontenierin në përputhje me rregulloret lokale/rajonale/ kombëtare/ ndërkombëtare

Udhëzime për ndihmën e parë: Në rast helmimi, kontaktoni me një doktor për ndihmën e shpejte të zakonshme.

KARAKTERISTIKA:

MANAMID® 100 SC është një fungicid me veprim parandalues që përdoret kundër *Plasmopara viticola* dhe *Phytophthora infestans* në rrush, domate dhe patate. Ka një afinitet shumë të lartë për dyllin kutikular, me një kapacitet të moderuar të penetrimit; kjo rezulton në rezistencë ndaj shpëlarjes nga shiu dhe rishpërndarje të pjesshme brenda vegjetacionit të trajtuar. Përshtatni frekuencën e trajtimeve sipas tendencave meteorologjike dhe presionit të sëmundjes.

Përdorimi:

Hardhi: Për kontrollin e vrugut (*Plasmopara viticola*), përdoret me dozë 0.9-1.1 L/ha (vëllim uji 300-1000L). Aplikoni para lulëzimit deri në pjekje, faza: BBCH 11-89. Aplikohen deri 4 trajtime/sezon, në intervale 8-10 ditore (12-14 ditë nëse përdoret doza maksimale). Mos trajtoni gjatë kohës së lulëzimit.

Domate (në sera dhe fushë të hapur): Për kontrollin e vrugut (*Phytophthora infestans*), përdoret me dozë 0.8L/ha (vëllim uji 400-1000 L). Aplikoni para lulëzimit deri në pjekje, faza: BBCH 12-89. Mund të bëhen deri 6 trajtime/sezon, në intervale 7-10 ditore.

Patate: Për kontrollin e vrugut (*Phytophthora infestans*), përdoret me dozë 0.8L/ha (vëllim uji 200-500L). me 80ml/100 lit ujë (0.8l/ha). Aplikoni gjatë zhvillimit të gjetheve deri para vjeljes, faza: BBCH 12-89. Mund të bëhen deri 6 trajtime/sezon, në intervale 5-7 ditore (10 ditore nëse risk i ulët).

PËRGATITJA E PËRZIERJES

Holloni dozën e përshkruar direkt në ujë. Nëse përdoren spërkatës me volum të ulët, dozat e përshkruara duhet të mbahen në mënyrë që të shpërndahet e njëjta sasi produkti për njësi sipërfaqe.

PAJTUESHMERIA

Produkti është testuar dhe rezulton i pajtueshëm me sa vijon:

Fungicide: azoxistrobin, benalaxil m, cimoxanil, dimetomorph, folpet, fosetil alumin, disodik fosfonate, K fosfonate, mancozeb, metalaxil-m, metiram, penconazol, bakër, squfur

Insekticide: abamektine, deltametrine, imidacloprid, lambda-cialotrine.

Menaxhimi i rezistencës:

Manamid 100 SC përmban Cyazofamid, substancë që i përket grupit Frac 21. Për të shmangur çdo rezistencë në terren, përdorni masat e mëposhtme: aplikoni produktin në mënyrë parandaluese, përzieni atë me produkte me të njëjtin objektiv, por mekanizëm veprimi të ndryshëm dhe përdorni atë në një program së bashku me produkte të tjera me mekanizma të ndryshëm veprimi

Karenca:

3 ditë per domaten (serë dhe fushë e hapur); 7 ditë pataten; 21 ditë per rrushin.

Ruajtja dhe magazinimi:

Mbajeni në kontainerët origjinalë, të mbyllur në vende të thata dhe të ajrosura, larg rrezeve të diellit. Evitoni përdorimin e presionit të lartë të ujit (rrezik ndotje).

Regjistruesi

MANICA S.p.A. Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) – Telefon: 0464-433705

FABRIKA E PRODHIMIT

MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Regjistrimi në Ministrinë e Shëndetësisë: Nr. 16950, datë 16/01/2020

PESHA NETO: ml 100, 200, 250, 500; litra 1, 2, 5, 10

Numri i serisë:

Numri i regjistrimit: