

OSSICLOR® 35 WG

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

Fungicid për përdorim ne bujqesi për kontrollin e sëmundjeve të ndryshme në kultura të ndryshme

Mekanizmi i veprimit:: FRAC M1



“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

Lënda vepruese: bakër metalik 350gr/kg (në formë oksiklorur bakri)

Formulimi: Granula të tretshme në ujë (WG)

DEKLARATA TE RREZIKUT:

H410 Shumë toksike për organizmat ujorë me efekte afatgjata.

Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

DEKLARATA PARANDALUESE:

P102 Mbajeni larg fëmijëve.

P260 Mos thithni pluhurin ose spërkatjet.

P270 Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.

P273 Mos e lëshoni në mjedis.

P284 Në rast të ventilimit të pamjaftueshëm, vishni mbrojtje të frymëmarrjes.

P391 Mblidhni derdhjen.

P501 Hidhni përmbajtjen/enën në përputhje me rregulloret lokale për mbetjet e rrezikshme. P270 Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.

EUH401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, respektoni udhëzimet për përdorim.

UDHEZIME SHITESË: Mos e ndotni ujin me produktin ose kontenitorin e tij. Mos i pastroni pajisjet e spërkatjes pranë ujrrave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit të ujit nga toka bujqësore dhe rrugët. Për mbrojtjen e zogjve: doza maksimale gjatë sezonit të shumimit 4.5 kg bakër/ha.

Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një zonë sigurie të patrajtuar nga trupat ujorë sipërfaqësorë të:

Hardhi - 10 m zonë tampon të patrajtuar;

Pemë frutore farore dhe bërthamore (Aplikime fillestare) - 20 m zonë tampon e patrajtuar plus reduktim i sprucatorëve (75%);

Pemë frutore farore dhe bërthamore (Aplikime të vonshme) - 20 m zonë tampon e patrajtuar ose 10 m plus reduktim i i sprucatorëve (50%);

Agrume, ullinj - 20 m zonë tampon e patrajtuar ose 10 m plus reduktim i sprucatorëve (75%);

Arrore - 20 m zonë tampon e patrajtuar plus reduktim i sprucatorëve (75%);

Arrore (aplikime të vonshme) - 20 m zonë tampon e patrajtuar;

INFORMACION PËR MJEKUN

Simptomat: denatyrim i proteinave me lezione në nivel mukozale, dëmtime të mëlçisë, veshkave dhe SNQ, hemolizë. Të vjella me emetim të materialit të gjelbër, urth gastroezofageal, diarre të përgjakshme, dhimbje barku, verdhëz hemolitik, dështim të mëlçisë dhe veshkave, konvulsione, kolaps. Ethe nga thithja e metaleve. Iritues i lëkurës dhe syve.

TERAPIA: gastroluzi me tretësirë lakto-albumine, nëse kupremi të lartë përdorin kelatorë, penicilaminë nëse rruga orale është e realizueshme ose CaEDTA intravenoze dhe BAL intramuskular; përndryshe terapi simptomatike.

Paralajmërim: Konsultohuni me Qendrën e Kontrollit të Helmimeve.

KARAKTERISTIKAT

OSSICLOR 35 WG është një fungicid kontakti që përdoret në luftën parandaluese kundër një numri të madh sëmundjesh kërpudhore të ndjeshëm ndaj bakrit. Falë formulës së tij të veçantë në mikrogranula të tretshme në ujë, OSSICLOR 35 WG është shumë efektiv, ngjites dhe ka një veprim të zgjatur.

METODAT, DOZAT DHE KESHILLA PER PËRDORIMIN

OSSICLOR 35 WG është një fungicid me gamë të gjërë veprimi që përdoret në mbrojtjen e pemëve frutore me bërthamë, farore, hardhive, agrume, luleshtrydheve, ullinjve dhe kulturave hortikulturore në dozat e treguara në tabelë. Dozat e treguara i referohen trajtimeve me vëllim normal (1000 l/ha në hardhi, pemë frutore; 500-800 l/ha në kulturat barishtore dhe perimore, 1500 l/ha për agrumet). Nëse përdorni vëllime më të larta ose më të ulëta se ato të treguara, përshtatni dozat/hl për të respektuar dozën e treguar për hektar.

Përshtatni dozat dhe numrin e trajtimeve në mënyrë që të mos tejkaloni sasinë maksimale vjetore prej 6 kg/ha bakër.

Kultura	Sëmundja që kontrollon	Koha e përdorimit	Doza	Doze/ha	Nr. maks. trajtimeve/vit	Intervali mes trajtimeve (ditë)
Pemë frutore farore (mollë, dardhë, ftua, etj)	Kroma (<i>Venturia inaequalis</i>), Kanceri i degëve (<i>Nectria galligena</i>), Bakterioza (<i>Pseudomonas</i> spp.), Zjarri bakterial (<i>Erwinia amylovora</i>)	trajtime vjeshtore trajtime fund dimri trajtime pas lulëzimit	210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl	2.1-3.4 Kg 2.1-3.4 Kg 1.4 Kg	2 2 4	7-21
Pemë frutore bërthamore - Pjeshkë, Nektarina, Kajsi, Kumbull, Qersh, për trajtime para lulëzimit dhe trajtimet mbyllëse. - Vetëm pjeshkë, Nektarinë dhe Qersh për trajtime pas lulëzimit	Gjethë përdredhëse (<i>Taphrina deformans</i>), Pikalosja gjethëve (<i>Stygmia carpophila</i>), Bakterioza (<i>Pseudomonas</i> spp.), <i>Xanthomonas</i> spp.)	trajtime vjeshtore trajtime fund dimri trajtime pas lulëzimit	170-360 g/hl 170-360 g/hl 60-115 g/hl	1.7-3.6 Kg 1.7-3.6 Kg 0.6-1.15 Kg	2 2 5	14-21
Hardhi	Vrugu (<i>Plasmopara viticola</i>), Antraknoza	trajtime para lulëzimit trajtime pas lulëzimit trajtime të mbylljes	140-340 g/hl	1.4 -3.4 Kg maksimumi 17 kg/ha of produkt në vit	8	7-14
Ullinj	Syri i palloit (<i>Spilocaeaoleagina</i>); Antraknoza (<i>Gloeosporium olivarum</i>), Kroma (<i>Pseudomonas savastanoi</i>); Myku i zi	trajtime dimërore Gjatë formimit të kokrrave	210-360 g/hl	2.1-3.6 Kg	4	14-30
Angjinare	Vrugu (<i>Bremia</i> spp.), Bakterioza	në rast të kushteve që favorizojnë sëmundjen	175-560 g/hl	1.4-2.8 Kg	5	7-14
Agrumet (portokall, qitro, limon, lime, mandarine, etj.)	Njolllosja kafe (<i>Alternaria citricola</i>), Gomoza (<i>Phytophthora citricola</i>), Bakterioza (<i>Pseudomonas syringae</i>), Kalbezimi i zi	trajtime që fillojnë nga fundi i dimrit	150-185 g/hl	2.3-2.8 Kg	5	7-14
Arra, Lajthi dhe kultura të tjera me lëvozhgë	Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.), <i>Cytospora</i> sp.	Trajtime pranverore - verore - vjeshtore	95-380 g/hl	1.4-5.7 Kg	3	14-21
Luleshtrydhe	Pikalosja e kuqe (<i>Mycosphaerella fragariae</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas fragariae</i>), Antraknoza (<i>Colletotrichum</i> spp.),	Gjatë rritjes vegjetative	260-560 g/hl	2.1-2.8 Kg	5	7
Sallata dhe lloje të tjera perime gjethore Në fushë dhe serë (përveç spinaq e të ngjashme)	Vrugu (<i>Bremia lactucae</i>), Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), Bakterioza	në rast të kushteve që favorizojnë sëmundjen	250-560 g/hl	2.0-2.8 Kg	5	7-14
Brokoli, Lulelakër	Vrugu (<i>Phytophthora brassicae</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)		175-560 g/hl	1.4-2.8 Kg	5	7-14
Kungullore (kastravec, kungull, kungulleshka, pjepër, shalqi) në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.), Antraknoza (<i>Colletotrichum</i> spp.)		214-560 g/hl	1.7 -2.8 Kg Maks 17 kg/ha produkt në vit	4 për kastravec dhe kungulleshka, 6 për kungull, shalqi dhe pjepër	7-14
Spec në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Phytophthora</i> spp.), Vrugu i kërcellit (<i>Phytophthora capsici</i>), Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)	në rast të kushteve që favorizojnë sëmundjen	175-560 g/hl	1.4-2.8 Kg	5	7-14
Domate, Patëllxhan në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Phytophthora</i> spp.), Alternaria (<i>Alternaria porri</i> , <i>Alternaria alternata</i>), Antraknoza (<i>Colletotrichum</i> spp.), Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)		175-720 g/hl	1.4-3.6 Kg Maks 17 kg/ha produkt në vit	6	7-14
Patate dhe perime të tjera tropikale me zhardhokë	Vrugu (<i>Phytophthora infestans</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp.), <i>Pseudomonas</i> spp.), Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), Antraknoza (<i>Colletotrichum</i> spp.)		260-720 g/hl	2.1-3.6 Kg	6	7-14
PERIME RRËNJË (karrotë, panxhar i kuq, rrepë, pastinak, selino, rrepkë, çikore rrënjë, etj.) (duke përfshirë panxhar sheqeri)	Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), Njolllosja e gjethëve (<i>Cercospora</i> spp.), Bakterioza (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)		175-560 g/hl	1.4-2.8 Kg	5	7-14

Fasule, Bizele dhe Bishtajore të tjera	Antraknoza (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), Vrugu (<i>Phytophthora phaseolipisi</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)		175-560 g/hl	1.4-2.8 Kg	5	7-14
Perime me bulba (hudhër, qepë, qepë të njoma, qepujka)	Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>), Bakterioza (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>), Vrugu (<i>peronospora destructor</i>)		250-560 g/hl	2.0-2.8 Kg	5	7-14
Bimë dekorative, lule dhe pemë në fushë dhe serë	Vrugu (<i>Vrugu spp.</i>), Septoria (<i>Septoria spp.</i>), Antraknoza (<i>Colletotrichum spp.</i>), Ndryshku (<i>Puccinia spp.</i>), Ndryshku kaf (<i>Monilia spp.</i>), Njolllosja e zezë trëndafil (<i>Diplocarpon roseae</i>), Myku		125-175 g/hl	1.8-2.7 kg	3	7-14

PËRGATITJA E PËRZIERJES:

Hidheni produktin në rezervuarin e spërkatës të mbushur pjesërisht me ujë dhe duke e mbajtur masën të trazuar, sillni në vëllimin e dëshiruar. OSSICLOR 35WG duhet të përdoret sipas kalendarëve normalë të kontrollit të dëmtuesve në varësi të kushteve të temperaturës dhe lagështisë (në rastin e një sezoni veçanërisht me shi, dozat më të larta duhet të përdoren në intervalin më të shkurtër kohor).

PAJTUESHMËRIA:

Produkti nuk është i pajtueshuk është i pajtueshëm me produkte me reaksion alkaline.

Kujdes:

Kur përzihet me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karencës. Për më tepër, duhet të respektohen rregullat paraprake të përshkruara për produktet më toksike. Nëse ndodhin raste helmimi, informoni mjekun për përzierjen e kryer.

FITOTOKSICITETI

Nuk duhet të trajtohet gjatë lulëzimit. Në disa pemë frutore dhe në varietetet e mollës (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Canadian Pippin, Rosa Mantovana) dhe dardhës (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) të ndjeshme ndaj bakrit, OSSICLOR 35WG mund të jetë fitotoksik nëse shpërndahet në bimësi të plotë; në raste të tilla nuk rekomandohet përdorimi i tij në vegjetacion të plotë.

Pezulloni trajtimet 3 ditë para vjeljes për domatet e konsumit të freskëta, patëllxhanët, patatet, perimet me bulba, kungujt me fara; 7 ditë për bishtajore, angjinare, kungullore me lëvore të pangrënshme, perime me rrënjë, marule dhe sallata të tjera dhe perime të tjera me gjethe, bërthamore (pas lulëzimit), hardhi; 10 ditë për domatet industriale; 14 ditë për lakër (brokoli, lulëlakër), ullinj; 20 ditë për agrumet, kiwi; 21 ditë për pjeshkë, nektarinë dhe kajsi.

KUJDES

Për t'u përdorur ekskluzivisht për përdorimet dhe kushtet e treguara në këtë etiketë.

Kushdo që përdor produktin është përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga përdorimi jo i duhur i preparatit.

Pajtueshmëria me të gjitha udhëzimet e përfshira në këtë etiketë është një kusht thelbësor për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të shmangur dëmtimin e bimëve, njerëzve dhe kafshëve.

Mos aplikoni me aeroplan

Mos ndotni kultura të tjera, ushqime dhe pije ose ujëra sipërfaqësorë.

Përdoren në mungesë të erës.

Të mos shitet e hapur

Ambalazhi i boshatisur nuk duhet të hidhet në mjedis

Ambalazhi nuk mund të riperdohet

Nr dhe data e regjistrimit: xxxxxx

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 50 gr deri 10 kg.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise së mallit (serise) ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: qese alumini me 3 shtresore, të papershkueshme nga lageshtia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

Emri dhe adresa e Distributorit në Shqipëri: **AGROBLEND GROUP, 1032 Vore, Tirana, Shqipëri. www.agroblend.com,**

email : info@agroblend.com tel : +355682055831, +355682055832, +355682055836

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë):