

ASTRON 350 SE

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“KUJDES”

Lexo fleteudhuesin para perdorimit

Astron 350 SE është fungicid me veprim parambrojtës dhe shërues. Blokon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit si dhe sporifikimin e patogjenëve.

Përmbajtja: *Dithianon 350 g/l (31,53%)*

Formulimi: *Emulsion i suspendushem (SE)*

Masat parambrojtese:

- Mbajeni në vënde të sigurta dhe të pa arritëshme nga fëmijët.
- Evitoni kontakte të zgjatura të syve dhe lëkures me preparatin.
- Evitoni marjën e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkatës dhe gjatë spërkatjes.
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe tymos duhan.
- P264 Lani duart, parakrahët dhe fytyrën plotësisht pas përdorimit
- P280 Vishni doreza, veshje mbrojtëse, mbrojtëse për sytë, fytyrë.
- P301+P312 NËSE GËLLTITET: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/... nëse nuk ndjeheni mire.
- P391 Mblidheni atë që derdhet.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- H302: I demshem nëse gëlltitet. Në rast gëlltitjeje, marrje me organet e frymëmarrjes dhe me lekuren shkakton keto shenja: iritim të syve, spazme muskulare, dispnea, cionoze, ataksi të mundshëm, bradikardi.
- H410 Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
- Në rast kontakti me lekuren ose mukozat lahuni me ujë të bollëshëm dhe sapun.
- Në rast thithjeje të tretësirës spërkatëse me organet e frymëmarrjes i aksidentuari vendoset në një mjedis të ngrohtë dhe të ajrosur.
- Në rast helmimi kerkoni menjëherë ndihmë në qendrën më të afërt spitalore, duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti. Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave
- Antidot: asnjë, trajtohet në mënyrë simptomatike.
- Nëse nevojitet këshillë mjekësore, keni në dorë enën ose etiketën e produktit.
- Nëse gëlltitet: Thirrni një qendër helmi ose mjek nëse nuk ndiheni mirë. Shpëlarje gojën.

Përdorimi:

Ne molle: kunder kromës (*Venturia inaequalis*): Doza maksimale për një përdorim të vetëm: 1.4 lit/ha. Koha e përdorimit: përdorni produktin si një masë parandaluese, nga faza kur fryhen sythat e luleve: luspat e sythave zgjaten me njollë të ngjyrës kafe të hapur deri në fazën kur fruti arrin gjysmën e madhësisë së tij tipike (BBCH 51-75).

Ne dardhë: kunder kromës (*Venturia pyrina*): Doza për një përdorim të vetëm 0.9 -1.4 lit/ha. Koha e aplikimit: përdorni si masë parandaluese, nga faza kur fryhen sythat e luleve: luspat zgjaten me njollë të ngjyrës kafe të hapur deri në fazën kur fruti arrin gjysmën e madhësisë së tij normale (BBCH 51-75). Për të dy kulturat e

rekomanduara, aplikohen: 2 trajtime kur perdoret 1.4 lit/ha, 3 trajtime kur perdoret 1 lit/ha, 4 trajtime kur perdoret produkt 0.9 lit/ha. Intervali ndërmjet trajtimeve: 7-11 ditë. Sasia e rekomanduar e ujit: 600- 1000 lit/ha.

Vërejtje për përdorimin:

Sigurohuni që spërkatësi nuk ka mbetje të ngurta ose të lëngshme nga trajtimi i mëparshëm. Mbushni rezervuarin me gjysmën e vëllimit të kërkuar të ujit të pastër dhe vendosini ne pune perzieresin. Ngadalë shtoni sasinë e kërkuar të produktit. Shtoni pjesën tjetër të ujit duke mbajtur ne pune perzieresin gjate gjithë periudha e trajtimit. Shpëlajeni paketën e produktit bosh tre herë dhe derdhni ujin e larjes në rezervuar. Shpëlajini të gjitha enet dhe pajisjet e matjes me ujë menjëherë pas përdorimitduke hedur ujin ne rezervuar.

Fitotoksiciteti:

Në dozat dhe bimët e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Ndikimi në ekosistem:

EUH 401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim. Mos e ndotni ujin me produkt mbrojtës të bimëve ose paketimin e tij. Mos i lani pajisjet në afërsi të ujit sipërfaqësor. Shmangni ndotjen e ujërave përmes kanaleve kulluese nga fermat dhe rrugët. Shmangni lëshimin e paqëllimtë në mjedis.

Gjatë lulëzimit të të korrave, rekomandohet përdorimi i produktit jashtë periudhave të aktivitetit të bletëve. Përdorimi i vetëm i produktit

Për të mbrojtur bimët dhe artropodët jo-shënjestër, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me një gjerësi prej 3 m nga zonat që nuk përdoren për bujqësi..

Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse nga rezervuarët dhe rrjedhat e gjera te ujit:

45 m terren të mbuluar 20 m të gjerë ose, 35 m të mbuluara me ujë mbi një gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 50% ose, 25 m terren me gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 75% ose, 20 m terren me gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 90%.

Karenca:

Trajtimi i fundit ne kulturat mollë dhe dardhë trajtimet nderpriten 28 dite para vjeljes.

Magazinimi:

Ruani produktin në enën te mbyllur origjinale, në një vend të sigurt, të freskët e te thata dhe të ajrosur mirë, të mbrojtur nga ngricat ne nje temperature optimale 0-30⁰ C, te pa ekspozuar nga rezet direkte te diellit.

Nr dhe data e regjistrimit: 772, datë 5.11.2021;

Sasinë neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 1l; Data e prodhimit:;

Datën e skadencës së PMB-së, 3 vite nga data e prodhimit:;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:;

Tipi i ambalazhit bazë: Shishe HDPE dhe HDPE/PA COEX;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Innvigo Sp. z o.o. **Adresa:** Warszawa, Poloni.

tel.: 48 22 468 26 70, e-mail: biuro@innvigo.com;

Emri dhe adresa e kërkuesit: Innvigo Sp. z o.o. **Adresa:** Warszawa, Poloni.