

CLEANUP 36 SL

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

CLEANUP 36 SL është herbicid me verpim total mbi masen e gjelber, për kontrollin e barerave të keqia graminore nje dhe shumevjeçare, sidomos *Cynodon dactylon*, *Imperata cylindrica*, *Phragmites spp.*, *Cyperus spp.*; sidomos *Chromolaena odorata*, *Lantana camara*, si dhe barerat e keqia ujore. Pas marrjes nga gjethet, qarkullon me lengjet bimore në të gjitha pjeset, e veçanërisht në ato nentokesore.

Lënda aktive e paster: *Glyphosate acid* 36% v/w ose 360 gr/lit (IPA salt 48.6%); Kufijtë min/max: 342-378 gr/lit

Formulimi: Koncentrat i tretshëm (SL).

Masat parambrojtëse:

H411: Helmuje për jetën ujore me efekte të zgjatura.

P405+P102: Mbajeni të mbyllur dhe larg nga fëmijët.

P261: Shmangni thithjen e ilaçit.

P264: Lani duart vazhdimisht pasi ta mbani produktin.

P270: Mos e hani, pini apo tymosni kur përdorni këtë produkt

P305+P351+P338: Nëse ju bie në sy: Lajini me ujë të bollshëm për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse keni dhe do jetë më e lehtë.

P501: Hidhni përmbajtjen/enën sipas rregullores lokale.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- H319: Shkakton acarim serioz të syve. P305+P351+P338: Nëse ju bie në sy: Lajini me ujë të bollshëm për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse keni dhe do jetë më e lehtë.
- Në rast kontakti me lëkurën hiqni rrobat e ndotura dhe lahuni urgjentisht me ujë të bollshëm dhe sapun.
- Në rast gjëllitjeje mos provokoni të vjella. Dërgoni të sëmurin në spital dhe i tregoni mjekut etiketën.
- Jepini të dëmtuarit karbon aktiv të tretur në sasi të mëdha uji. Mos i jepni asgjë personit të prekur nëse ka humbur ndjenjat.
- Në rast të thithjes të tretësirës spërkatëse me organët e frymëmarrjes, largoni të aksidentuarin nga zona ku u ekspozua, mbajeni atë të ngrohtë dhe të qetë. Kërkoni këshillë mjekësore.
- Antidot specifik nuk ka, mjekimi simptomatik.

Përdorimi:

Specie e barerave të keqiat	Faza	Doza liter/ha ose %
Barerat nje vjecare graminore dhe gjethe gjera	-në fazën e mbirjes deri 10 cm lartësi; - Bime në zhvillim.	1-2 lit ose 2 % 2-4 lit. ose 2 %
Barerat shume vjecare <i>Cynodon dactylon</i>	Në lulezim	8 lit, pasuar me trajtime plotesuese në vatra me 3 %
<i>Imperata cylindrica</i>	60-80 cm lartësi	6-8 lit ose 3 %
<i>Panicum maximum</i>	Në vellazërim të plote ose lulezim	6 lit ose 2 %
<i>Paspalum spp.</i>	Në vellazërim të plote ose lulezim	6 lit ose 2 %
<i>Pennisetum spp.</i>	Gjate gjithë stadiave	3-4 lit ose 2 %
<i>Phragmites spp.</i>	Në lulezim të plote	6 lit ose 3 %
Gjethet gjera shume vjecare	Gjate gjithë fazave	6 lit ose 3% (<i>Convolvulus spp.</i> , 12 lit)
<i>Cyperus spp.</i>	Në lulezim dhe me pasë trajtime me vatra në vartësi të celjeve të reja	6 lit ose 3 %

Barerat e keqia ujore: Eichhomia crassipes Pistia stratiotes	Gjate gjithë vegjetacionit	6 lit ose 3 %
Shkurre dhe drure shume vjecare	Behen prerje te degeve duke shkatuar plage ne kuroren e pemeve dhe trajtohet brenda 15 minutave.	7 %; trajto perseri pjeset e ritura rrishtaz kur ato kane arritur gjatesine 20 cm.

Vërejtje për përdorimin:

Nuk le mbetje ne toke dhe nuk thithet nga rrenjet, prandaj tokat e trajtuara mund te mbillen pak dite pas trajtimit me te gjitha llojet e kulturave. Përdorni spërkatës të tipit fshese, me presion < 2 atm (30 PSI). Sperkatni ne kohen kur barerat e keqia jane ne rritjen aktive. Mos sperkat nese pas 4-6 oresh parashikohen shira. Kujdesu qe pikat sperkatese te mos bien ne bimet e kultivuara. Mos e perzje me preparate te tjera. Mos sperkatni ne dite me ere. Mos trajtoni barerat e keqia te cilat vuajne nga strese te ndryshme si thatesia, te ftohtit, etj. Nuk perzihet me produkte te tjera me reaksoin alkaline ose acid.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të mësipërme. Nuk duhet të përzihet me PMB të tjera.

Ndikimi ne ekosistem:

Pak helmues për gjitarët, zogjtë dhe për bletët.

H411: Toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata. SP1: Mos e ndotni ujin me produktin ose enën që e mban atë.

SPe3: Për mbrojtjen e bimëve të larta duke respektuar zonën e 10 m të agrumeve, ullinjve dhe hardhive dhe 20 m për përdorim në të lashtat barishtore dhe perimeve të fushave të hapura.

Ruajtja dhe magazinimi:

Preparati ruhet ne vende te erreta, te ajrosura, pa diell dhe pa lageshti, ne temperature 0 deri 35° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 46, datë 23.10.2025;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 5 lit;

Bar kodi përkatës.....;

Data e prodhimit.....*Printuar nga makineria në ambalazh;*

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 5 vite;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese: *Printuar nga makineria në ambalazh;* Tipi i ambalazhit bazë: shishe COEX ose HDPE;

Emri dhe adresa e Aplikantit: Vioryl SA. **Adresa:** 28th km Athens-Lamia Nat., road 190 14 Afidnes, Greqi. Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-së: Vioryl SA. **Adresa:** 28th km Athens-Lamia Nat., road 190 14 Afidnes, Greqi.