

LEKARO 80 WG

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“KUJDES”

Lexo fleteudhëzuesin para përdorimit

LEKARO 80 WG është fungicid në formën e kokrrizave për përgatitjen e një pezullimi uji (WG) me efekt sipërfaqësor të destinuar për përdorim parandalues dhe ndërhyrës.

Përmbajtja: *Captan 800 g/kg (80%).*

Formulimi: *Granula të dispergueshme në ujë WG.*

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni në vënde të sigurt dhe të pa arritëshme nga fëmijët;
- Evitoni kontakte të zgjatura të syve dhe lëkures me preparacionin;
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkates dhe gjatë spërkatjes;
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe tymos duhan;
- P280 Përdorni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtëse për sytë/mbrojtje për fytyrën;
- Mblidhni produktin e derdhur.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- H317 Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës; P302+P352 Në rast të kontaktit me lëkurën: lani me shumë ujë/sapun; P332+P313 Nëse ndodh acarimi i lëkurës: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.
- H319 Irritues për sytë; P305+P351+P338 NËSE PRODUKTI BIE NË SY: Shpëllajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t'u bërë, Vazhdoni shpëllarjen;
- H351 Dyshohet se shkakton kancer;
- H331 Toksike nëse thithet; P304+P340+P311 NËSE THITHET: hiqni viktimën në ajër të pastër dhe mbajeni që të marrë frymë mirë. Thirrni një qendër shëndetësore/mjek;
- Në rast helmimi kerkoni menjëherë ndihmë në qendrën më të afërt spitalore, duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti. Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave;
- Antidot: asnjë, trajtohet në mënyrë simptomatike;
- Nëse nevojitet këshillë mjekësore, keni në dorë enën ose etiketën e produktit;
- H302 E dëmshme nëse gëlltitet; P301+P312 NËSE GËLLTITET: Kontakto qendrën shëndetësore/doktorin nëse nuk ndiheni mirë;

PERDORIMI:

Në mollë: për kontrollin e *Venturia inaequalis*, me dozën maksimale/e rekomanduar e produktit për një përdorim të vetëm: 1.9 kg/ha. Data e përdorimit: Përdorni produktin profilaktikisht, sipas sinjalizimit ose kur vërehen simptomat e para të sëmundjes, nga faza e sythave të luleve të dukshme (BBCH 55). Në sezon, kryeni 8-10 trajtime, çdo 7-8 ditë. Vendoseni agjentin derisa fruti të arrijë gjysmën e madhësisë së tij tipike (BBCH 75). Trajtimi i fundit duhet të kryhet 28 ditë para korrjes së planifikuar. Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit të rritjes 10. Intervali ndërmjet trajtimeve të paktën 7 ditë. Sasia e rekomanduar e ujit 600-700 l/ha.

Në hardhi: me 150 g/100 litra ujë për një sipërfaqe prej 1000 m². Data e aplikimit: Spërkatja parambrojtëse fillon kur gjatësia e lastarit është 8-10 cm. Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit në rritje 4, me një interval prej 10-15 ditësh ndërmjet tyre. Kontrollohet: Vrug (*Plasmopara viticola*), kalbëzimi i zi (*Guignardia bidwelli*), botritis (*Botrytis cinerea*), antraknoza dhe nekroza.

Në pemë frutore bërthamore: me 150 g/100 lit ujë për një sipërfaqe prej 1000 m². Data e përdorimit: Spërkatja kryhet në vjeshtë, pasi bien gjethet dhe në pranverë, pak para se të fryhen sythat, si dhe pas rënies së petaleve.

Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit në rritje 4, me një interval prej 10-15 ditësh ndërmjet tyre. Sëmundjet kundër kalbëzimit të frutave, gjethe përdredhësen (*Taphrina deformans*)

Në pemë frutore farore: me 150 g/100 lit ujë për një sipërfaqe prej 1000 m². Data e përdorimit: Spërkatja bëhet gjatë hapjes së sythit, në fazën e vonë të sythit rozë, dhe gjithashtu gjatë rënies së petaleve. Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit në rritje 4, me një interval prej 10-15 ditësh ndërmjet tyre, Sëmundjet kroma e mollës (*Venturia inaequalis*) dhe e dardhës (*Venturia piri*).

Në agrume: me 150 g/100 lit ujë për një sipërfaqe prej 1000 m². Data e përdorimit: Trajtimi fillon me shfaqjen e simptomave të para. Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit në rritje 4, me një interval prej 10-15 ditësh ndërmjet tyre. Sëmundjet kundër sëmundjes së gomozës (*Coryneum beijerinckii* oud) kalbezimi i zi (*Guignardia citricarpa*).

Në perime dhe patate: me 150 g/100 lit ujë për një sipërfaqe prej 1000 m². Data e përdorimit: Trajtimi fillon me shfaqjen e simptomave të para. Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit në rritje 4, me një interval prej 10-15 ditësh ndërmjet tyre. Sëmundjet botritis (*Botrytis cinerea*), septorioza, monilia (*Monilia cinerea*), kladosporioza (*Cladosporium* spp.), antraknoza, kroma dhe alternaria.

Në bimë zbukuruese: me 150 g/100 lit ujë për një sipërfaqe prej 1000 m². Data e përdorimit: Përdorni përgatitjen në mënyrë profilaktike ose menjëherë pasi të keni vërejtur simptomat e para të sëmundjes, nga faza e tretë e gjurit (BBCH 33) deri në fazën e plotë (BBCH 55). Nr maksimal i trajtimeve gjatë sezonit të rritjes 4, me një interval prej 10-15 ditësh ndërmjet tyre. Sëmundjet e kalbëzimit të fidanëve (*Genera Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Parathënie, periudha dhe kushtet e veçanta të përdorimit: Spërkatni bimët derisa gjethet dhe lastarët të lagësht plotësisht. Kur vendosni produktin, mos lejoni që lëngu i punës të zhvendoset në plantacionet e punueshme fqinje. PMB përmban substancën aktive captan - një përbërje nga grupi i ftalimideve (grupi FRAC M4). *Për të minimizuar rrezikun e shfaqjes dhe zhvillimit të rezistencës ndaj agjentit shkaktar të zgjebës së mollës, PMB duhet të përdoret në përputhje me rekomandimet e mëposhtme:* - ndiqni në mënyrë rigorozë udhëzimet në etiketën e produktit për mbrojtjen e bimëve; -përdorni PMB në dozën e rekomanduar, brenda periudhës së parashikuar, duke siguruar kontrollin më të mirë të zgjebës së mollës; - përdorni një rrotullim të fungicideve me një mekanizëm tjetër të veprimit.

Rekomandohet të përdorni PMB në një temperaturë prej 12-20°C.

Vërejtje për përdorimin:

Sigurohuni që spërkatësi nuk ka mbetje të ngurta ose të lëngshme nga trajtimi i mëparshëm. Mbushni rezervuarin me gjysmën e vëllimit të kërkuar të ujit të pastër dhe vendosini në pune perzieresin. Ngadalë shtoni sasinë e kërkuar të produktit. Shtoni pjesën tjetër të ujit duke mbajtur në pune perzieresin gjatë gjithë periudhës së trajtimit. Shpëlajeni paketën e produktit bosh tre herë dhe derdhni ujin e larjes në rezervuar. Shpëlajini të gjitha enet dhe pajisjet e matjes me ujë menjëherë pas përdorimit duke hedhur ujin në rezervuar. *Trajtimi me lëngun e mbetur dhe pastrimi i aparatit:* Mbetjet e lëngut të punës dhe ujit të përdorur për pastrimin e pajisjeve duhet të jenë: - përdorni sipërfaqen e trajtuar pas hollimit nëse është e mundur, ose; - neutralizuar me përdorimin e zgjidhjeve teknike që sigurojnë degradimin biologjik të substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve, ose; - hidhni në ndonjë mënyrë tjetër, në përputhje me dispozitat për mbeturinat. Pas punës, lani pajisjet plotësisht. Për shkak të ndjeshmërisë së lartë të disa kulturave ndaj mbetjeve edhe të vogla të PMB, është shumë e rëndësishme të lani plotësisht spërkatësin pas trajtimit, veçanërisht para se ta përdorni në kultura të tjera nga sa rekomandohet, sipas metodës së mëposhtme:

- zbrazni rezervuarin, pastaj shpëlajini të gjithë përbërësit e spërkatësit dhe zbrazeni atë përsëri; - mbushni rezervuarin me ujë duke shtuar një nga produktet e rekomanduara për larjen e spërkatësve dhe shpëlajeni për të paktën 10 minuta me nxitësin e ndezur; - përbërësit e spërkatësit shpërbëhen, lahen dhe shpëlajen veçmas në një tretësirë të spërkatësit që pastron PMB; - shpëlajeni rezervuarin dhe të gjithë përbërësit e spërkatësit përsëri me ujë të pastër.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të etiketës.

Ndikimi në ekosistem:

H400 Shumë toksike për organizmat ujorë; EUH 401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim. Mos e ndotni ujin me produktet e mbrojtës të bimëve ose paketimin e tij. Mos i lani pajisjet në afërsi të ujërave të rrjedhshëm. Shmangni ndotjen e ujërave të kanaleve kulluese.

Shmangni trajtimin e periudhës së lulëzimit gjatë fluturimit të bletëve. Në mënyrë që të mbrohen organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një gjerësi 50 m e gjerë, e pjekur 20 m e gjerë nga rezervuarët e ujit dhe rrjedhat e ujit me zbatimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 75%. Për të mbrojtur bimët dhe artropodët jo-shënjestër, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me një gjerësi prej 3 m nga zonat që nuk përdoren për bujqësi. Në mënyrë që të mbrohet flora dhe fauna e dobishme, përdoret një brez mbrojtës 3 metra.

Karenca:

Periudha nga aplikimi i fundit i produktit deri në ditën e korrjes së kulturave është 28 ditë. Periudha nga aplikimi i fundit i produktit tek bimët e destinuara për ushqim të kafshëve deri në datën në të cilën kafshët mund të ushqehen me këto bimë (periudha e tërheqjes së ushqimit) është 28 ditë.

Magazinimi:

Ruani produktin në enën të mbyllur origjinale, në një vend të sigurt, të freskët e të thata dhe të ajrosur mirë, të mbrojtur nga ngricat, në temperaturë 0-30⁰ C, të pa ekspozuar nga rrezet direkte të diellit.

Nr dhe data e regjistrimit: 774, datë 5.11.2021;

Sasia neto e PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri 1kg;

Data e prodhimit:;

Datën e skadencës së PMB-së, 3 vite nga data e prodhimit ;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:;

Tipi i ambalazhit bazë: Shishe HDPE dhe HDPE/PA COEX;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Innvigo Sp. z o.o., Al. **Adresa:** Warszawa, Poloni.

Emri dhe adresa e kërkuesi: Innvigo Sp. z o.o., Al. **Adresa:** Warszawa, Poloni.