

MEDEIRO F WG

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

MEDEIRO F WG është një fungicid me veprim kontakti dhe sistemi, me lëvizshmëri në drejtimin bazopetal që kontrollon vrugun e hardhise (*Plasmopara viticola*) dhe eskoriozen e hardhise (*Phomopsis viticola*).

Lenda vepruese: *Fosetyl-Al 500 g/kg + Folpet 250 g/kg.*
Formulimi: *Granula të dispergueshme në ujë (WG).*

Deklaratat e rrezikut:

H317- Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës;

H319- Shkakton dëmtim/irritim të rëndë të syrit.

H351 -Dyshohet se mund të shkaktojë kancer;

H400 -Shumë toksik për gjallesat ujore.

EUH401- Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

Deklarata parandaluese:

P102 - Mbajeni në vende të sigurta dhe të pa arritshme nga fëmijet.

P202: Mos e përdorni produktin derisa të keni lexuar dhe kuptuar të gjitha masat paraprake të sigurisë.

P261: Evitoni kontaktin e produktit me gojën, lëkurën, sytë dhe thithjen e tretësirës spërkatëse nëpërmjet frymëmarrjes.

P270 - Gjate përdorimit të tij mos hani e mos pini ujë dhe duhan.

P280- Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.

P302+P352: Nëse produkti bie në lëkurë: lahari me ujë të bollshëm dhe sapun.

P308+P313: Nëse ekspozoheni ose dyshoni për ekspozim ndaj produktit: konsultohuni me një mjek duke marrë asistencën e tij.

P312 - Në rast helmimi lajmëroni qendrën shëndetësore me të afert dhe i tregoni mjekut etiketën.

P362+P364 - Hiqni rrobat e kontaminuara dhe lajini përpara ripërdorimit.

P391 - Mblidhni dhe pastroni derdhjet.

P501 - Mblidhni ambalazhet në kontejnere dhe beni shkaterimin e tyre sipas rregullave në fuqi.

S107e- Mos rihyni në zonat e trajtuara përpara se bimësia të jetë tharë plotësisht.

Nëse gjëlltitet, shkaktoni të vjella ose lavazh stomaku, duke shmangur aspirimin ose administrimin qymyr aktiv ose një tretësirë laksative alkaline (lloji: sulfat natriumi ose magnezi ose të ngjashme).

Nuk ka antidot specifik. Mos jepni qetësues yndyror, vajor ose respirator.

Përdorimi:

MEDEIRO F WG është një fungicid në granula të shpërndara në ujë me veprim parandalues dhe kurues kundër vrugut dhe eskoriozes së hardhisë. Përmban Fosetyl alumini, një fosfonat që aktivizon mbrojtjen fiziologjike të bimëve dhe simulon fotosintezën si dhe folpet, nga grupi i Phtalimidit që pengon disa procese metabolike duke vepruar në disa enzima. Ka aktivitet parandalues dhe kurues.

Dozat dhe mënyra e përdorimit:

Dozat e treguara i referohen trajtimeve me pajisje me volum normal. Në rastin e trajtimeve me volum të ulët doza duhet të modifikohet siç duhet, në mënyrë që të administrohet e njëjta sasi

produkti për njësi të sipërfaqes.

Perdoret ne:

Vreshta: kundër vrugut (*Plasmopara viticola*) dhe eskoriozes (*Phomopsis Viticola*), me 3 kg/ha, e holluar në 100-1000 lit ujë; të fillojë ndërhyrjet kur kultura të ketë arritur në fazën vegjetative të 7-8 gjetheve. Qendrueshmëria biologjike e produktit është 12-14 dite. Mund të kryhen deri në 3 trajtime në një sezon.

Trangull, kungullore e bostanore të tjera (në fushë të hapur e sera): kundër vrugjeve, me 3 kg/ha.

Ne domate (në fushë të hapur e sera), patate, spec, qepe, etj.: kundër vrugjeve, me 2-3 kg/ha.

Menaxhimi i rezistencës:

Produkti duhet të aplikohet paraprakisht. Këshillohet që përdorimi i **MEDEIRO F WG** të alternohet me produkte me mekanizma të ndryshëm veprimi.

Fitotoksiciteti:

MEDEIRO F WG është i papajtueshëm me plehruesit gjethorë dhe produkte me bazë bakri dhe vaj mineral. Në dozat dhe bimët e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Karenca:

Rrushi 42 ditë; perimet 14 ditë.

Ndikimi në ekosistem:

EUH401: Për të shmangur risqet ndaj shëndetit njerëzor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet për përdorimin.

SP1- Mos ndotni ujin dhe burimet ujore me produktin ose ambalazhin e tij. Mos pastroni materialet dhe mjetet e trajtimit pranë ujërave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.

SPe3: Për të mbrojtur organizmat e përshtatshëm, respektoni një zonë tampon të pa spërkatur me mbulesë vegjetative në raport me ujin sipërfaqësor prej 10 m.

PARALAJMËRIM: Të përdoret ekskluzivisht për përdorimet dhe kushtet e treguara në këtë etiketë. Kushdo që përdor produktin është përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga përdorimi jo i duhur i preparatit. Pajtueshmëria me të gjitha udhëzimet e përfshira në këtë etiketë është një kusht thelbësor për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të shmangur dëmtimin e bimëve, njerëzve dhe kafshëve.

Magazinimi:

Ruhet në vende të thata, të ajrosura, të errëta, në ambalazhin origjinal, në temperaturë deri 40° C.

Nr dhe data e regjistrimit:..... , datë..... ;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 kg.

Data e prodhimit

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese.....;

Tipi i ambalazhit bazë: Material tre shtresor, i pa përshkueshëm nga lagështia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: Ascenza Agro, SA. **Adresa:** Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal – Portugali.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: Ascenza Agro, SA. **Adresa:** Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal – Portugali.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë): .