

NICORN

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“KUJDES”

“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

Nicorn është një herbicid, një koncentrat që duhet të hollohet me ujë, i aplikuar në gjethë të destinuara për kokërr të njomë pas daljes dhe disa kontrole të barërave të këqija dypalëshe në misër. Produkt i destinuar për spërkatës në terren vetëlëvizës ose traktorë.

Përmbajtja: Nicosulfuron 40 g/l (4,11 %)

Formulimi: Koncentrat i suspensueshem (SC)

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni në vënde të sigurt dhe të pa arritëshme nga fëmijët;
- Evitoni kontakte të zgjatura të syve dhe lëkures me preparacionin;
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkatës dhe gjatë spërkatjes;
- Mos hani, pini ose pini duhan gjatë përdorimit të produktit. Shmangni llakun e frymëmarrjes;
- Mos shkëlqeni derisa lëngu i punës të thahet plotësisht në sipërfaqen e bimëve;
- P261 Mos thithni pluhurin/tymin/gazin/avujt/spërkatjen;
- P280 Përdorni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje sysh/mbrojtje fytyre;
- P391 Mblidhni rrjedhjen.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- Mos hani, pini apo pini duhan kur përdorni këtë produkt;
- Vishni doreza, mbrojtëse për sytë dhe fytyrën dhe veshje mbrojtëse që mbrojnë nga efektet e dëmshme të produktit për mbrojtjen e bimëve gjatë përgatitjes së lëngut të punës, si dhe gjatë aplikimit dhe kur hyni në zonën e trajtuar;
- Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë;
- Në rast kontakti me sytë, shpëlajeni menjëherë me shumë ujë;
- Kunderhelm: nuk ka antidot në dispozicion, trajtojeni në mënyrë simptomatike;
- Nëse gjëlletet, kërkoni menjëherë këshilla mjekësore, paraqitini mjekut paketimin ose etiketën e produktit;
- Nëse është e nevojshme të kontaktoni një mjek, paraqitini mjekut paketimin ose etiketën e produktit.

Përdorimi:

Efekti mbi barërat e këqija:

Nicorn është një herbicid sistemik. Produkti absorbohet kryesisht përmes gjethit dhe shpërndahet shpejt brenda bimëve duke shkaktuar frenim të rritjes dhe zhvillimit. Rritja e barërave të këqija pengohet menjëherë pas spërkatjes. Pas kësaj ndiqet zbardhja e barërave të këqija. Barërat e këqija zhduken plotësisht në 20-25 ditë pas spërkatjes. Produkti është më efektiv në eliminimin e barërave të këqija që rriten intensivisht në fazën e gjethëve 2-4. Moti i ngrohtë dhe i lagësht përshpejton veprimin e produktit. *Barërat e këqija të ndjeshme ndaj produktit:* Echinochloa crus-galli, Viola arvensis, Galium aparine, barëra të zeza (Polygonum consolvulus). *Barërat e këqija mesatarisht të ndjeshme ndaj produktit:* Chenopodium album.

Në misër

Koha e aplikimit: aplikoni në fazën 2-7 gjethë të misrit (BBCH 12-17), kur barërat e këqija janë në fazën e hershme të rritjes (2-4 fletë). Shkalla maksimale/e rekomanduar e aplikimit të vetëm 1,0 l/ha. Numri maksimal i aplikimeve vjetore 1. Sasia e rekomanduar e ujit: 200 - 300 l/ha. Spërkatja e rekomanduar madhësia e pikëzës mesatare.

Vërejtje për përdorimin:

Për shkak të mundësisë së efektit fitotoksik në disa lloje misri (veçanërisht llojet e reja) rekomandohet kryerja e testeve

eksperimentale në ato kultivime para aplikimit të Nicorn për të përcaktuar nëse ka shenja të dëmtimit të të korrave. Ose kontaktoni këshilltarin tuaj ose mbajtësin e autorizimit.

Mos aplikoni:

- menjëherë pas një periudhe të motit të zgjatur të ftohtë; në bimët, rritja e të cilave është penguar si rezultat i temperaturës së ulët. Spërkatja mund të bëhet pas rifillimit të rritjes intensive të misrit;
- në temperatura nën 10° C dhe mbi 25° C;
- bimët e dobësuara dhe të dëmtuara nga ngricat, thatësira, dëmtuesit ose sëmundjet;
- për bimët e lagura;
- për misrin e ëmbël, të plasaritur dhe për materialin mbarështues;
- në misër në më shumë se 7 faza gjethe.

Kur aplikoni produktin, mos lejoni:

- lëngu i punës të zhvendoset në plantacionet fqinje,
- lëngu i punës të aplikohet disa herë në kufijtë e zonave të spërkatura tashmë dhe në kokat e kokës.

Strategjitë e rezistencës ndaj dëmtuesve

- produkti Nicorn përmban herbicide që pengojnë grupin ALS si një substancë aktive. Përdorimi i herbicideve me të njëjtnë mënyrë veprimi mund të çojë në përzgjedhjen e barërave të këqija rezistente. Për të minimizuar shfaqjen dhe zhvillimin e barërave të këqija rezistente, herbicidet nga grupi i frenuesve ALS duhet të përdoren në përputhje me Praktikën e Mira Bujqësore: - ndiqni udhëzimet e përfshira në etiketë për një produkt për mbrojtjen e bimëve - një masë në dozën e rekomanduar në kohë kontrolli më i mirë i barërave të këqija,
- përshtatja e punimit të tokës me kushtet në terren, veçanërisht për llojin dhe ashpërsinë e barërave të këqija, - përdorni metoda të ndryshme të kontrollit të barërave të këqija, përfshirë rotacionin e të korrave, etj., - produkti duhet të aplikohet në mënyrë të ndërsjellë me herbicide të grupeve të tjera kimike me mënyra të ndryshme veprimi,
- përdorni një përzierje të herbicideve nga grupi ALS me herbicide me mënyra të ndryshme veprimi, - përdorimi në rrotullim dhe/ose një përzierje e herbicideve që veprojnë në disa procese jetësore të barërave të këqija - përdor herbicidin e mekanizmit të veprimit vetëm 1 herë gjatë sezonit në rritje të kulture,
- informoni mbajtësin e autorizimit për kontrollin e pakënaqshëm të barërave të këqija,
- për më shumë informacion kontaktoni këshilltarin tuaj ose mbajtësin e autorizimit.

Në kushte të pafavorshme për rritjen dhe zhvillimin e misrit pas përdorimit të produktit mund të ndodhë një shtrembërim i përkohshëm, njollë e gjetheve dhe pengim i rritjes

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik nëse përdoret sipas udhëzimeve të etiketës.

Ndikimi në ekosistem:

H410- Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata. EUH 401- Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, respektoni udhëzimet për përdorim. Efekti te bletet nuk është marre ne konsiderat pasi fazat me te cilen perdoret produkti, nuk perkon me ektivitetin e bletes. Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos i pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen përmes kanalizimeve nga fermat dhe rrugët. Për të mbrojtur organizmat ujorë respektoni një zonë tampon të pa spërkatur prej 20 m në trupat ujorë sipërfaqësorë. Për të mbrojtur bimët jo-objektive respektoni një zonë tampon të pa spërkatur prej 5 m në tokën jo bujqësore.

Karenca:

Kungullore, solanace dhe lule shtrydhe 3 ditë; Qepë, hudhër, karrotë 7 ditë; Presh 15 ditë; Rrush 21 ditë; Oriz 28 ditë; Panxhar sheqeri 30 ditë; Drithëra 35 ditë.

Magazinimi:

Ruani produktin në enën e mbyllur origjinale, në një vend të sigurt, të freskët e të thata dhe të ajrosur mirë, të mbrojtur nga ngricat, në temperaturë 0-30° C, të pa ekspozuar nga rrezet direkte të diellit.

Numri dhe data e regjistrimit: 777, datë 5.11.2021;

Sasia neto i PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri 1

Lit; Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: _____;

Data e prodhimit: _____;

Datën e skadencës së PMB-së, 3 vite nga data e prodhimit;

Lloji i ambalazhit bazë: Shishe COEX ose HDPE;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Pestila Sp. z o.o. **Adresa:** Wolbórz, Poloni;

Emri dhe adresa e kërkuesit: Pestila Sp. z o.o. **Adresa:** Wolbórz, Poloni.