

SHYFO 480 SL

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

LEJOHET TE PERDORET VETEM NGA PERDORUES PROFESIONISTE

SHYFO 480 SL është një herbicid i pas mbirjes, gjethor jo selektiv me veprim sistematik, duke kontrolluar si barerat gjethe gjera ashtu edhe ato gjethe ngushta në periudhën e rritjes aktive. Merret ekskluzivisht nga pjesët e gjelbra të bimëve dhe më pas shpërndahet me rrjedhje asimiluese në të gjitha pjesët e bimës (rrënjët nëntokësore, sythat dhe rizomat), duke arritur kështu shkatërrimin e pjesëve nëntokësore të barërave të këqija njëvjeçare dhe shumëvjeçare barishtore dhe dykotiledone. Produkti nuk merret nga rrënjët dhe nuk ka efekt mbi farat. Simptomat e veprimit janë vyshkja graduale, zverdhja, tharja deri në nxirje të bimëve të prekura për një periudhë prej 10-14 ditësh. Simptomat mund të shfaqen më vonë në kushte të motit të ftohtë dhe të thatë. Efekti rritet nga intensiteti më i lartë i dritës dhe lagështia relative. Ndalohe përdorimet për tharje për të kontrolluar kohën e vjeljes ose për të optimizuar shirjen. Përdorimi të minimizohet ose ndalohe në zonat specifike të listuara në VKM-në Nr. 317, datë 15.5.2019, “Për miratimin e rregullave për përdorimin e qëndrueshëm të produkteve për mbrojtjen e bimëve dhe kriteret e kualifikimit për përdoruesit”.

GRUPI 9 (G)* HERBICID

Lenda vepruese: *Glyphosate e paster 360 g/L (30.8 % w/w); Toleranca: 342.5-377.5 g/L. Glyphosate kripë Isopropilamin-IPA 485 g/l (41.5 % w/w); Toleranca: 461-509 g/L.*

Formulimi: *Koncentrat i tretshëm në ujë (SL).*

Masat parambrojtëse:

P264: Lani duart menjëherë pas përdorimit;

P280: Vishni dorashka mbrojtëse/rroba mbrojtëse/mbrojtëse për fytyrën/sytë;

P305+P35+P338 NËSE NË SY: Shpëllajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse keni dhe nëse është e lehtë për ta bërë. Vazhdoni shpëllarjen;

P337+313: Nëse vazhdon iritimi i syrit: Merrni këshillë/vëmendje mjekësore;

Mbajeni në vende të sigurt dhe të pa arritshme nga fëmijet;

Ruajeni në vende të thata dhe të fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve për njëzet si dhe ushqimeve për blegtorinë;

Gjate punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze;

Evitoni kontaktet e syve dhe të lekures me preparatin;

Evitoni thithjen e avujve të preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkates dhe gjatë spërkatjes;

Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe duhan;

Në përfundim të punës lani paisjet mbrojtëse, mjetet spërkatese, duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit. Beni shkatërrimin e ambalazhit sipas rregullave në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

H319: Shkakton dëmtim/iritim të rëndë syri. Shkakton iritim të rëndë syri;

H411: E rrezikshme për mjedisin ujor-Rreziku kronik. Toksikë për jetën ujore me efekte afatgjata;

Në rast kontakti me sytë i lani urgjentisht me ujë të bollshëm për 10-15 minuta dhe kërkoni këshillë mjekësorë; Në rast kontakti me lëkurën hiqni rrobat e ndotura dhe lahuni urgjentisht me ujë të bollshëm dhe sapun;

Në rast gjëllitje mos provokoni të vjella. Dërgoni të aksidentuarin në spital dhe i tregoni mjekut etiketën;

Jepini të aksidentuarit karbon aktiv të tretur në sasi të mëdha uji. Mos i jepni asgjë të aksidentuarit, nëse ka humbur ndjenjat;

Në rast të thithjes të tretësirës spërkatese me organet e frymëmarrjes, largoni të aksidentuarin nga zona ku u ekspozua, mbajeni atë të ngrohtë dhe të qetë. Kërkoni këshillë mjekësorë;

Antidot specifik nuk ka, mjekimi simptomatik.

Perdorimi:

Perdoret ne kontrollin e barerave te demshme ne agrume, farore, berthamore, ullinj, vreshta, trendafilishte, etj.

Drithërat (gruri dimëror, gruri pranveror, elbi dimëror, elbi pranveror, tërshëra, gruri i fortë): kunder barërave te demshme njëvjeçare, me 1.5 l/ha. Norma e ujit: 100 - 400 l/ha. Numri maksimal i aplikimeve: një herë për sezonin e rritjes së bimëve. Aplikohet jo më vonë se 3 ditë pas mbjelljes, para daljes së bimës. Farat duhet të mbulohen me të paktën 1,5 cm tokë. Aplikohet tek barërat në fazën 2-4 gjethe (BBCH 12-14).

Mollë, dardhë, qershi, kumbull, agrumev vresht: kunder barërave te demshme njëvjeçare dhe shumevjeçare, me 5 l/ha. Norma e ujit: 200 - 250 l/ha. Numri maksimal i aplikimeve: një herë për sezonin e rritjes së bimëve. Aplikohet në vjeshtë pas vjeljes (pas rënies së gjetheve) ose në pranverë deri në fazën e 'veshit të miut' në pemët e mollës dhe dardhës dhe në fazën e 'gonxhes së bardhë' në pemët e kumbullës, qershisë dhe vishnjës. Të mos përdoret në mbjelljet më pak se 2 vjeç. Mos aplikoni për pemët e dëmtuara mekanikisht me lëvore të qëruar. Spërkatja nuk duhet të arrijë trungjet mbi 30 cm mbi tokë ose degët.

Tokë e punueshme e pa mbjelle: kunder barërave te demshme njëvjeçare, me 1.5 l/ha dhe shumevjeçare me 3-4 l/ha. Norma e ujit: 150 - 250 l/ha. Numri maksimal i aplikimeve: 1 herë në vit.

Barërat e demshme të drithërave, barërat e demshme një-dyvjeçare:

Toka mund të kultivohet pas një minimumi 24 orësh pas aplikimit, konsumi i drejtpërdrejtë mund të kryhet të paktën 2 ditë pas aplikimit.

Barërat e demshme shumëvjeçare:

Mund të aplikohet në kallamishtet e të gjitha kulturave në vjeshtë dhe pranverë përpara mbjelljes së kulturës. Toka nuk duhet të kultivohet për të paktën 5 ditë para dhe pas aplikimit. Mos e kositni zonën përpara aplikimit.

Barërat e këqija duhet të kenë sipërfaqe të mjaftueshme gjethesh në momentin e aplikimit; Lejoni të paktën 21 ditë që barërat e demshme të rriten përpara aplikimit të pranverës. Aplikoni 3 l/ha me një normë prej 3 l/ha për barërat zvarritëse deri në 75 rizoma për m²; 4 l/ha për barërat zvarritëse mbi 75 rizoma dhe për barërat e tjera shumëvjeçare si dhe barërat dykotiledone shumëvjeçare.

Livadhe dhe kullota - restaurimi dhe shkatërrimi i vegjetacionit:

Norma e ujit: 200 - 250 l/ha. Numri maksimal i aplikimeve: 1 herë në vit. Mund të përdoret për kontrollin barerave te demshme ne kullota përpara restaurimit ose mbjelljes së kulturave. Aplikoni produktin në tokën me bar pas rigjenerimit të tokave me bar pas kositjes ose kullotjes. Përndryshe, mund të aplikohet para kositjes ose kullotjes midis qershorit dhe tetorit në një lartësi prej 30-60 cm, përveç rastit kur kullota është e dendur dhe ka formuar fara të pjekura. Trajtoni kullotat 1-2 vjeçare me 3 l/ha, kullotat 2-4 vjeçare me 4 l/ha, kullotat 4-7 vjeçare me 5 l/ha.

Hekurudhat, bordurat dhe anet e rrugëve: me 6 l/ha.

Norma e ujit: 100 - 250 l/ha (përdorni maksimum 300 - 400 litra ujë për ha). Numri maksimal i aplikimeve: një herë në vit. Gjatë aplikimit, është e nevojshme të sigurohet që e gjithë bima të jetë e lagur. Trajtoni në varësi të densitetit të rritjes së barërave të demshme gjatë sezonit të rritjes, veçanërisht nga mesi i prillit deri në fund të gushtit (nga fillimi i formimit të sythave të luleve dhe gjatë lulëzimit për të parandaluar formimin e farës). Aplikoni për barërat e demshme që rriten në mënyrë aktive me një lartësi minimale prej 20 cm.

Plantacione pyjore: kunder bimësise se padëshiruar, me 6 l/ha. Norma e ujit: 80 - 250 l/ha, përdorni kufirin e sipërm të diapazonit të mësipërm për sipërfaqe më të madhe të gjetheve të barërave të demshme. Numri maksimal i aplikimeve: 1 herë në vit.

Kontrolli i barërave të demshme - përgatitja e tokës për mbjellje:

Përdorni 4 l/ha në tokë të kultivuar, 5 l/ha për të kontrolluar barërat e demshme shumëvjeçare në kullota. Mos mbillni fidanë deri në 7 ditë pas aplikimit.

Kontrolli i barërave të demshme pas mbjelljes me aplikim të synuar:

Mund të përdoret për kontrollin e barërave të demshme rreth halorëve dhe pemëve gjetherënëse duke përdorur një spërkatës dore ose shpine. Aplikimi gjatë sezonit të rritjes së pemëve halore dhe gjetherënës është i mundur vetëm me kontroll efektiv të rrjedhjes së spërkatjes. Aplikoni tretësirën 2% me një spërkatës shpine duke përdorur një mbulesë mbrojtëse për të parandaluar ndotjen dhe dëmtimin e pemëve. Trajtoni ndërmjet qershorit dhe gushtit, pas zhvillimit të plotë të vegjetacionit të padëshiruar. Trajtojeni kundra shqiponjës së zakonshme vetëm kur tehet janë zhvilluar plotësisht, pra nga mesi i gushtit deri në fund të shtatorit.

Norma rregullohet nga përbërja dhe shkalla e shqetësimit - për barërat e demshme barishtore

shumëvjeçare aplikoni 4 l/ha; për bimët drunore rezistente, si p.sh. trefshët e këmbëve të shpendëve, lakmën e alderit, mjedrën dhe manaferrën, norma duhet të rritet deri në 8 l/ha. Mos aplikoni në momentet e rritjes, d.m.th. midis marsit dhe majit.

Shqyrtimi kimik me aplikim në trungje:

Norma e aplikimit: Pemë gjetherënëse: aplikoni një tretësirë 10% të produktit (1 pjesë produkt+9 pjesë ujë/100 ml në 1 litër tretësirë); Pemët halore: aplikoni një tretësirë 20% të produktit (1 pjesë produkt+ 4 pjesë ujë/200 ml në 1 litër tretësirë).

Aplikoni produktin e holluar në skajet e zonës së trungut të sapoprerë. Aplikoni një sasi të mjaftueshme për të lagur sipërfaqen me furçë ose shtojcë sharre. Aplikoni menjëherë pas prerjes vetëm ndërmjet nëntorit dhe prillit. Mos përdorni produkt të paholluar.

Kunder barerave të demshme njëvjeçare si: *Rumex hyumenosepalus*, *Cyperus spp.* *Cirsium arvense*, *Sorghum halepense*, me 6 lit/ha. Kunder barerave mesatarisht rezistente si: *Artemisia spp.*, me 8 lit/ha.

Kunder barerave rezistente doza mund të shtohet: për graminoret 10 lit/ha, për *Convolvulus spp.*, me 12 lit/ha.

Verejtje për perdorimin:

Nuk ka kufizime për kultivimin e kulturave pasuese. Të mbjellat fqinje nuk duhet të preken nga spërkatja e drejtpërdrejtë ose nga rrëshqitja e mjegullës! Në veçanti, spërkatja në kushte të papërshtatshme të motit duhet të shmanget. Trapiantimi i fidanave dhe mbjellja e farerave të bëhet të paktën 48 ore pas trajtimit. Nuk rekomandohet në pemtoreset dhe vreshtat e reja.

Kontrolli i suksesshëm i barërave të demshme shumëvjeçare dykotiledone me rrënjë të thella kërkon sipërfaqe të mjaftueshme gjethesh në kohën e spërkatjes për të siguruar marrjen maksimale të substancës aktive në bimë. Trajtimet janë më efektive kur bimët janë në rritjen e tyre më të fuqishme. Kundër barërave të demshme barishtore njëvjeçare dhe shumëvjeçare, përfshirë piretrumin, produkti është më efektiv në momentin e punimit (kur piretrum ka 5-6 gjethë, 12-15 cm të gjata). Shiu brenda 6 orëve pas aplikimit mund të zvogëlojë efektivitetin e produktit. E gjithë puna kultivuese mund të kryhet vetëm kur simptomat janë zhvilluar plotësisht. Puna e mëtejshme kultivuese duhet të presë të paktën 5 ditë pas aplikimit të produktit.

Nuk përzihet me produkte të tjera me reaksoin alkaline ose acid.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret si pas rekomandimeve të mësipërme. Rreziku i fitotoksicitetit është i ulët. Dallimet në ndjeshmërinë varietale ndaj produktit janë minimale. Kur aplikoni në pemë, kini kujdes që të mos prekni zonën e gjethëve ose lastarët afër sipërfaqes së tokës. Nuk duhet të përzihet me PMB të tjera.

Ndikimi në ekosistem:

Nuk është helmues për bletët dhe peshqit. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, duke përfshirë kombinimet e tyre, sipas nevojës. Në veçanti, zhvendosja do të reduktohet për aplikimet me spërkatje të bëra nga përdorues profesionistë në fushat bujqësore. Si parazgjedhje, për të mbrojtur bimët tokësore jo të synuara, një rrip tampon pa spërkatje në fushë prej të paktën 5-10 m nga kufiri i fushës në varësi të përdorimit të veçantë dhe sprucatorët e zvogëlimit të lëvizjes që reduktojnë lëvizjen e spërkatjes me të paktën 75%, ose do të kërkohen masa të tjera për zbutjen e rrezikut me reduktim ekuivalent të lëvizjes, përveç nëse rezultati i vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë për përdorimin e PMB-se tregon se masa të tilla zbutëse të rrezikut nuk janë të nevojshme ose mund të ulen sepse nuk ka rreziqe të papranueshme të shkaktuara nga spërkatja.

Karenca:

Nuk aplikohet.

Magazini:

Ruajeni produktin në paketim origjinal të mbyllur, në magazina të mbyllura, të pastra dhe të ajrosura në temperatura ndërmjet +5°C dhe +30°C, larg ushqimeve, ilaçeve, ushqimit për kafshë, plehrave, dezinfektuesve dhe ambalazheve të këtyre substancave. Mbroni nga ngrica dhe rrezet e diellit direkte.

Nr dhe data e regjistrimit: 747, datë 4.12.2020;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 5 lit;

Data e prodhimit:_____;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 5 vjet;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;

Lloji i ambalazhit baze: Shishe HDPE ose COEX.

Emri dhe adresa e prodhuesit: Sharda Cropchem Ltd. **Adresa:** Mumbai-Indi.

Emri dhe adresa e aplikantit: Sharda Chropchem Espana SL. **Adresa:** Murcia, Spanjë.

Linjat e fabrikimit: