

STOMP AQUA

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“Lexo fletëudhësuesin para përdorimit”

STOMP AQUA është herbicid selektiv, me veprim sistematik, i para dhe pas mbirjes së hershme, për kontrollin e një spektri të gjërë të barërave të këqia gjethengushta dhe shumë barërave gjethegjëra në shumë kultura bujqesore. Vepron përmes thithjes prej gjetheve dhe rrënjëve. Vepron tek bimët e b. këqia menjëherë pas bulëzimit ose daljes mbi tokë.

Përmban: 455 gr/lit Pendimethalin (lende vepruese e paster).

Formulimi: Capsula te suspendueshme (CS).

Masat parambrojtëse:

- P102: Mbajeni në vende të sigurt dhe të pa arritëshme nga fëmijët.
- Ruajeni në vende të thata dhe të freskëta, larg ushqimeve dhe pijeve për njerëzit si dhe ushqimeve për blegtorinë.
- P261: Shmangni thithjen e produktit me frymëmarrje.
- P270: Mos hani, mos pini lëngje dhe duhan gjatë përdorimit të këtij produkti.
- P280: Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorimin.
- P362+P364: Hiqni rrobat e kontaminuara pas përfundimit të punës dhe lajini ato para ripërdorimit.
- P501: Asgjësoni përmbajtjen/enën në përputhje me rregulloret kombëtare në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- Përmban Pendimethalin. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.
- Në rast marrje me organet e frymëmarrjes, nxirreni të aksidentuarin në ajër të pastër.
- Në rast kontakti me lëkurën: hiqni rrobat e ndotura, lani menjëherë pjesët e kontaminuara me ujë të bollshëm dhe sapun. Kërkoni ndihmë mjekësore nëse irritimi i lëkurës vazhdon.
- Në rast kontakti me sytë: shplajini ata me ujë të bollshëm.
- Në rast se produkti është gëlltitur, mos shkaktoni të vjella. Shpëlani menjëherë gojën.
- Nëse i aksidentuari ka dëmtime serioze, kërkoni ndihmë mjekësore në qendrën spitalore më të afërt duke i treguar mjekut etiketën e preparatit.
- Nuk ka antidot specifik dhe terapia është simptomatike. P101: Nëse kërkohet këshilla mjekësore, atëherë i tregoni mjekut etiketën e produktit.

Përdorimi:

Përdoret pas mbirjes për kontrollin e barërave të këqia në shumë kultura bujqesore si: perime (Qepe, asparag, karrote, laker, patellxhan, spec), luledielli, miser, patate, duhan, fasule, soje, vresht, bime zbukuruese. Trajtohet kur barërat e këqia janë të reja dhe në ritje intensive.

Përdoret me 0.4-2 lit preparat, në 200-400 lit tretësirë spërkatëse për ha. Përdoret vetëm 1 herë gjatë të njëjtit sezon.

Ka spektër të gjërë veprimi. Kontrollon:

- **Barëra të këqia gjethengushta:** bisht dhelpra (*Alopecorus ssp.*), *Agrostis gigantea*, *Apera spica-venti*, loliumi (*Lolium ssp.*), *Echinochloa ssp.*, *Panicum ssp.*, sorgumi (*Sorghum ssp.*), *Poa ssp.*

- **Barëra të këqia gjethegjëra:** *Adonis ssp.*, *Amaranthus ssp.*, *Anagallis arvensis*, *Anthemis ssp.*, *Aphanes arvensis*, *Atriplex ssp.*, *Bifora radians*, *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chepalaria ssp.*, *Chenopodium album*, *Chrysanthemum ssp.*, *Cirsium arvense*, *Emex australis*, *Erophila verna*, *Galeopsis ssp.*, *Galinsoga ciliata*, *Galium aparine*, *Galium tricornotum*, *Helianthus annuus*, *Lamium ssp.*, *Malva ssp.*,

Matricaria spp., Medicago ssp, melilotua ssp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonium spp., Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rapistrum rugosum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Silene gallica, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Sonchus spp., Spergula arvensis, Stellaria media, Trifolium spp., Vicia spp., Viola spp.

Vërejtje për përdorimin:

Kerkon toke te pergatitur e te niveluar mire, me lageshti; mbjellje uniforme te fares, ne thellesi 3-4 cm; per kulturat e trapiantuara (perimet, etj.) kryhet trajtim uniform duke e shoqeruar me vaditje ne forme shiu, 7-8 dite para trapiantimit pas se cilit kryhet nje vaditje tjeter e lehte.

Vepron kryesisht nëpërmjet gjethëve. Në kushtet e tokës me lagështi, lufton edhe barërat e këqia që janë në mbirje. Efektiviteti më i lartë arrihet kur barërat e këqia trajtohen në fazat e hershme të zhvillimit dhe kur janë në rritje intensive.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat e rekomanduara në të lashta. Kultura pasardhese mund të mbillet 6 muaj pas trajtimit.

Ndikimi në ekosistem:

H400: Shumë toksik për gjallesat ujore. H410: Shumë toksik për gjallesat ujore, duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni paisjet e punës në afërsi të ujërave sipërfaqësore. Shmangni kontaminimin përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.

Për të mbrojtur organizmat ujore respektoni një rrip sigurie prej 20 m të pa trajtuar nga kanalet e ujërave sipërfaqësore. Për të mbrojtur bimët që nuk janë objekt i trajtimit, respektoni një brez mbrojtës prej 5 m nga zona e trajtuar.

Ruajtja dhe magazinimi:

Ruhet në vende të thata, të ajrosura, larg rrezeve direkte të diellit, në temperatura deri 35°C.

Nr dhe data e regjistrimit: 543, date 14.6.2013.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 lit.

Data e prodhimit ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesëve të përcaktuara): 5 vjet;

Numri i partise së mallit (serise) ose shenja të tjera identifikuese..... ;

Tipi i ambalazhit baze: shishe HDPE.

Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agro BV. **Adresa:** Zyrih, Zvicër.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: BASF Agro BV. **Adresa:** Arnhem (NL), Zyrih, Zvicër.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë): ...