

**SUCCESS TM 0.24 CB**  
PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE  
“KLASA 3”. Xi.



**"KUJDES". "IRRITUES". I RREZIKSHEM PER MJEDISIN-N.**

**SUCCESS 0.24 CB** është një perzierje komplekse me efekt “terhiq dhe vrit” për kontrollin e mizes së ullirit. Në baze të tij qëndron Spinosadi, një lëndë aktive insekticide e re, e ekstraktuar nga kolonitë bakteriale të *Saccharopolyspora spinosa*, një bakter që gjendet i pranishëm në natyrë. Është insekticid me verpim kontakt dhe ngrenie. Spinosadi vepron në sistemi qendror nervor të insekteve duke shkaktuar një paralizë të pa kthyeshme, e cila shkakton ngordhjen e insekteve në krye të tre ditëve.

**Lenda vepruese:** *Spinosad 0.24 gr/lit (0.02% ww); Si dhe: - Proteine bimëre për terheqjen e mizes; - Ushqim sheqeror për mizen; - Konservant për të siguruar qëndrueshmërinë e ushqimit.*

**Formulimi:** *Tretësire viskoze (CB).*

**Pamja:** *Leng me ngjyrë kashtë (kafe në të verdhë).*

**Masat parambrojtëse:**

- Ruajeni në vende të sigurta, të ajrosura, larg fëmijëve dhe ushqimeve.
- Evitoni kontaktin e produktit me gojën, lëkurën, sytë dhe thithjen e tretësirës spërkatëse nëpërmjet frymëmarrjes.
- Gjatë punës mos hani dhe mos pini lëngje e duhan.
- Gjatë punës vishni pajisjet mbrojtëse.
- Lani rrobat e ndotura para se ti rivishni.
- Pas përfundimit të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit.
- Lani pajisjet mbrojtëse pas përfundimit të punës.
- Asgjësoni ambalazhin sipas rregullave në fuqi.

**Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:**

- Në rast kontakti me lëkurën, hiqni menjëherë rrobat e ndotura, lani lëkurën me ujë të pastër dhe me sapun me ujë të bollshëm dhe sapun.
- Në rast kontakti me sytë, i lani menjëherë me ujë të bollshëm për 10-15 minuta dhe kërkoni këshillë mjekësorë.
- Në rast se nuk ndiheni mirë, ndaloni punën dhe kërkoni ndihmë mjekësore.
- Në rast gjëllitje, provokoni artificialisht të vjella dhe kërkoni ndihmë mjekësore. Jepini të aksidentuarit karbon aktiv, kur nuk ka humbur ndjenjat.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.

**Perdorimi:**

Perdoret me 3.3 lit preparat/100 lit uje. Spërkatën një për çdo dy bimë. Perdoren 300 gr solucion për çdo bimë, duke trajtuar anën lindore të kurrës. Trajtimet fillojnë mbi bazen e vërtetimit, kur konstatohen cpimet e para nga miza e ullirit dhe përsëriten çdo 21 ditë, duke kryer 5 trajtime për çdo sezon.

**Ndikimi në ekosistem:**

Mesatarisht helmues për gjitarët. Mesatarisht helmues për zogjtë. Helmues për bletët, prandaj nuk duhet të trajtohet në kohën e lulezimit dhe në orët e mesdites kur është aktiviteti më i madh i bletës. Mesatarisht helmues për peshqit. Helmues për jovertobroret ujore. Mos ndotni ujrat dhe basenët ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

**Karenca:**

7 ditë.

**Magazini:**

Ruhet ne vende te thata, te ajrosura, te erreta, ne ambalazhin original, ne temperatura deri 35 grade C.

Nr dhe data e regjistrimit: 368, date 29.12.2010;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 lit.

Data e prodhimit ..... ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 2 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese..... ;

Tipi i amballazhit baze: shishe HDPE (High density polyethylene).

Emri dhe adresa e Aplikantit: Corteva Agriscience International Sàrl. Adresa: Versoix, Zvicër;

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Corteva Agriscience International Sàrl. Adresa: Versoix, Zvicër;