

VERTIMEC 1,8 EC

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“KUJDES”

“Lexo etiketen para përdorimit”

VERTIMEC 1,8 EC është akaricid - insekticid, me veprim të brendshëm dhe kontakti.

GRUPI 6 INSEKTICID

Lënda vepruese: Abamectin 1,8 %

Formulimi: Koncentrat i emulsionueshem (EC)

Deklaratat e rrezikut

H302: E dëmshme nëse gëlltitet.

H319: Shkakton irritim të rëndë syri.

H335: Mund të shkaktojë irritim në frymëmarrje.

H373: Mund të shkaktojë dëme në organe pas ekspozimit të tejkzgjatur ose të përsëritur. Përmban abamectin dhe Cyclohexanol.

H410: Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

EUH401: Për të shmangur risqet ndaj shëndetit njerëzor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet për përdprimin.

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P405+102: Magazinojeni të kyçur. Mbajeni larg fëmijëve.

P270: Mos hani ushqim, pini lëngje ose duhan kur përdorni këtë produkt.

P260: Mos thithni mjegullën e spërkatjes.

P264: Lani me kujdes lëkurën par trajtimit.

P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse personale për sytë/fytyrën. Vishni veshje të plota mbrojtëse, çizme dhe doreza kur përzieni/ngarkoni dhe spërkatni Vishni uniformë pune kur rihyni në parcelat e trajtuara përpara se të thahet lëngu spërkatës.

P501: Hidheni përmbajtjen/kontejnerin sipas ligjit kombëtar.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Mbani në dispozicion paketimin, etiketën ose MSDS e produktit në rast se kërkon ndihmë nga mjeku ose nga Qendra e Helmimeve.

P314: Konsultohuni/vizitohuni tek mjeku nëse nuk ndiheni mirë.

P305+P351+P338: NË RAST KONTAKTI ME SYTË: Shpëllajini me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse kenë. Vazhdoni shpëlarjen.. P337+P313: Nëse irritimi i syve vazhdon: Konsultohuni /Vizitoni një mjek.

Në rast gëlltitje: Mos shkaktoni të vjella. Thërisni mjekun dhe tregojini etiketën.

Në rast kontakti me lëkurën: Hiqni rrobat e ndotura dhe shpëlani pjesët e prekura të trupit me ujë. Nëse acarimi vazhdon, i telefononi mjekun. Lani rrobat e ndotura përpara se ti vishni përsëri.

P304+P340: NËSE MIRRET ME ORGANËT E FRYMËMARRJES: Nxireni të aksidentuarin në ajër të pastër dhe lëreni të pushojë në një pozicion që lehtëson frymëmarrjen

P312: Telefononi një QENDËR HELMINI apo një doktor nëse nuk ndiheni mirë.

ANTIDOTI: Nuk ka antidot të njohur. Ndiqni trajtim simptomatik. Evitoni dhënjën e barbiturateve, benzodiazepinave dhe acidit valproik. Në rast gëlltitje, jepni 2-3 gota ujë dhe shkaktoni të vjella, vetëm nëse pacienti nuk ka humbur ndjenjat, me irritim të faringut.

Përdorimi:

Agrume: 20-50 ml/100 lit ujë, për kontrollin e këpushave (*Panonychus spp.*, *Tetranychus spp.*, *Eutetranychus*

spp., *Phyllocoptrura oleivora*, etj.) minatriçeve (*Phyllocnistis citrella*) dhe tripseve (*Scirtothrips* spp.).

Pemë frutore: 50-100 ml/100 lit ujë, për kontrollin e këpushave (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urtica*, *Epitrimerus pyri*, etj.), pleshtave (*Psylla* spp.) dhe minatriçeve (*Leucoptera*, *Lithocolletis*, *Phyllonorycter*).

Hardhi: 50-100 ml/100 lit ujë, për kontrollin e këpushave (*Tetranychus* spp., *Eotetranychus carpini*, *Panonychus ulmi* etj.).

Perime: 50-100 ml/100 lit ujë, për kontrollin e këpushave (*Tetranychus* spp., *Aculops lycopersici*, *P. latus*, etj.), tripsit (*Frankliniella occidentalis*), tenjës (*Plutella xylostella*) dhe liriomizës (*Liriomyza* spp.).

Patate: 50-100 ml/100 lit ujë, për kontrollin e buburecit (*Leptinotarsa decemlineata*), tenjës (*Phthorimea operculella*) dhe liriomizës (*Liriomyza* spp.).

Luleshtrydhe: 50-100 ml/100 lit ujë, për kontrollin e këpushave dhe liriomizës (*Liriomyza* spp.).

Bimë zbukuruese: 25-100 ml/100 lit ujë, për kontrollin e këpushave (*Tetranychus* spp.) dhe liriomizës (*Liriomyza* spp.).

Koha e trajtimit: Trajtimet fillojnë me shfaqjen e dëmtuesve dhe shënjave të para të infeksionit dhe përsëriten çdo 7 ditë.

Mënyra e përdorimit: Me spërkatje.

Verejtje per perdorimin:

Nuk rekomandohet përzjerja me preparate të tjera. Lejohet vetëm për përdorime që lejojnë shkëmbimin e kontrolluar të materialit dhe energjisë me mjedisin përreth dhe parandalojnë lëshimin e produktit në mjedis, veçanërisht përdorimet në serra të përhershme.

Duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për:

- mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, si përdorimi i dorezave;
- efektin e fotolizës në nivelet e mbetjeve të pesticideve në kultura.

Vëmendje e veçantë kërkohet për të siguruar që provat e disponueshme të mbetjeve në kulturat bujqësore, pasqyrojnë situatën më kritike të mbetjeve. Kur është e përshtatshme, në varësi të zonës, të zbatohen kufizime sezonale për kohën e aplikimit.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret në kulturat dhe dozat e rekomanduara në kete etikete.

Ndikimi ne ekosistem:

H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata. Përmban cikloheksanol dhe hydroxytoluene të butilizuar. Evitoni shpërndarjen e tretësirës spërkatëse në sipërfaqet ujore. Mos e ndotni ujin me preparatin ose ambalazhin.

SP1: Mos ndotni ujrën me preparatin ose me ambalazhin e tij. Mos i lani pajisjet e spërkatjes pranë ujrave sipërfaqësore.

SPe3: Për të mbrojtur organizmat ujorë dhe organizmat jo objekt luftimi të zbatohen masat e mëposhtme mbrojtëse:

- Për trajtimet në kulturat gjethegjera dhe perime, lini një zonë mbrojtëse të paspërkatur prej 10 m.
- Për trajtimet e hardhisë lini një zonë 10 m të pa spërkatur ose alternativisht një zonë 3 m të paspërkatur në kombinim me përdorimin e sprucatorëve që ulin 90% shpërndarjen e lëngut spërkatës.
- Për trajtimet e agrumeve lini një zonë 20 m të pa spërkatur ose alternativisht një zonë 10 m të paspërkatur në kombinim me përdorimin e sprucatorëve që ulin 75% shpërndarjen e lëngut spërkatës.
- Për trajtimet e kulturave të tjera lini një zonë 30 m të pa spërkatur ose alternativisht një zonë 15 m të paspërkatur në kombinim me përdorimin e sprucatorëve që ulin 90% shpërndarjen e lëngut spërkatës.

SPe3: Për të mbrojtur artropodët jo objekt luftimi të zbatohen masat e mëposhtme mbrojtëse:

- Për trajtimet e agrumeve, lini një zonë të pa spërkatur prej 15 m.
- Për trajtimet në kulturat gjethegjera dhe perime, lini një zonë 5 m të pa spërkatur, nga tokat e papunuara.

Spe8: Mundësisht e rrezikshme për bletët. Për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos e përdorni produktin në kulturat bujqësore gjatë lulëzimit ose gjatë periudhës së lulëzimit të barërave të këqija. Mos e përdorni produktin gjatë sezonit kur bletët janë duke punuar. Për të mbrojtur bletët, bletarët në zonë duhet të informohen në mënyrë që bletët të largohen nga zona për të paktën:

- 39 orë nga koha e trajtimit në agrumet,

- 43 orë nga koha e trajtimit në kulturën e domates në fushë të hapur,
- 96 orë nga momenti i trajtimit në kulturat e serrave për të vendosur pjalmues/bletë në serra.

Karenca:

Agrume 7 ditë; Pemë frutore 10 ditë; Hardhi 21 ditë; Perime e lule shtrydhe 3 ditë; Patate 14 ditë.

Magazinimi:

Ruhet në vende të mbrojtura nga dielli dhe lagështia, në ambalazhin original. Evitoni magazinimin në ambjentet me temperature nën -10°C dhe mbi 35°C .

Nr dhe data e regjistrimit: 181/3; date 6.12.2023.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 litër.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: shishe HDPE (High density polyethylene) dhe f-HDPE.

Emri dhe adresa e kerkuesit: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Basel, Switzerland.

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Basel, Switzerland.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet ne Republiken e Shqiperise):