

ALVERDE

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



GHS07 GHS 08 GHS09

Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit

ALVERDE është insekticid sistemik, me veprim kontakti dhe ngrënieje në formë të koncentratit të suspendueshëm (SC). Përdoret në kulturën e patates për kontrollin e buburrecit të patates, në kulturën e lakrës për kontrollin e fluturës së bardhë të lakrës, si edhe në kontrollin e shumë dëmtueseve të tjerë në kultura të ndryshme bujqësore.

Mekanizmi veprimit: **IRAC grup 22B.**

Formulimi: *Suspension i koncentruar (SC).*

Përmbajtja: *Metaflumizone (BAS 320 I) 240 gr/lit.*

Masat parambrojtëse:

Deklaratat e rrezikut:

H319: Shkakton acarim serioz të syve.

H373: Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të zgjatur dhe të përsëritur.

H361fd: Dyshohet se shkakton dëmtim të pjellorisë ose të fëmijës së palindur.

H362: Mund të shkaktojë dëmtime për fëmijët që ushqehen me gjë.

H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme.

EUH401: Të evitohen rreziqet e shëndetit të njeriut dhe ambientit, në përputhshmëri me instruksionet për përdorim.

Deklaratë paraprake:

EUH208: Mund të prodhojë reaksion alergjik, Përmban 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.

P102: Mbajeni larg fëmijëve.

P103: Lexoni etiketën para përdorimit.

Deklaratë përkujdesjes:

P260: Shmangni frymëmarrjen pranë mjegullës apo avujve.

P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.

P202: Mos trajto deri sa të keni lexuar e kuptuar të gjithë paralajmërimet e sigurisë.

P263: Shmangni kontaktin gjatë shtatëzanisë/dhënies gjë.

P270: Gjatë përdorimit mos pini, mos hani dhe mos pini duhan.

P264: Lahuni me ujë të bollshëm dhe sapun tërësisht pas trajtimit.

P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse për fytyrën/pajisje mbrojtëse për sytë.

Evitoni kontaktet e zgjatura të syve dhe lëkurës dhe marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjatë punës.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese (Reagimi):

P305+P351+P338: Në rast kontakti në sy: Shpëlajeni sytë me kujdes me ujë të bollshëm. Hiqni lentet kontaktit nëse është e mundur, dhe shpëlajeni sërish.

P391: Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet.

P308 + P313: Nëse je ekspozuar dhe je i shqetësuar: Merrni këshilla/kujdes mjekësor.

P337 + P313: Nëse irritimi në sy vazhdon: Merrni këshilla/kujdes mjekësor.

Deklarata paraprake (Ruajtja):

P405: Mbajeni të kyçur.

Deklarata parandaluese (Shkatërrimi):

P501: Shkatërrimi i përmbajtjes së shisheve në përputhje me rregullat në fuqi.

Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Kontakti i shërbimit Toksikologjisë Klinike - QSUT Telefon: +355 4 2349233, Urgjenca (për Tiranën): +355 4 222235 Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë.

Përdorimi:

Patate: kundër burrecit (*Leptinotarsa decemlineata*), duke qenë efektiv tek faza larvare dhe adulte, me 0.2-0.25 lit prep/ha, me 300 lit ujë.

Speci në sera dhe domatja në fushë dhe serë: kundër *Lepidoptereve* si: Noctuidae (*Heliothis* spp., *Earias* spp., *Spodoptera* spp., *Agrotis* spp, *Pseudoplusia*, *Trichoplusia*, *Alabama argillaceae*); Crambidae (*Chilo*, *Ostrinia*, *Hellula*, *Lerodea*, *Leucinodes*, *Neoleucinodes*); Gelechiidae, Pieridae, Plutellidae (*Anarsia*, *Tuta absoluta*, *Keiferia*, *Pieris*, *Plutella xylostella*);

Lakër: për kontrollin fluturës së bardhë të lakrës (*Pieris brassicae* Gracillariidae (*Phyllonorycter*, *Phyllocnistis*), fluturës së bardhë të lakrës (*Pieris brassicae*). Është efektiv në fazën larvare.

Përdoret me 1 lit prep/Ha, të tretur në 400-800 lit ujë.

Numri i trajtimeve/sezon: 1-3.

Vërejtje për përdorimin:

Në fillim përziehet preparati me pak ujë dhe, kur të jetë homogjenizuar mirë, shtohet sasia tjetër e ujit. Nuk përziehet me produkte alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret në kulturat e mësipërme dhe sipas dozave të rekomanduara.

Ndikimi në ekosistem:

Mesatarisht helmues për gjitarët. Mesatarisht helmues për zogjtë. Pak helmues për bletët. Mesatarisht helmues për peshqit. Mesatarisht helmues për jovertobroret ujorë. Mos ndotni ujërat dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Koha e pritshmërisë (karenca):

Për pataten dhe kultura të tjera 14 ditë; Lakër 7 ditë.

Magazinimi:

Ruajeni në ambalazhin origjinal, në vende të thata e të ajrosura, të shmanjura nga rrezet direkte të diellit dhe brenda kufirit të temperaturave 0-40°C.

Numri dhe data e regjistrimit: 383; datë 18.03.2011.

Sasia neto e PMB-së, që ndodhet në ambalazhin bazë: 100 ml.

Bar kodi përkatës:

Data e prodhimit:Printuar nga makineria në ambalazh.....;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese: Printuar nga makineria në ambalazh.;

Tipi i ambalazhit bazë: shishe HDPE (High density polyethylene).

Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF SE. **Adresa:** 67056 Ludwigshafen, Gjermani;

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-së: BASF SE. **Adresa:** 67056 Ludwigshafen, Gjermani;

Distributori për Shqipërinë: AgroHelp-SA. Sh.p.k. **Adresa:** Autostrada Tiranë-Durrës, Km22, Xhafzotaj Durrës.