

ASCOT

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

ASCOT është insekticid piretroid me spektër të gjerë. Vepron në kontakt dhe përmes stomakut, me veprim parandalues dhe vrases, për kontrollin e insekteve me aparat gojor thithës dhe përtypës në kultura të ndryshme. Vepron në sistemin nervor të insekteve duke parandaluar mbylljen e kanaleve Na⁺ në aksonet e qelizave nervore. Kjo rezulton në një transmetim të vazhdueshëm neuromuskular të mesazheve, gjë që çon në mbistimulim, paralizë dhe vdekje të insekteve.

Lënda vepruese: 25 gr/kg Lambda cyhalothrin.
Formulimi: Granula te tretshme ne uje (WG)

Masat parambrojtëse:

- P102: Mbajeni në vende të sigurta dhe të pa arritëshme nga fëmijët.
- P201: Merni udhezimet e vecanta para perdorimit.
- P264: Lani menjehere pas trajtimit te gjitha pjesete e zbuluara te trupit dhe robot e kontaminuara.
- P270: Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe duhan.
- P273: Shmangni shkarkimet dhe derdhjet ne mjedis te preparatit..
- P280: Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- P308+P311: Ne rast ekspozimi dhe shqetesimi telefonini menjehere qendren me te afert shendetesore dhe konsultohuni me nje mjek.
- P501: Mblidhni ambalazhet në kontenierë të veçantë dhe bëni shkatërrimin e tyre sipas rregullave në fuqi.

Udhëzim për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- P302+P352: Ne rast kontakti me lekuren lahuni me uje te bollshem dhe sapun. Lani pajisjet mbrojtëse pas perfundimit te punes;
- P333+P313 - Nëse shfaqet acarim i lëkurës ose skuqje: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore
- P305+P351+P338: Ne rast se solucioni bie ne sy, shpelajini me kujdes per disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit dhe vazhdoni shpelarjen;
- P301+P330+P331: Ne rast gelltitje, shplani gojen me uje te bollshem dhe mos provokoni te vjella.
- Trajtimi mjekësor: Bëni lavazh të stomakut duke patur kujdes të evitoni thithjen e përmbajtjeve të tij. Jepini karbon aktiv dhe purgativ.
- EUH401 Zbatoni udhezimet per perdorim per te shmangur rreziqet ndaj shendetit njerezor dhe mjedisit.
- Antidot nuk njihet. Mjekim simptomatik.

Përdorimi:

Agrume: për kontrollin e afideve mizes mesdhetare Cicalinave e Coçiniljeve.

Peme frutore berthamore: për kontrollin e afideve.), Lepidoptereve tripsit te luleve, Tripideve mizes mesdhetare e Cicalinave,

Peme frutore farore: për kontrollin e afideve , Psillave, Microlepidoptereve, Krimbit (C. pomonella),

Cydia molesta, Lepidoptereve ricamatore zhuzhakut (Melolontha melolontha).

Vresht: për kontrollin e tenjave (L. botrana e C. ambiguella), cicalinave (E. vitis, Z. rhamni, S. fifanus), mizes mesdhetare (C. capitata) e tripsit te luleve

Ullinj: për kontrollin e tenjes (P. oleae), mizes (D. oleae), cocciniljeve (C. oleae).

Perime, Patate, Bishtajore: për kontrollin e afideve tripideve (T. tabaci, T. angusticeps, F. occidentalis e F. intonsa), bubrecit te patates mizes se bardhe (T. vaporariorum), piralideve (O. nubilalis, etj.), noctuidev (M. brassicae, M.oleracea, G. xanthenes, Pieris spp., Heliothis spp., Spodoptera spp., etj.), tenjes se patates.

Miser, grure, sorgum: për kontrollin e afideve (Rhopalosiphum spp.), cecidomia (H. eguesi) piralideve (O. nubilalis), lemes, noctuideve (Sesamra spp., Agrotis spp.), Diabrotica virgifera e zabrusit (Z. tenebrioides), Lema melanopus .

Bime zbkuruese dhe pyjore: për kontrollin e afideve tripideve (T. tabaci, T. Angusticeps, F. occidentalis, F. intonsa), mizes se bardhe (T. vaporariorum), lepidoptere te tjere (C. pronubana, H.cunea, Todrix viidana, etj).

Doza me perdorimit: Tek te gjitha kulturat doza e perdorimit eshte 40-80 gr/100 lit. Sasia e solucionit sperkates eshte 500- 1000 lit/ha.

Mënyra e përdorimit: Me spërkatje, gjatë së cilës duhet të sigurohet lagje e mirë bimëve (deri sa të filloj të pikoj në tokë).

Koha e spërkatjes: Spërkatjet duhet të bëhen sapo të duken shënjat e para të infeksionit, ose sipas përvojës së agronomëve të zonës. Kohëzgjatja e veprimit në kushte infeksioni mesatar deri te larte zakonisht është 21 ditë.

Fitotoksiciteti: Nuk është fitotoksik nëse përdoret me dozën e rekomanduar.

Verejtje per perdorimin: Përzihet me insekticidet dhe fungicidet e zakonshme.

Ndikimi ne ekosistem: Mesatarisht helmues për bletët. Mos spërkatni bimët, pjalmimi i të cilave varet nga bletët, 1 javë para lulëzimit. Helmues për peshqit. Mos ndotni pellgjet dhe rrugët e ujit me produktin, tepricat e tretësirës spërkatëse ose ambalazhin bosh.

Karenca: Në perime, pemë frutore, vresht dhe agrume 7 ditë; patate dhe grurë 1 ditë; misër, sojë, pambuk dhe ulli 15 ditë; lulediell 21 ditë.

Magazinimi: Preparati ruhet në ambalazhin original, në vende të ajrosura, pa lagështi dhe jo në kontakt me rrezet e diellit, në temperatura 0-35o C.

Nr dhe data e regjistrimit:

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 25 gr - 25 kg.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: Material i pa pershkueshem nga lageshtia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: **QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.** C/ Valle del Roncal 12, 1ª Planta, Oficina 7, 28232, Las Rozas, Madrid, Spanjë.

Emri dhe adresat e fabrikuesit te PMB-se: **QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.** C/ Valle del Roncal 12, 1ª Planta, Oficina 7, 28232, Las Rozas, Madrid, Spanjë.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise):