

SERCADIS PLUS

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



GHS08



GHS09

“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

SERCADIS PLUS është fungicid sistemik me përmbajtje *Fluxapyroxad* dhe *Difenoconazole* të cilat kanë mekanizëm të ndryshëm veprimi; parandalues me afat të gjatë dhe kurativ. Është shumë efektiv në kontrollin e hireve, alternarias, kalbëzimeve, ndryshkut dhe antraknozës, në bimët solanaore, kungullore, rrepkë dhe lule shtrydhe; kalbëzimeve, alternaries, ndryshkut, antraknozës, mikosferelës dhe *Stenfilium spp.* në lakër, perimet gjethore dhe fruttrënjore; ndryshkut (*Uromyces pisi*), kalbëzimit dhe antraknozës në bizele; hirit, kalbëzimit dhe kanceri gomoz në kungullore; kromave dhe hirit në mollë dhe dardhë

Lënda vepruese: *Fluxapyroxad* 6.98 gr (=75 gr/lit)+*Difenoconazole* 4.66 gr (=50 gr/lit)

Formulimi: *Suspension i koncentruar (SC)*

Masat parambrojtëse:

Deklaratat e rrezikut

H351: Dyshohet se shkakton kancer

EUH401: Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit, në përputhshmëri me instruksionet.

Deklarata parandaluese (Parandalimi)

P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.

P102 Mbajeni në vende të sigurta larg fëmijëve.

Mbajeni larg pijeve dhe ushqimeve për njerezit dhe blektorinë.

P103 Lexoni etiketën para përdorimit.

P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.

P202: Mos trajto deri sa të keni lexuar dhe kuptuar masat e sigurisë

P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse për fytyrën/pajisje mbrojtëse.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

P308+P311: Nëse je ekspozuar dhe nëse nuk ndjeheni mirë. Telononi qendrën e helmimeve ose një mjek.

Në rast helmimi, kërkonij kujdesin mjekësor; merrni ndihmën e parë

Terapia: simptomatike. kontaktoni Qendrën Helmimeve

Deklarata parandaluese (Ruajtja)

P405: Mbajeni të kyçur.

Deklarata parandaluese (Shkatërrimi)

P501: Shkatërroni ose largoni i përmbajtjen/ambalazhin në përputhje me rregullat në fuqi.

Përdorimi:

Kulturat	Sëmundja	Doza ml/100 litra	Doza litra/Ha	Intervali midis trajttimeve	Nr.maksimal i trajttimeve në vit
Mollë dhe dardhë	Kromat: (<i>Venturia spp</i>)	-	1.2 lit, në 200-1200 lit ujë/Ha	7ditë	2
	Hiri (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	-	0.72 lit. në 200-1200 lit ujë/Ha	10ditë	2
Patate	Alternaria	-	0.75 lit në 200-600 lit ujë/Ha	7ditë	2
Domate, Spec, Patëllxhan	Hiri (<i>Leveillula taurica</i>)	60	0.6	7ditë	2
	Alternaria	100	1.0	7ditë	2
Shalqi, Pjepër, Kastarvec, Kungull	Hiri (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera fuliginea</i>) <i>Mycosphaella melonis</i> , <i>Didymella bryoniae</i>	60	0.6	7ditë	3
Sallatë	Kalbëzimi (<i>Sclerotinia sp.</i>)	120-200	1.2-2.0	-	1
Bizele	Kalbëzimi (<i>Sclerotinia sp.</i>) ndryshku (<i>Uromyces pisi</i>) antraknoza	200	2.0	-	1

Lakër, Lulelakër, Brokoli, Lakër brukseli, etj.	Alternaria, njollosja kafe e lakrës <i>Mycosphaerella brassicicola</i> , <i>Stenfilium (Stemphylium sp.)</i> ,	100	1.0	7ditë	3
Kopër Selino	<i>Sclerotinia sp.</i>	200	2.0	-	1
Rrepka	Hiri	60	0.6	7ditë	2
Luleshtrydhe	Hiri	60	0.6	7ditë	3

Vërejtje për përdorimin:

SERCADIS PLUS është i pajtueshëm me shumicën e PMB-ve. Përpara përzierjes bëni një provë. Për të shmangur fenomenin e rezistencë mos trajtoni më shumë se 2-3 herë/sezon.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret në kulturat e mësipërme dhe sipas dozave të rekomanduara.

Karenca:

Në mollë dhe dardhë 35 ditë, sallatë, lakër, lulelakër, brokoli, çikore, kopër, selino 14 ditë; bizele, karrotë, majdanoz, rrepkë 7 ditë; domate, patëllxhan, spec, shalqi, pjepër, kastarvec, kungull, patate 3 ditë; luleshtrydhe 1 ditë.

Ndikimi në ekosistem:

H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Ky material dhe ambalazhi duhet të eliminohen në mënyrë të sigurtë. Mos ndotni ujërat me produktin ose ambalazhet e tij. Mos pastroni pajisjet spërkatëse pranë ujërave sipërfaqësorë. Evitoni ndotjen nëpërmjet rrjedhjes. Pastrojeni ambalazhin me shpëlarje të trefishte. Për pastrim mbusheni ambalazhin me ujë në 1/3 e sasisë dhe tundeni për 1-2 min, këtë përsëriteni dhe dy herë të tjera.

Magazinimi:

Ruajeni në ambalazhin original, në vende të thata, të ajrosura e te pa ekspozuara nga drita direkte e diellit.

Nr dhe data e regjistrimit : Nr. 716, datë 8.5.2019

Sasia neto e PMB-së, që ndodhet në ambalazhin bazë: 0.1-5 lit.

Data e prodhimit: (Printuar nga makineria në ambalazh).....;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vite;

Nr i serisë ose shenja të tjera identifikuese: (Printuar nga makineria në ambalazh).....;

Tipi i ambalazhit bazë: shishe HDPE

Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agro B.V. **Adresa:** Zyrih Zvicër.

Emri dhe adresa e fabrikuesit: BASF Agro B.V. **Adresa:** Zyrih Zvicër.