

VELUM PRIME

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

VELUM PRIME është nematocid/fungicid për kontrollin e nematodave dhe disa sëmundjeve kërpudhore në perime (në sera).

EUH 208-Permban: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon dhe 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Mund të shkaktojë reaksione alergjike.

Lëndët vepruese: *Fluopyram 400 gr/litër;*

Formulimi: *Koncentrat i suspendueshëm (SC).*

Ngjyra: *E bardhë në bezhë.*

Frazat e rrezikut dhe kujdesit:

H410 Shume toksike për jeten ujore me efekte afatgjata.

EUH208 Permban: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon dhe 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Mund të shkaktojë reaksione alergjike.

P102 Mbajeni larg fëmijëve.

P273 Shmangni shkarkimet, derdhjet në mjedis.

P281 Përdor paisjet mbrojtëse sipas kërkesave.

P391 Mblidheni produktin që derdhet.

P501 Asgjësoni përmbajtjen/enën në përputhje me rregullat në fuqi.

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni në vende të sigurt dhe të pa arritëshme nga fëmijet.
- Ruajeni larg ushqimeve e pijeve për njerëzit si dhe ushqimeve për blegtorinë.
- Evitoni kontaktin e produktit me lëkurën dhe sytë.
- Gjatë punës mos hani dhe mos pini lëngje e duhan.
- Para fillimit të punës vishni rrobat e punës dhe paisjet mbrojtëse.
- Lani duart dhe pjesët e ekspozuara të lëkurës me ujë dhe sapun.
- Pas përfundimit të punës lani të gjitha paisjet.
- Ambalazhi bosh të asgjësohet sipas rregullave në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- Në rast marrje me organet e frymëmarrjes, nxireni të aksidentuarin në ajër të pastër. Nëse simptomat vazhdojnë, kërkon ndihmë mjekësore.
- Irritues për lëkurën. Në rast kontakti me lëkurën, hiqni rrobat e ndotura, lani menjëherë pjesët e kontaminuara me ujë të bollshëm dhe sapun.
- Në rast kontakti me sytë, shplajini ata me ujë të bollshëm gjithashtu edhe nën qepalla për të paktën 15 minuta. Nëse keni lente kontakti, hiqini ato dhe vazhdoni shpëlarjen e syve. Nëse irritimi vazhdon, konsultojuni me mjekun.
- I dëmshëm nëse gëlltitet. Në rast se produkti është gëlltitur mos shkaktoni të vjella. Shpëlani gojën dhe kërkon ndihmë mjekësore.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi sipas simptomave. Nëse është gëlltitur më shumë se një gojë plot preparat, përdoret qymyr aktiv. Normalisht nuk kërkohet lavazh stomaku.

Përdorimi:

Në domate, patëllxhan, spec, trangull, kungull i njomë, pjepër, shalqin dhe kungull (në sera): për kontrollin e nematodave galeformuese (*Meloidogyne spp.*). Bëhet trajtimi i tokës nëpërmjet ujitjes me pika (duke përdorur tubat e shpuar).

Periudha e përdorimit	Doza (L/ha)	Max i aplik/vit	Ujë L/ha)	Mënyra e përdorimit; ujitje me pika
Para trapiantimit	0,375-0.625	2	2000-6000	Trajto 1-3 ditë para trapiantimit. Përsërit trajtimin 15-30 ditë pas trapiantimit.
Pas trapiantimit	0,375-0.625	2	2000-6000	Trajto 1-3 ditë pas trapiantimit. Përsërit trajtimin 15-30 ditë pas trapiantimit

Me ujitje me pika, përdor fillimisht 50 % të sasisë së ujit të nevojshëm për ujitje, para përdorimit të produktit. Pastaj përdor 40 % të sasisë së ujit, duke shtuar produktin. Në fund përdor 10% të mbetur të sasisë së ujit. Produkti i përdorur për këtë qëllim, është gjithashtu efikas për kontrollin e hireve (*Leveillula taurica*, *Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*) për një periudhë 30-60 ditë. Megjithatë, në vartësi të rrezikut të infeksionit, duhen përdorur edhe produkte për trajtim gjethor.

Vërejtje për përdorimin:

Doza minimale përdoret vetëm në rastet e infeksioneve të ulëta. Nuk duhet përdorur për kontrollin vetëm të hirit. Produktet me bazë fluopyram nuk duhet të përdoren më tepër se 2 herë/sezon. Nuk duhet përdorur i kombinuar me produkte të tjera. Nuk duhet përdorur në farishte.

Fitotoksiciteti:

Në tranguj mund të jetë fitotoksik.

Ndikimi në ekosistem:

Ka efekt të gjatë helmues për organizmat ujore. H410-Shume toksike për jeten ujore me efekte afatgjata. Mos ndotni ujrat dhe burimet ujore që rrjedhin në lumenj e rezervuare uji.

Karenca:

1 ditë për trangullin e kungullin e njomë; 3 ditë për domaten, patëllxhanin, specin, pjepërin, shalqinin e kungullin.

Magazinimi:

Ruhet në vende të thata, në temperatura 0-40° C.

Data dhe nr i regjistrimit: 681; 7.6.2017

Data e prodhimit: Shih sipër ambalazhit

Periudha e ruajtjes: 4 vjet.

Nr. serisë:

Pesha neto: deri 1 litër.

Tipi i ambalazhit bazë: shishe HDPE ose COEX.

Aplikanti: Bayer d.o.o. **Adresa:** Ljubljana, Sloveni.

Prodhuesi: Bayer AG. **Adresa:** Leverkusen, Gjermani.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet në Republikën e Shqipërisë):