

KAPLAN 80 WG

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“KUJDES”

Lexo fleteudhezuesin para përdorimit

KAPLAN 80 WG është fungicid në formën e kokrrizave për përgatitjen e një pezullimi uji me efekt sipërfaqësor të destinuar për përdorim parandalues dhe ndërhyrës

Përmbajtja: *Captan 800 g/kg (80%)*

Formulimi: *Granula te dispergueshme në ujë WG*

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni në vënde të sigurt dhe të pa arritëshme nga fëmijët;
- Evitoni kontakte të zgjatura të syve dhe lëkures me preparatin;
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkates dhe gjatë spërkatjes;
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe tymos duhan;
- P280-Përdorni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtëse për sytë/mbrojtje për fytyrën;
- P305+P351+P338- NËSE PRODUKTI BIE NË SY: Shpëllajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t'u bërë. Vazhdoni shpëllarjen;
- P302+P352- Në rast të kontaktit me lëkurën: lani me shumë ujë/sapun;
- P332+P313- Nëse ndodh acarimi i lëkurës: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.
- Mblidhni produktin e derdhur.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- H302- E dëmshme nëse gëlltitet;
- H317- Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës;
- H319-Irrituese për sytë;
- H351-Dyshohet se shkakton kancer;
- H400-Shumë toksike për organizmat ujorë;
- Në rast thithje të tretësirës spërkatese me organet e frymëmarrjes i aksidentuari vendoset në një mjedis të ngrohtë dhe të ajrosur;
- Në rast helmimi kerkoni menjëherë ndihmë në qendrën më të afërt spitalore, duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti. Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave
- Antidot: asnjë, trajtohet në mënyrë simptomatike;
- Nëse nevojitet këshillë mjekësore, keni në dorë enën ose etiketën e produktit;
- Nëse gëlltitet: Thirrni një qendër helmi ose mjek nëse nuk ndiheni mirë. Shpëllarje gojën.

Përdorimi:

Në Vreshta për kontrollin e vrugun, kalbezimin e zi dhe gri, antraknozen dhe nekrozen.

Doza maksimale/e rekomanduar për një përdorim të vetëm: 1,2 kg/ha. Përdorni produktin profilaktikisht, sipas sinjalizimit ose kur vërehen simptomat e para të sëmundjes, nga faza e sythave të luleve të dukshme (BBCH 55). Në sezon, kryeni 8-10 trajtime, çdo 7-8 ditë. Vendoseni agjentin derisa fruti të arrijë gjysmën e madhësisë së tij tipike (BBCH 75). Trajtimi i fundit duhet të kryhet të paktën 28 ditë para korrjes së planifikuar. Numri maksimal i trajtimeve gjatë sezonit të rritjes: 10. Intervali ndërmjet trajtimeve: të paktën 7 ditë. Sasia e rekomanduar e ujit: 600-700 lit/ha.

Në pemë frutore berthamore, kundër kalbëzimit të frutave, gjethepërdredhësës dhe gjethebirueses.

Spërkatjet kryhen në vjeshtë, pas rrëzimit të gjetheve dhe, në pranverë, pak para fryrjes së sytheve, si dhe

pas rënies së petaleve.

Në pemë frutore farore, kundër kromës. Spërkatjet kryhen në hapjen e sytheve, në butonizimin e kuq si dhe në rrëzimin e petaleve.

Në agrume, kundër gomozës dhe fomezës. Trajtimet fillojnë me cfaqjen e simptomave të para.

Në perime dhe patate, kundër kalbëzimeve të ndryshme të fidanëve në shtretër, kalbëzimit gri, alternariozave, septoriozave, kalbëzimit të bardhë, kladosporiozës, antraknozave dhe vrugjeve. Trajtimet fillojnë me shfaqjen e simptomave të para.

Në bimët zbukuruese, kundër kalbëzimeve të fidanëve (gjinite *Pythium spp.*, *Rhizoctonia spp.*).

Doza e përdorimit në të gjitha kulturat është 150 gr/100 lit ujë.

Vërejtje për përdorimin:

Sigurohuni që spërkatësi nuk ka mbetje të ngurta ose të lëngshme nga trajtimi i mëparshëm. Mbushni rezervuarin me gjysmën e vëllimit të kërkuar të ujit të pastër dhe vendosini në punë perzieresin. Ngadalë shtoni sasinë e kërkuar të produktit. Shtoni pjesën tjetër të ujit duke mbajtur në punë perzieresin gjatë gjithë periudhës së trajtimit. Shpëlajeni paketën e produktit bosh tre herë dhe derdhni ujin e largës në rezervuar.

Shpëlajini të gjitha enet dhe pajisjet e matjes me ujë menjëherë pas përdorimit duke hedhur ujin në rezervuar.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të etiketës.

Ndikimi në ekosistem:

EUH 401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim. Mos e ndotni ujin me produkt mbrojtës të bimëve ose paketimin e tij. Mos i lani pajisjet në afërsi të ujit sipërfaqësor. Shmangni ndotjen e ujërave përmes kanaleve kulluese nga fermat dhe rrugët. Shmangni lëshimin e paqëllimtë në mjedis. Gjatë lulëzimit të të korrave, rekomandohet përdorimi i produktit jashtë periudhës së aktivitetit të bletëve.

Përdorimi i vetëm i produktit: Për të mbrojtur bimët dhe artropodët jo-shënjestër, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me një gjerësi prej 3 m nga zonat që nuk përdoren për bujqësi. Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse nga rezervuarët dhe rrjedhat e gjera të ujit: 45 m terren të mbuluar 20 m të gjerë ose, 35 m të mbuluara me ujë mbi një gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 50% ose, 25 m terren me gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 75% ose, 20 m terren me gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 90%. Përdorimi i produktit në një përzierje rezervuari: Për të mbrojtur bimët dhe artropodët jo-shënjestër, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me një gjerësi prej 3 m nga zonat që nuk përdoren për bujqësi. Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse nga rezervuarët dhe rrjedhat e gjera të ujit: 40 m terren, 20 m i gjerë ose, 30 m terren me gjerësi 20 m, me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë rrjedhjen e lëngut të punës gjatë trajtimit me 50% ose, 20 m terren me gjerësi 20 m, me zbatimin e njëkohshëm të teknikave që zvogëlojnë domethënien e lëngut të punës gjatë trajtimit me 75%.

Karenca:

Rrush 40 ditë; berthamore 20 ditë; bajame 30 ditë; farore 15 ditë; trangull pjeper dhe shalqinj 20 ditë; domate 14 ditë.

Magaznimi:

Ruani produktin në enën të mbyllur origjinale, në një vend të sigurt, të freskët e të thata dhe të ajrosur mirë, të mbrojtur nga ngricat në një temperaturë optimale 0⁰ C -35⁰ C të pa ekspozuar nga rrezet direkte të diellit, larg ushqimeve dhe pijeve për njerezit si dhe ushqimeve për blegtorinë.

Numri dhe data e regjistrimit: 776/1, datë 26.11.2025;

Sasinë neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri në 25 kg;

Numrin e serisë ose shenja të tjera identifikuese: _____;

Data e prodhimit: _____;

Datën e skadencës së PMB-së: 3 vite nga data e prodhimit;

Llojin e ambalazhit bazë: Material 3-shtresor për mbrojtjen nga lagështia, Qese alumini;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Pestila Sp. z o.o. **Adresa:** Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz, Poloni;

Emri dhe adresa e kërkuesit: Pestila Sp. z o.o. **Adresa:** Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz, Poloni.