

MERPAN 80 WDG

“Produkt per mbrojtjen e bimeve”



“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

Fungicid kontakti me veprim parandalues kundër sëmundjeve në pemët frutore dhe kulturat e ndryshme perimore.

Lenda vepruese: *Captan 80 %*
Formulimi: *Granula te dispergueshme ne uje (WDG)*
Ngjyra: *Gri*

Masat parambrojtese:

P102: Mbajeni larg fëmijëve.

P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.

P273: Shmangni lëshimin në mjedis.

P280: Vishni doreza/veshje mbrojtëse/mbrojtëse për sytë/mbrojtëse për fytyrën.

P302 + P352: NËSE BIE NË LËKURË: Lani me shumë sapun dhe ujë.

P305 + P351 + P338: NËSE BIE NË SY: Shpëlani me kujdes me ujë për disa minuta. minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse i keni dhe nëse është e lehtë për t'u hequr. Vazhdoni shpëlarjen.

P391: Mblidhni derdhjen.

P501: Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në një pikë të përshtatshme grumbullimi të mbetjeve të rrezikshme.

SPe 3: Për mbrojtjen e organizmave ujorë, respektoni një zonë tampon të patrajtuar prej 15 m nga ujërat sipërfaqësore.

Udhëzime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

H317: Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës.

H319: Shkakton acarim serioz të syve.

H351: Dyshohet se shkakton kancer.

H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata.

EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet e përdorimit.

- Ne rast kontakti hiqni menjehere rrobat e ndotura. Lani menjehere pjeset e ndotura te trupit me uje te bollshem e sapun.
- Nese bie ne kontakt me syte kerkoni ndihme mjekesore.

- Nxireni të demtuarin në ajër të pastër. Nese i demtuari ka humbur ndjenjat, shtrijeni dhe transportojeni në pozicion anësor.
- Në rast se është gëlltitur mos provokoni të vjella, bëni lavazh të stomakut.
- Në rast demtimi kerkoni ndihmë mjekesore në qendrën spitalore me të afërt dhe tregojini mjekut etiketën.
- Nuk njihet antidoti specifik. Mjekimi simptomatik.

Perdorimi:

MERPAN 80 WDG është një fungicid kontakti, me veprim parandalues kundër një spektër të gjerë të kërpudhave fitopatogjene.

Depërton me shpejtësi në sporet e kërpudhave të ndjeshme, parandalon mbirjen e tyre ose ndalon rritjen e tubit embrional dhe depërtimin e tij në indet e bimëve, duke parandaluar kështu krijimin e infeksioneve në organet e trajtuara. Mekanizmi biokimik i substancës aktive i referohet bllokimit të frymëmarrjes dhe ndarjes qelizore të patogjenëve. Edhe pse nuk translokohet brenda indeve, produkti ngjitet shumë mirë në organet e trajtuara dhe është i vështirë për t'u larë nga shiu, duke arritur një periudhë mbrojtjeje prej 7-10 ditësh, varësisht nga kushtet lokale.

Për të rritur efektet maksimale të kontrollit, trajtimet aplikohen në mënyrë parandaluese kur krijohen kushtet për shfaqjen e sëmundjes, ose më së voni kur shfaqen simptomat e para.

Në pemet frutore farore:

-Molle, ftua, dardhe kunder: *Kromes (Venturia spp); Njolllosja kafe në dardhe (Stemphylium vesicarium), Kanceri i degeve (Nectria galigena), Monilinia spp; Physalospora obtusa; Helminthosporium spp.; Alternaria spp.; Phytophthora cactorum; Glomerella cingulata; Gloeodes pomigena; Neofabraea perennans; Mycosphaerella pomi; Botryosphaeria obtusa; Botryosphaeria ribis; Sëmundjet e magazinimit (Gleosporium spp).*

Doza e përdorimit 150-160 gr/100 lit ujë, maksimumi 2 kg/ha. Mos aplikoni më shumë se 10 trajtime në vit. Sasia totale e pesticideve të përdorura për hektar nuk duhet të kalojë 15.1 kg.

-Në pemet frutore berthamore:

- Pjeshke, Nektarine: *Kalbezimit (Monilinia spp); Gjethëperdredhësja (Taphrina deformans); Cladosporium carpophilum, Coryneum beijerincki, Gangrenës së nyjeve (Phomopsis amygdali.* Trajtimet nga rënia e gjethëve deri në çeljen e sythave: 300 g/100 lit ujë (maksimumi 4.5 kg/ha). Trajtimet në fillim dhe gjatë vegjetacionit: 150 g/100 lit ujë (maksimumi 2.25 kg/ha). Mos kryeni më shumë se 4 trajtime në vit.

-Kajsi dhe kumbull : *Monilinia spp; Wilsonomyces carpophilus. 150 gr/100 lit ujë (maksimumi 2.25 kg/ha në 800-1500 lit/ha).* Mos kryeni më shumë se 4 trajtime në vit.

- Qersh: *Monilinia spp dhe Wilsonomyces carpophilus. Maksimumi 2 trajtime në sezon me doze 150 gr/100 lit ujë.*

-Shëgje e kunder njolllosje kafe (Stemphylium vesicarium)

- Bajame: *kunder Fusicoccum (Fomosis Amigdala), Cercospora circumscissa; Taphrina deformans; Wilsonomyces karpofil, Polistigma ochraceum*

- Kiwi: *Phoma spp.; Botrytis cinerea; Glomerella cingulata.*

-Fistika: *Septoria (septoria pistaciae)*, kanceri i degeve (*Botryosphaeria spp*), *Alternaria spp.*
-Arra: *Karbonizimi (Nxirja)*, (*Marssonina juglandis*), *Antraknoza (Colletotrcuum spp)*. dhe *Alternaria*.

-Geshtenja: *Nxirja (Mycosphaerella maculiformis)*

-Lajthia: *Alternaria spp dhe Antraknoza (Colletotrcuum spp)*.

- Domate (fidane), Vrug i hershem i fidanave (Phytophthora parasitica), Kalbezimi i qafes (Pythium debaryanum), Rizoctonia (Rhizoctonia solani).

- Domate fushe dhe serre kunder Vrugut (Phytophthora infestans

-Kastravec kunder vrugut (Pseudoperonospora cubensis).

-Qepore: *Peronospora destructor; Stemphylium vesicarium; Alternaria pori.*

-Boronice, manafere, mjeder: *Phomopsis spp.; Fusarium putrefaciens; Botrytis cinerea; Colletotrichum spp. & Elsinoe veneta; Didymella applanata; Monilinia vaccinii-cory.*

-Luleshtrydhe: *Colletotrichum fragariae; Diachea leucopodia; Botrytis cinerea; Phomopsis obscurans; Mycosphaerella fragariae; Phytophthora cactorum.*

-Patate: *kunder vrugut (Phytophthora infestans)*

-Fasule, Bathe, bizele: *Alternaria fasciculata; Fusarium spp.; Phoma spp.; Phytophthora spp.; Rhizoctonia solani; Pythium spp. kunder Antraknozes (Colletotrichum indemuthianum)*

-Duhan: *Phytophthora spp.; Pythium spp.*

-Hardhi: *Phomopsis viticola; Plasmopara viticola; Guignardia bidwellii.* Sperkatjet parambrojtesse fillojne kur gjatesia e lastarit eshte 8-10 cm, dhe perseriten cdo 10-15 dite.

Fitotoksiciteti:

Produkti nuk është i pajtueshëm me produktet e mbrojtjes së bimëve me reaksion alkaline (Përzjerje Bordoleze, Polisulfide, etj.) dhe produktet me bazë vajrash dhe squfuri.

Ne dozat dhe bimët e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Produkti nuk rekomandohet për përdorim në kultivarë të caktuar molle (Stark Delicieux, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) dhe kultivarë dardhe (Butirra d'Anjou, Butirra Clairegeau, Comtesse de Paris, Trionfo di Vienna). Si masë paraprake, këshillohet që të trajtohet të paktën 3 javë pas trajtimeve me vajra minerale dhe të paktën 7 ditë pas trajtimeve me squfur.

Mos e perdorni ne hardhite ku mblidhen gjethet per konsum.

Përdorimi i Merpan pas breshërit ose stuhive deri në 12 orë pas fenomenit atmosferik, nën të mundur dezinfektimin dhe mbylljen e plageve në të gjitha kulturat bujqesore.

Ndikimi ne ekosistem:

Mos ndotni ujrat dhe burimet ujore, që rrjedhin në lumenj e rezervuare uji.

Për të mbrojtur organizmat ujorë, mbani një zonë të sigurt larg trupave ujorë sipërfaqësorë.

Për pemët e pjeshkës, nektarinave, arrave, shegës dhe kajsisë prej 30 m (nga të cilat 20 m me bimësi

Karenca:

40 dite tek hardhia, 20 dite tek berthamoret, 30 dite tek bajamja, 28 dite tek faroret, 14 dite tek Fasulja, Tranguilli dhe Luleshtrydhje, 10 dite te Mjederat dhe 21 dite ne domate.

Kujdes: Përdoren vetëm për qëllimet dhe sipas kushteve të treguara në këtë etiketë. Përdoruesi është përgjegjës për çdo dëmtim që vjen nga përdorimi i papërshtatshëm. Respektimi i të gjitha udhëzimeve në këtë etiketë është thelbësor për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të shmangur dëmtimin e bimëve, njerëzve dhe kafshëve.

Magazini:

Ruhet në vende të thata, në temperatura jo më e ulët se -10°C dhe jo më e lartë se 35°C .

Nr dhe data e regjistrimit: ;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: *deri 1 kg*.

Bar kodi perkates:

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise së mallit (serise) ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: Material i papershkueshëm nga lageshtia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: ADAMA Agriculture BV.. Israel.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: ADAMA Makhteshim Ltd, Israel.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë):Meldi shpk, Kavaje