

ACEMUR

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



KUJDES

ACEMUR është insekticid sistemik dhe translaminar me veprim kontakti dhe të brendshëm. Acetamiprid është një insekticid neonicotonoid që vepron në sistemin nervor duke shkaktuar paralizë. Është insekticid efektiv në kontrollin e disa insekteve me aparat gojor shpues thithes (afidet, aleuroidet, cikadat, tripset) dhe aparat gojor breres (Lepidopterët dhe Koleopterët).

Përmbajtja: Acetamiprid 20% (200 g/kg).

Përmban diizopropilnaftalensulfonat natriumi (CAS 1322-93-6) dhe dodecil sulfat natriumi (CAS 151-21-3).

Formulimi: Pluhur i tretshëm në ujë (SP).

GRUPI	4 A	INSEKTICID
-------	-----	------------

Deklaratat e rrezikut dhe deklaratat paraprake:

H302 - E dëmshme nëse gëlltitet.

H315 - Shkakton acarim të lëkurës.

H319 - Shkakton acarim serioz të syve.

H361d - Dyshohet për dëmtim të fetusit.

H410 - Shumë toksik për organizmat ujorë me efekte afatgjata

P261 - Shmangni frymëmarrjen e pluhurit/tymit/gazit/mjegullës/avujve/spërkatjes.

P280 - Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/syze/maskë.

P302+P352 – Në rast kontakti me lekuren: Lajeni me shumë sapun dhe ujë.

P305+P351+P338 – Në rast kontakti me sytë: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit kur janë të pranishme dhe mund të bëhen lehtësisht. Vazhdoni me larjen.

P201+P202 - Kërkoni udhëzime të veçanta përpara përdorimit dhe mos e trajtoni substancën përpara se të lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet e sigurisë.

P391 - Mblidhni derdhjen.

P501 - Hidhni përmbajtjen dhe/ose kontejnerin e tyre në përputhje me rregullat e mbetjeve të rrezikshme.

Udhëzim për ndihmen e parë dhe keshilla për mjekun:

Masat bazë të veprimit:

- Lëvizni personin jashtë zonës së kontaminuar. Hiqni menjëherë veshjet e kontaminuara.
 - Në kontakt me sytë, lani me ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta. Mos harroni të hiqni lentet e kontaktit.
 - Në kontakt me lëkurën, lani me shumë ujë dhe sapun, pa fërkim.
 - Nëse gëlltitet, mos shkaktoni të vjella dhe mos administroni asgjë nga goja.
 - Mbajeni pacientin në qetësi. Mbani temperaturën e trupit.
 - Kontrolloni frymëmarrjen. Nëse është e nevojshme, kryeni frymëmarrje artificiale.
 - Nëse personi është pa ndjenja, shtrijeni në anën e tij me kokën më ulët se pjesa tjetër e trupit dhe gjunjët gjysmë të përkulur. Mos e lini vetëm në asnjë rast.
- Këshilla terapeutike për mjekët dhe personelin e kujdesit shëndetësor:
- Në rast gëlltitje, dekontaminim tretës sipas gjendjes së vetëdijes.
 - Kontrolli i ekuilibrit acido-bazik dhe elektroliteve.
 - Për shkak të ngjashmërisë me veprimin nikotinik, mund të jetë i dobishëm përdorimi i Atropinës.
 - Trajtim simptomatik.

Perdorimi:

Ne perime ne serra dhe fushe (domate,spec, trangull, patellxhan etj): Per kontrollin e afideve, me 0.02-0.03 %, krahebardhave, tripseve dhe liromizes, me 0.05-0.06%,

Ne peme frutore: Per kontrollin e afideve, me 0.025%, psillave ne dardhe, krimbit te molles, minueseve, morrit te pergjakeshem, lepidoptereve dhe mikrolepidoptereve te tjere, me 0.05%.

Ne patate: Kunder buburecit te patates dhe afideve, me 0.02-0.025%

Ne agrume: Per kontrollin e breshkezave pambukore (*Planococcus citri*), (*Icerya Purchasi*), me 0.05 %, minueseve (*Phyllocnistis citrella*), tripsit (*Scirtothrips aurantii*), me 0.04 %, breshkezes se kuqe (*Aonidiella aurantii*), afideve (*Aphis gossypii*, *Toxoptera citricida*), minueses (*Phyllocnistis citrella*), me 0.04 %.

Ne vreshta: Per kontrollin e tenjes se rrushit, me 0.025%.

Ne duhan: Kunder afideve me dozen 0.03-0.04%

Verejtje per perdorimin:

Keshillohet te mos kryen me shume se dy trajtime gjate nje sezoni mbjelljeje per cdo kulture. Perzihet me te gjithë insekticidet me perjashtim me ato me reaksion alkaline. Siguroni nje lagje te plote e te njetratjshme te siperfaqes gjethore.

Ndikimi ne ekosistem:

Mos e aplikoni ne kohen e levizjes se insekteve pllenues. Mesatarisht helmues ndaj bleteve dhe insekteve te tjera te dobishme. Për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos aplikoni gjatë fazes se lulëzimit. Eshte helmues ndaj organizmave ujore, prandaj mos ndotni mjediset ujore me kete produkt apo ambalazhet e tij. Për të mbrojtur organizmat ujorë afër parces qe do të trajtohet respektoni një brez sigurie të pa trajtuar me gjerësi prej 5 metrash nga ujrë sipërfaqësore.

Karenca:

7 dite per perimet; 14 dite per agrumet, pataten dhe duhanin; 21 dite per berthamoret; 28 dite per mollen; 50 dite per dardhen.

Magazinimi:

Ruhet ne ambalazh origjinal, ne ambiente te thata e te fresketa, pa ndricim, te ajrosura dhe te sigurta nga rreziku zjarrit, ne temp. 0-40 ° C.

Numri dhe data e regjistrimit: 188; date 23.1.2024.

Sasia neto e PMB-së apo lëndës vepruese, qe ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 kg;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;

Data e prodhimit:_____;

Data e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: 3 vjet;

Lloji i ambalazhit bazë: Material 3-shtresor për mbrojtjen nga lagështia, Shishe COEX ose HDPE;

Emri dhe adresa e prodhuesit: 1. RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. **Adresa:** Pol.

Ind. Fondo de Litera, Autovia A-2 Km 441.6, 22520 Fraga, (HUESCA) SPANJË.

2. SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD, **Adresa:** Binhai Economic

Develoment Area, Weifang, Shandong 262737, KINË.

Emri dhe adresa e aplikantit: RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U., **Adresa:** Pol. Ind. Fondo de Litera, Autovía A-2 Km 441.6 22520 Fraga (HUESCA) SPANJË.

Emri dhe adresa e importuesit: AGROGEN shpk. **Adresa:** Gruemire, Malesi e Madhe.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit: SHEGAJ-AGR shpk. Adresa: Dobrac, Shkoder.