

FANTIC F WG

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“KUJDES”

Lexo fleteudhëzuesin para përdorimit

Eshte fungicid me veprim sistemi dhe kontakti, i cili perdoret ne kontrollin e vrugut ne hardhi, patate e, domate, trangull e perime te tjera.

Lenda vepruese: 48 % Folpet + 4 % Benalaxil-M;
Formulimi: Granula te dispergueshme ne uje (WG);
Pamja: Granula me ngjyre kafe te lehte.

Masa parandaluese:

- Mbajeni në vënde të sigurta dhe të pa arritëshme nga fëmijët;
- Evitoni kontakte të zgjatura të syve dhe lëkures me preparatin;
- Evitoni marjën e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkates dhe gjatë spërkatjes;
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe tymos duhan;
- P280-Përdorni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtëse për sytë/mbrojtje për fytyrën;
- P305+P351+P338- NËSE PRODUKTI BIE NË SY: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t'u bërë. Vazhdoni shpëlarjen;
- P332+P313- Nëse ndodh acarimi i lëkurës: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.
- Mblidhni produktin e derdhur.
- EUH401-Për të shmangur risqet ndaj shëndetit njerëzor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet për përdorimin.
- P501-Asgjesoni kontejnerin sipas rregulave në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- H302- E dëmshme nëse gëlltitet;
- H317- Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës;
- H318-Shkakton dëmtim të rëndë syri;
- H351-Dyshohet se shkakton kancer;
- H400-Shumë toksike për organizmat ujorë;
- Në rast thithje të tretësires spërkatëse me organet e frymëmarrjes i aksidentuari vendoset në një mjedis të ngrohtë dhe të ajrosur;
- Në rast helmimi kerkoni menjëherë ndihmë në qendrën më të afërt spitalore, duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti. Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.
- Antidot: asnjë, trajtohet në mënyrë simptomatike.

Përdorimi:

Sasia e preparatit që perdoret ne 100 lit uje ne trajtime me volume normale dhe sipas kulturave eshte si vijon:

Ne vreshta: Per kontrollin e vrugut, duke trajtuar heret me 200-250 gr preparat.

Ne patate: Per kontrollin e vrugut, me 200-250 gr preparat.

Ne domate: Per kontrollin e vrugut, me 200-250 gr preparat.

Ne qepe: Per kontrollin e vrugut, me 250-300 gr preparat.

Ne bimët zbukuruese dhe lule: Per kontrollin e vrugjeve, me 200-250 gr preparat.

Verejtje per perdorimin:

Perzihet me produktet e tjera me perjashtim te atyre me reaksion alkaline. Perzihet edhe me biostimulantet dhe pleherat gjethore.

Fitotoksiciteti:

Nuk duhet trajtuar gjate lulezimit. Per bimet zbukuruese dhe lulet, keshillohet kryerja e provave per te provuar ndjeshmerine.

Ndikimi ne ekosistem:

Nuk eshte helmues ndaj bleteve. I demshem per peshqit e organizmat e tjera ujore. SP1: Mos e ndotni ujin me produktin ose enen e tij. Mos i pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen e sistemeve të kullimit të fermave ose rrugëve. SPe3: Për të mbrojtur organizmat ujorë, mbani një zonë tampon të patrajtuar prej 20 m nga ujërat sipërfaqësore.

Karenca:

20 dite per te gjithë kulturat.

Magazinimi:

Preparati ruhet ne vende te erreta dhe pa lageshti, ne temperature deri ne 35 ° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 327/1; date 26.11. 2025.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 kg.

Data e prodhimit..... ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesëve të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese ;

Tipi i ambalazhit baze: HDPE (High density polyethylene).

Emri dhe adresa e kerkuesit: Gowan Crop Protection Limited. **Adresa:** Harpenden, Hertfordshire, UK.

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Gowan Crop Protection Limited. **Adresa:** Harpenden, Hertfordshire, UK.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet ne Republiken e Shqiperise):