

FOPAZ

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMEVE.



KUJDES

“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

FOPAZ është fungicid me efekt sistematik dhe kontakti. Produkti përmban dy substanca aktive që ndryshojnë në mekanizmin dhe mënyrën e veprimit të tyre: azoxystrobin me një efekt sistematik, dhe folpet me veprim kontakti. Si pjesë e strategjisë për të luftuar rezistencën e sëmundjes, rekomandohet përdorimi i produktit: - vetëm në doza të rekomanduara dhe kryesisht në mënyrë profilaktike, - në mënyrë alternative me fungicide që përmbajnë substanca aktive nga grupe të ndryshme kimike dhe me një mekanizëm të ndryshëm veprimi.

GRUPI	11/M04	FUNGICID
--------------	---------------	-----------------

Permbajtja: Azoxystrobin 90.4 g/lit+Folpet 484 g/lit.

Formulimi: Koncentrat i suspensueshem (SC).

Deklaratat e rrezikut:

H317 – Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

H351 - Dyshohet se shkakton kancer.

H410 – Shume toksik për jetën ujore me efekte afatgjate.

EUH401 - Që të shmangni rrezikun për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

Deklaratat parambrojtëse:

P201 - Lexoni masat e veçanta para përdorimit.

P273 – Shmangni derdhjen në mjedis.

P280 - Përdorni syze mbrojtëse, veshje mbrojtëse dhe doreza mbrojtëse.

P308+P313 - Në rast të ekspozimit apo kontaktit: kerkoni kujdes mjekësor.

P391 - Mblidhni derdhjen.

P501 – hidhni përmbajtjen/ambalazhin në impiantin e autorizuar të riciklimit të mbetjeve.

Frazat standarte për deklaratat parambrojtëse:

SP1 – Mos ndotni ujin me produktin ose ambalazhin e tij. Mos pastroni paisjet e sperkatjes afer burimeve të ujit./ Shmangni ndotjen përmes kanaleve të kullimit nga oborret e fermave dhe rrugët.

SP3 – Për të mbrojtur organizmat ujore dhe artoprodet e pasynuar respektoni një zonë të pa sperkatur prej 15 meter larg sipërfaqeve ujore.

Masat e ndihmes së parë dhe keshilla për mjekun:

Shmangni thithjen ose kontaktin e produktit me lëkurën dhe sytë. Gjatë punës, duhet të vishen pajisje mbrojtëse, mos hani, pini ose pini duhan. Pas përfundimit të punës, lani duart dhe fytyrën tërësisht me shumë ujë dhe sapun. Pajisjet duhet të dekontaminohen para se të ripërdoren ose të përdoren pajisje mbrojtëse të reja.

Mos ndotni ujin, ushqimin, ushqimin për kafshët, farat dhe paketimin e tyre. Produkti nuk duhet të lihet pranë fëmijëve dhe personave të tjerë të paautorizuar dhe në zonë ku kafshët kanë qasje.

Nuk ka antidote specifike, trajtojeni të semurin në mënyrë simptomatike. Nëse nevojitet keshilla e mjekut, tregoni paketimin ose etiketën. Kërkoni keshilla/kujdes mjekësor nëse nuk ndiheni mirë.

Përdorimi:

Ne vreshta: për kontrollin e vrugut (*Plasmopara viticola*), kalbezimit të zi (*Guignardia bidwelli*), kancerit të hardhise, hirit, njollosjes së kuqe të gjetheve (*Pseudopeziza tracheiphila*), antraknozës dhe fomozes.

Ne të lashta: kontrollon hirin dhe ndryshkun.

Ne perime (domate, kungullore): kontrollojnë vrugjet, hirin, kalbezimet, antraknozën dhe septeriozën.

Ne peme frutore: kundër kalbezimeve, hireve, kromes (*Venturia inequalis* & *V.pirina*), gjetheperdredhës, antraknozave dhe ndryshkut.

Doza e rekomanduar për përdorim: 1,6 - 2 lit/ha tretur në 800-1200 lit/ha.

Te përdoret si masë parandaluese ose pasi të vërehen simptomat e para të sëmundjes, nga fillimi i fazës së lulëzimit deri në fund të fazës së zhvillimit të frutave.

Numri maksimal i trajtimeve 3, me interval midis trajtimeve të paktën 12 ditë. Mos e tejkaloni dozën maksimale të rekomanduar 2 lit/ha.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas udhëzimeve në etiketë. Tek rrushi i tavolines dhe disa varietete mollash të behen prova paraprake përpara përdorimit.

Verejtje për përdorim:

Përzihet me PMB të tjera me përjashtim të atyre alkaline. Spermatozoidet me vaj mineral nuk duhet të kryhet pa kaluar 30 ditë nga trajtimi me produktin FOPAZ.

Ndikimi në mjedis:

Helmues për gjitarët, zogjtë dhe bletët. H410 - Shumë helmues për jetën ujore me efekte afatgjata. Ndalohej përdorimi i paketimeve të zbrazura të produktit për qëllime të tjera. Hedhja dhe asgjësimi i produktit dhe ambalazhit të tij të bëhet sipas rregulloreve kombëtare. Mos e ndotni ujin me produktin ose me ambalazhin e tij. Mos i lani pajisjet në afërsi të ujit sipërfaqësor. Shmangni ndotjen e ujërave përmes kanaleve kulluese.

Karenca:

Solanore 7 ditë; kungullore 21 ditë; Rrushi 28 ditë; qepe, hudher, karrote 7 ditë; drithërat 42 ditë.

Ruajtja magazinimi:

Ruani produktin në paketim origjinal, në mënyrë që të parandalohet kontakti me ushqimin, pijet ose foragjeret, në temperaturë 0-35 °C, larg burimeve të nxehtësisë.

Nr dhe data e regjistrimit: 575/1; 5.11.2025;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 lit.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes: 3 vjet Numri i lotit (serise):

Tipi i ambalazhit bazë: shishe COEX ose HDPE.

Fabrikuesi i PMB-së: Sharda Cropchem Ltd. **Adresa:** Mumbai, India;

Aplikanti: Sharda Cropchem Espana S.L. **Adresa:** Murcia, Spanjë;

Distributor dhe ambalazhues: Shëgjaj-AGR shpk; Adresa: Dobrac, Shkoder;