

KASTOR

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



RREZIK

KASTOR është fungicid me veprim kontakti dhe efekt parambrojtes per kontrollin e shume semundjeve kerpudhore te kulturave bujqesore.

Lendet vepruese: *Captan 80 %*

Formulimi: *Granula te tretshme ne uje (WG)*

Deklaratat e Rrezikut

H317 - Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.

H318 - Shkakton dëmtime serioze të syve.

H332 - I dëmshëm nëse thithet.

H351 - Dyshohet se shkakton kancer.

H400 - Shumë toksik për jetën ujore.

EUH401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet e përdorimit

Deklarata Paraprake

P102 - Mbajeni larg fëmijëve.

P201 - Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.

P202 - Mos e perdorni derisa të jenë lexuar dhe kuptuar të gjitha masat paraprake të sigurisë.

P261 - Shmangni thithjen e pluhurit dhe mjegullës së spërkatjes.

P270 - Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.

P280 - Vishni doreza mbrojtëse, veshje mbrojtëse, mbrojtje për sytë dhe mbrojtje për fytyrën.

P302+P352 - NËSE BIE NË LËKURË: Lani plotësisht me sapun dhe ujë.

P305+P351+P338 - NËSE BIE NË SY: Shpëlani me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse i keni dhe janë të lehta për t'u hequr. Vazhdoni shpëlarjen.

P308+P313 - NËSE jeni të ekspozuar ose të shqetësuar: Kërkoni këshilla/vëmendje mjekësore.

P333+P313 - Nëse shfaqet acarim ose skuqje e lëkurës: Kërkoni këshilla/vëmendje mjekësore.

P362+P364 - Hiqni rrobat e kontaminuara dhe lajini ato para se t'i ripërdorni.

P391 - Mblidhni derdhjen.

P405 - Ruajeni të kyçur.

P501 - Hidhni përmbajtjen dhe enën në një vend të përshtatshëm për mbledhjen e mbetjeve të rrezikshme.

Përdorimi:

Ne hardhi, kunder vrugut, kalbezimit të zi, kalbezimit gri, antraknozës dhe nekrozës. Sperkatjet parambrojtëse fillojnë kur gjatësia e lastarit është 8-10 cm, dhe perseriten cdo 10-15 dite.

Ne peme frutore berthamore, kunder kalbezimit të frutave, gjetheperdredhjes dhe gjethebirueses. Sperkatjet kryhen në vjeshtë, pas rrezimit të gjetheve dhe, në pranverë, pak para fryrjes së sytheve, si dhe pas rënies së petaleve.

Ne peme frutore farore, kunder kromes. Sperkatjet kryhen në hapjen e sytheve, në butonizimin e kuq si dhe në rrezimin e petaleve.

Ne agrume, kunder gomozes dhe fomozes. Trajtimet fillojnë me cfaqjen e simptomave të para.

Ne perime dhe patate, kunder kalbezimeve të ndryshme të fidaneve në shtreter, kalbezimit gri, alternariozave, septoriozave, kalbezimit të bardhë, kladosporiozës, antraknozave dhe vrugjeve. Trajtimet fillojnë me shfaqjen e simptomave të para.

Ne bimet zbukuruese, kunder kalbezimeve te fidaneve (gjinite *Pythium spp.*, *Rhizoctonia spp.*).

Doza e perdorimit ne te gjitha kulturat eshte 150-180 gr/100 lit uje. Aplikohen deri 3 trajtime/sezon, me interval 10-15 dite mes tyre.

Verejtje per perdorimin:

Trajtimet kryhen kur ka rrezik infeksioni ose duke u bazuar ne te dhenat qe jep prognoza.

Perdoren volume te medha tretesire sperkatese, per te siguruar lagie te mire te mases gjethore. Nuk perzihet me fungicidet dhe insekticidet alkaline si dhe me formulimet e parathionit.

Fitotoksiciteti:

Ne dozat dhe bimet e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Bejne perjashtim disa varietete te molles (Red delicious, Winesap) dhe te pjeshkes (D'anjou, Bosc).

Ndikimi ne ekosistem:

I demshem per peshqit e organizmat e tjera ujore. I rrezikshem per bletet. Mos ndotni ujrat me preparatin ose me ambalazhin e tij.

Karenca:

Tek te gjitha kulturat 28 dite.

Magazinimi:

Ruhet ne vende te thata, ne temperature –5 deri 35° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 587/1, datë 5.11.2025;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 kg.

Data e prodhimit ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese ;

Tipi i ambalazhit baze: Material i papershkueshem nga lageshtia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: Sharda Cropchem Espana S.L. **Adresa:** Murcia, Spanje.

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Sharda Cropchem Ltd. **Adresa:** Mumbai, India.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise): SHEGAJ AGR sh.p.k.

Adresa: Dobrac, Shkoder.