

GLISTER 36 SL

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



Herbicid me veprim total me baze glifosati. Eshte sistemik dhe jo selektiv per kontrollin e barerave te keqia njevjecare, dy dhe shumevjecare.

Lenda vepruese: 36 % *Glyphosate*

Formulimi: *Solucion ujqor i koncentruar (SL).*

Deklaratat e rrezikut

H319 Shkakton acarim serioz të syve.

H411 Toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata;

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P264 Lani duart menjëherë pas përdorimit

P280 Veshni doreza mbrojtëse dhe mbrojtëse të tjera për fytyrën dhe sytë.

P305 NË RAST KONTAKTI NË SY:

P351+338 Shpëlajeni sytë me kujdes me ujë të bollshëm. Hiqni lentet kontaktit nëse është e mundur, dhe shpëlajeni sërish.

P337+313 Në rast se acarimi në sy vazhdon: Mer këshillën ose kujdesin mjekësor.

Informacione shtesë për rrezikun

EUH401 Të evitohen rreziqet e shëndetit të njeriut dhe ambjentit, në përpuethshmëri me instruksionet për përdorim.

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa ariteshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerezit si dhe ushqimeve per blegtorine.
- Evitoni kontaktet e zgjatura te syve dhe lekures me preparatin.
- Gjate punes evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes.
- Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Gjate punes perdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Ne perfundim te punes lani paisjet mbrojtëse, duart dhe pjeset e tjera te ekspozuara te trupit.
- Asgjесimi i ambalazheve te behet sipas rregullave ne fuqi.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Ne rast gellitje, marrje me organet e frymamarrjes dhe me lekuren shkakton keto shenja helmimi: dermatit, konjuktivit, vjellje, diare, apati.
- Ne rast helmimi, pacienti dergohet ne qendren spitalore me te afert, ku i tregohet mjekut etiketa.
- Antidot specifik nuk ka. Perdoret terapi simptomatike.

Perdorimi:

Eshte nje herbicid i pas mbirjes, me veprim total, duke luftuar si barerat gjethegjera ashtu edhe ato gjethengushta ne periudhen e ritjes aktive. Pas marjes nga gjethet ai qarkullon me lengjet bimore ne te gjitha pjeset e vecanerisht ne ato nentokesore. Nuk le mbetje ne toke, prandaj tokat e trajtuara me kete preparat mund te mbillen pak dite pas trajtimit me te gjitha llojet e kulturave.

Keshtu, ai mund te perdoret perpara mbjelljes se perimeve, panxharit, grurit dhe te lashtave te tjera, orizit, livadheve, fidanishteve, farishteve, etj. Trapiantimi i fidanave dhe mbjellja e farerave te behet te pakten 48 ore pas trajtimit.

Ne agrume, peme frutore dhe hardhi: per luftimin e barerave te keqia njevjecare graminore dhe bishtajore me 1.5-2 lit preparat/ha; kunder *Malva spp.*, *Urtica spp.*, *Polygonum spp.*, *Portulaca spp.*, me 4-6 lit preparat/ha. Per luftimin e barerave te keqia shumevjecare si: *Cynodon dactylon*, me 7.5-10 lit preparat/ha; *Sorghum halepense* dhe *Pteridium aquilium*, me 5 lit preparat/ha; *Convolvulus arvensis* dhe *Cirsium arvense*, me 10 lit preparat/ha; *Cyperus spp.*, me 6 lit preparat/ha. Nuk rekomandohet ne pemtoret dhe vreshtat e reja.

Ne pambuk, miser: per luftimin e barerave te keqia njevjecare, me 1.5-2 lit preparat/ha si dhe ato shumevjecare si: *Sorghum halepense*, me 5 lit preparat/ha.

Ne parcelat pas vjeljes ose para mbjelljes: per luftimin e barerave te keqia njevjecare graminore dhe bishtajore me 1.5-2 lit preparat/ha; kunder *Malva spp.*, *Urtica spp.*, *Polygonum spp.*, *Portulaca spp.*, me 4-6 lit preparat/ha. Per luftimin e barerave te keqia shumevjecare si: *Cynodon dactylon*, me 7.5-10 lit preparat/ha; *Sorghum halepense* dhe *Pteridium aquilium*, me 5 lit preparat/ha; *Convolvulus arvensis* dhe *Cirsium arvense*, me 10 lit preparat/ha; *Cyperus spp.*, me 6 lit preparat/ha. Nuk rekomandohet ne pemtoret dhe vreshtat e reja.

Perveç bujqesise, ka gjetur perdorim edhe ne luftimin e barerave ne bordura dhe anet e rrugeve, midis shinave hekurudhore dhe mjediseve te tjera, ku prania e barerave eshte shqetesuese.

Verejtje per perdorimin:

Shmangni kontaktin e pikave sperkatese me kulturat e tjera bujqesore. Mos sperkatni ne dite me ere. Mos trajtoni barerat e keqia te cilat vuajne nga strese te ndryshme si thatesia, te ftohtit etj.

Fitotoksiciteti:

Nuk eshte fitotoksik nese perdoret sipas udhezimeve te kesaj etikete. Nuk perzihet me PMB te tjera.

Ndikimi ne ekosistem:

Relativisht jo helmues për bletët. Helmues për organizmat ujore. Mënjaroni shpërndarjen e pikave të tretësirës spërkatëse në sipërfaqet ujore.

Karenca:

Nuk aplikohet.

Magazinimi:

Magazinohet ne vende te ajrosura, te fresketa dhe pa lageshtire, ne tempereature -5 deri 40⁰ C.

Nr dhe data e regjistrimit: 592/2, datë 31.10.2024;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 lit

Data e prodhimit

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 5 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese

Tipi i ambalazhit baze: shishe plastike HDPE (High density polyethylene).

Emri dhe adresa e Aplikantit: Sinon Corporation. **Adresa:** Taichung 403. Taiwan.

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Sinon Corporation. **Adresa:** Taichung 403. Taiwan.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise):