

MOSPILAN 20 SG

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



GHS07



GHS09

Lenda vepruese: 20 % acetamiprid.
Formulimi: Granula te treteshme (SG)

GRUPI	6A	INSEKTICID
-------	----	------------

Deklaratat e rrezikut:

H302 E dëmshme nëse gëlltitet. H410 Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata. EUH 401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, veproni në përputhje me udhëzimet per perdorim.

Deklarata parandaluese : P264 Lani duart dhe fytyrën tërësisht pas trajtimit. P270 Mos hani, pini apo pini duhan kur përdorni këtë produkt. P301 + P312 NËSE GEKKTITET: Telefononi një QENDER ANTIHELMIMI ose një mjek/mjek në rast se nuk ndjeheni mirë. P330 Shplani gojen. P391 Mblidhni derdhjen. P501 Hidhni përmbajtjen/enën në përputhje me rregulloret lokale/kombëtare/ndërkombëtare. SP 1 Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij (Mos pastroni pajisjet e aplikimit afër ujërat sipërfaqësore/Shmangni ndotjen përmes kanaleve të kullimit nga fermat dhe rrugët).

Insekticid me veprim sistematik dhe translaminar, me mekanizem specifik veprimi, efektiv në kontrollin e disa insekteve të rëndësishme me aparat gojor shpues thithes (afidet, aleuroidet, cikadat, tripset) dhe aparat gojor breres (Lepidopteret dhe Koleopteret).

Masat parambrojtese:

- Mbajeni në vende të sigurta dhe të pa arritshme nga fëmijet.
- Ruajeni në vende të thata dhe të fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve për njerezit si dhe ushqimeve për blegtorine.
- Evitoni kontaktete zgjatura të syve dhe lekures me preparatin
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjatë përgatitjes së solucionit sperkates dhe gjatë sperkatjes.
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe duhan.
- Gjatë punës përdor paisje mbrojtese, kominoshe, doreza, maska, syze.
- Në perfundim të punës, lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit, paisjet mbrojtese dhe mjetet sperkatese.
- Asgjësimi i ambalazheve të bëhet sipas rregullave në fuqi.

Udhëzim për ndihmën e parë dhe keshilla për mjekun:

- Në rast gëlltitje ose marrje me organet e frymemarrjes, pacienti vendoset në një vend me ajër të pastër dhe të freskët dhe mbulohet për të mbajtur ngrohtë .
- Provokohet vjellje (me përjashtim të rasteve kur pacienti ka humbur ndërgjegjen), duke i dhënë pacientit një gotë me ujë, në të cilën është tretur me parë një luge gjelle kripe.
- Në rast kontakti me lekuren apo sytë, lani menjëherë me ujë të pastër dhe sapun pjesët e kontaminuara.
- I aksidentuari nuk jep shenja karakteristike. Me pas pacienti dërgohet në një qendër spitalore, ku tregohet etiketa e produktit.
- Antidot specifik nuk ka. Aplikohet terapi simptomatike.

KULTURA	DEMTUESI	DOZA E PERDORIMIT	KARENCA
PORTOKALLE MANDARINA , LIMONA	<i>Afidet</i> (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>) <i>Minuesja</i> (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	25 g/100 lit 50g /dynym	14 dite
MOLLE DARDHE	(<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>A. spiraecola</i>) <i>Mkrotenjat</i> (<i>Leucoptera malifoliella</i> , <i>Phyllonorycter blancardella</i>) <i>Psylla</i> <i>Cacopsylla piri</i> <i>Quadraspidotus.spp.</i>	25 g/100lit 25-37.5g/dynym 20g/100 lit 20 gr/dynym 25-30g/100lit 37.5-45 g/dynym	14 dite
PJESHKE, KAJSI, KUMBULLA,QERSHI	(<i>Myzys Persicae</i> , <i>Aphis pomi</i> , <i>A.spiraecola</i> , <i>Myzus cerasi</i>) <i>Mikrotenjat</i> (<i>Leucoptera malifoliella</i> , <i>Phyllonorycter blancardella</i>)	25 g/100lit 25-37.5g/dynym	14 dite
VRESHTA	<i>Lobesia botrana</i>	25g/dynym	
JONXHE	<i>Aphis sp.</i> , <i>Myzus sp.</i>)	25 g/100lit 7.5-10g/dynym	14 dite
DOMATE SPECA PATLLIXHAN (ne fushe)	(<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	25g/dynym	7 dite
DOMATE SPECA PATLLIXHAN (ne sere)	(<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>) (<i>Bemisia tabaci</i>)	25g/dynym 35-40g/dynym	3 dite
SALLATE (ne fushe dhe sere)	(<i>Nasonovia ribis-nigri</i>)	25g/dynym	7dite
KUNGULL, PJEPER, SHALQI	<i>Afide</i> <i>Krahebardha</i> <i>Franklinella occidentalis</i>	25g/dynym 35-40g/dynym	3 dite Nefushe 7 dite
DUHAN	(<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>) (<i>Bemisia tabaci</i>)	25-30g/dynym	14 dite
PATATE	(<i>Myzus persicae</i>) <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	20g/dynym 10g/dynym	7 dite
GRURE	<i>Eurygaster integriceps</i>	10 g/dynym	14 dite
BIME DEKORATIVE	(<i>Bemisia tabaci</i>) (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	35-40g/dynym	

Verejtje per perdorimin:

Keshillohet te mos kryen me shume se dy trajtime gjate nje sezoni mbjelljeje per çdo kulture. Perzihet me te gjithë insekticidet me perjashtim me oato me reaksion alkaline.

Ndikimi ne ekosistem:

Nuk eshte helmues ndaj bleteve dhe insekteve te tjera te dobishme. Rekomandohet te perdoret ne programet e kontrollit te inegruar (IPM). Eshte helmues ndaj organizmave ujore, prandaj mos ndotin mjediset ujore me kete produkt apo ambalazhet etij.

Magazinimi:

Ruhet ne ambalazh origjinal, ne ambjente te thata e te fresketa, pa ndriçim, te ajrosura dhe te sigurta nga rreziku zjarrit, ne temp. 0-35⁰ C.

Nr dhe data e regjistrimit: 176/2, datë 15.11.2018.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 4-50 gr.

Bar kodi perkates ;

Data e prodhimit ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese ;

Tipi i ambalazhit baze: Material i pa pershkueshem nga lageshtia (PE, Alu, HDPE).

Emri dhe adresat e fabrikuesit te PMB-se: Nisso Chemical Europe. Adresa: Berliner Allee 42 40212. Dusseldorf, Gjermani. Adresat e fabrikimit: 1. Nippon Soda Co., Ltd. Adresa: 2-1,Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku-Tokyo, 100-8165 Japan; 2. Kwizda Agro. Adresa: F. Joh. Kwizda GmbH, Dr. Karl Lueger Ring 6 A-1010 Wien, Austri. IPT-Pergande Gesellschaft für Innovative Particle Technology mbH. Adresa: Wilfried-Pergande-Platz 1 06369 Südliches Anhalt OT Weißandt-Gölzau Germany.

Emri dhe adresa e Aplikantit: Nisso Chemical Europe. Adresa: Berliner Allee 42 40212. Dusseldorf, Gjermani.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republikën e Shqiperise):