

# CORNALINA

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



“KUJDES”

“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

**CORNALINA**, është një insekticid sistemik që vepron me kontakt dhe gëlltitje në një gamë të gjerë insektesh të dëmshme për të mbjellat, duke ndryshuar sjelljen e sistemit të tyre nervor.

**Përmbajtja:** Acetamiprid 20% (200 g/kg).

**Formulimi:** Pluhur i tretshëm në ujë (SP).

**Pamja:** Pluhur me ngjyrë blu

## Masat parambrojtëse:

**GRUPI 4A INSEKTICID**

### DEKLARATAT E RREZIKUT:

H302- E dëmshme nëse gëlltitet;

H315- Shkakton acarim të lëkurës;

H319- Shkakton acarim të rëndë të syve;

H410- Shumë toksike ndaj jetës ujore me efekte të përhershme.

### DEKLARATAT PARANDALUESE:

P280- Vishni doreza mbrojtëse, kostum mbrojtës, mbrojtje për sytë, mbrojtje për fytyrën;

P301+P312- NËSE GËLLTITET: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/nëse nuk ndjeheni mire.

P302+P352- NËSE BIE NË KONTAKT ME LËKURËN: Lahu me shumë ujë;

P305+P351+P338- NËSE NË SY: shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse i mbani dhe nëse hiqen lehtësisht. Vazhdoni shpëlarjen;

P330- Shpëlani gojën;

P391- Mblidhni derdhjet;

P501- Hidhni përmbajtjen dhe ambalazhin në përputhje me rregulloret për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme.

### Përdorimi:

Në agrumet, kundër afideve, me dozën 0.025% (25 gram/100 L ujë) me një maksimum prej 500 g/ha për trajtim.

Trajtimi mund të përsëritet brenda 30 ditëve kur infeksioni vazhdon.

Me një vëllim uji midis 800-2000 L/ha. Mos aplikoni më vonë se BBCH 71 (fillimi i rënies së frutave të rinj).

#### *Menyra e përdorimit*

Vishni doreza mbrojtëse, kapuç dhe maske gjatë aplikimit. Vishni doreza mbrojtëse gjatë korrjes dhe inspektimit.

Aplikoni me spërkatje normale, duke u përpjekur të mbuloni të gjithë pjesën ajrore të prodhimit.

Për të përgatitur përzierjen me spërkatje, fillimisht mbushni rezervuarin afërsisht gjysmën e kapacitetit të tij. Më pas, shtoni sasinë e nevojshme të CORNALINA dhe plotësoni me ujë vëllimin e mbetur për t'u aplikuar, duke mbajtur në lëvizje të vazhdueshme.

#### *Masa paraprake*

Mos e përzieni me produkte alkaline.

Rekomandohet të bëni një test të mëparshëm përpara se të bëni ndonjë përzierje. Mos aplikoni më shumë se 2 aplikime në sezon.

#### *Menaxhimi i rezistencës*

Për menaxhimin e rezistencës, Acetamiprid është një insekticid i kodit 4A të grupit IRAC. Çdo popullatë insektesh mund të përmbajë individë natyrisht rezistent ndaj Acetamiprid dhe insekticideve të tjera të grupit IRAC 4A. Rezistenca eventualisht mund të dominojë popullatën e insekteve nëse këto insekticide përdoren në mënyrë të përsëritur. Këto insekte rezistente nuk mund të kontrollohen nga CORNALINA ose ndonjë insekticid tjetër i kodit 4A të grupit. Për të vonuar rezistencën ndaj insekticideve, shmangni përdorimin ekskluziv të përsëritur të

insekticideve nga i njëjti kod i grupit të insekticideve. Alternoni ose përzieni me produkte nga kode të ndryshme të grupeve të insekticideve.

### *Paralajmërim*

Rekomandimet dhe informacionet që ne ofrojmë janë fryt i studimeve dhe testeve të gjera dhe rigoroze. Megjithatë, gjatë përdorimit të produktit mund të shfaqen shumë faktorë jashtë kontrollit tonë (përgatitja e përzierjeve, aplikimi, moti, etj.).

Kompania garanton përbërjen, formulimin dhe përmbajtjen. Përdoruesi është përgjegjës për dëmin e shkaktuar (faji i efikasitetit, toksiciteti në përgjithësi, mbetjet, etj.), për të mos ndjekur udhëzimet e etiketës.

### **Fitotoksiciteti:**

Nëse produkti aplikohet në sasi të rekomanduara dhe në mënyrën e përshkruar, nuk është fitotoksik.

### **Ndikimi në ekosistem:**

SP1: Mos e ndotni ujin me produktin ose kontejnerin e tij (Mos i pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësore/Shmangni kontaminimin nëpërmjet kanaleve të kanalizimeve nga oborret e fermave dhe rrugëve).

SPe3: Për të mbrojtur organizmat ujorë respektoni një zonë sigurie të pa spërkatur prej 20 m ndaj trupave ujorë sipërfaqësorë.

SPe3: Për të mbrojtur artropodët jo të synuar, respektoni një zonë tampon të pa spërkatur prej 5 m në tokë jo bujqësore. Për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos e përdorni produktin gjatë aktivitetit të ushqimit të bletëve ose gjatë lulëzimit. Është gjithashtu praktikë e mirë të paralajmërohen bletarët lokalë ose oficerët e ndërlidhjes me spërkatje 48 orë përpara spërkatjes.

### **Karenca:**

14 dite.

### **Ruajtja dhe magazinimi:**

Produkti magazinohet dhe ruhet në ambalazhin origjinal, të mbyllur dhe të padëmtuar, në vend të thatë, të pastër dhe të ajrosur, ndaras nga burimet e ndezjes.

Numri dhe data e regjistrimit: 798, datë 20.1.2023;

Sasia neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 100 gr;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: \_\_\_\_\_;

Data e prodhimit: \_\_\_\_\_;

Data e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: 3 vjet;

Lloji i ambalazhit bazë: Material 3-shtresor për mbrojtjen nga lagështia, shishe COEX ose HDPE;

Emri dhe adresa e Kërkuesit: PROPLAN Plant Protection Company SLU. Adresa: C/Valle del Roncal 12. Oficina 7. 28232- Las Rozas, Madrid, Spanjë.

Emri dhe adresa e Prodhuesit: PROPLAN Plant Protection Company SLU. Adresa: C/Valle del Roncal 12. Oficina 7. 28232- Las Rozas, Madrid, Spanjë.