

DELUX 050 CS

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“KUJDES”

Lexo fleteudhzesin para perdorimit

DELUX 050 CS është insekticid me veprim kontakti dhe të brendshëm në formën e një suspensiononi të kapsulave në lëng të destinuar për hollim me ujë para përdorimit. Ka një efekt sipërfaqësor në bimë.

GRUPI 3A INSEKTICID

Përmbajtja: Deltametrin 50 gr/lit (4,9% w/w)

Formulimi: Suspension kapsulash (CS)

Masat parambrojtese:

P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje për sytë/fytyrë. P302+P352: NËSE NË LËKURË: Lajeni me shumë sapun dhe ujë.

P305+P351+P338: NËSE NË SYTË: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t'u bërë. Vazhdoni shpëlarjen.

P391: Mblidhni derdhjen.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

H315: Irritues për lëkurën.

H319: Irritues për sytë.

H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata.

EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

EUH208: Përmban 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.

Antidoti: asnjë, trajtojeni në mënyrë simptomatike.

Në rast aksidenti ose nëse nuk ndiheni mirë, kërkoni menjëherë këshilla mjekësore (tregoni etiketën kur është e mundur). Nëse gjëlltitet, mos shkaktoni të vjella: kërkoni menjëherë këshilla mjekësore dhe tregoni enën dhe etiketën.

Në rast kontakti me lëkurën: Lajeni me sapun dhe ujë të bollshëm.

Nëse në sy: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t'ubërë. Vazhdoni shpëlarjen.

Nëse thithet: largojeni viktimën në ajër të pastër dhe mbajeni të qetë në një pozicion të rehatshëm për frymëmarrje.

Përdorimi:

Produkti është i destinuar për t'u përdorur me spërkatës vetëlëvizës ose traktor të fushës dhe kopshtit.

Kolza dimërore vajore: kundër *Brassicoglyphus aeneus*, *Ceutorrhynchus quadridens*. Doza maksimale e produktit për një aplikim të vetëm: 0.1 lit/ha. Doza e rekomanduar 0,08 - 0,1 lit/ha. Përdorni dozat më të larta të rekomanduara në rast të infektimit më të madh nga dëmtuesit. Trajtimet pas infektimit, nga faza e "gonxhes së gjelbër" deri në fazën kur petalet e para janë të dukshme dhe sythat e luleve janë ende të mbyllura ("sythi i verdhë") (BBCH 51-59). Sasia e rekomanduar e ujit: 200-400 lit/ha.

Grurë: kundër *Oulema melanopa*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Trajtimet nga fillimi deri në fund të fazës së veshit (BBCH 51-59) duke marrë parasysh pragun e dëmtimit. Sasia e rekomanduar e ujit: 200-400 lit/ha.

Mollë, dardhë, kumbull: kundër afideve. Doza e rekomanduar 0,25 lit/ha. Aplikohet pas shfaqjes së kolonive të para të afideve. Aplikohet 1 trajtim/sezoni rritje. Sasia e rekomanduar e ujit: 500-600 lit/ha.

Misër: kundër *Sesamia cretica*. Doza e rekomanduar 300 ml/ha. Përdoret nga fillimi deri në fund të fazës së veshit (BBCH 51-59) duke marrë parasysh pragun e dëmtimit. Sasia e rekomanduar e ujit: 200-600 lit/ha.

Patate: kundër *P. Operculella*. Doza e rekomanduar 200 ml/ha. Përdoret nga fillimi deri në fund të fazës së veshit (BBCH 51-59) duke marrë parasysh pragun e dëmtimit. Sasia e rekomanduar e ujit: 400-600 lit/ha.

Perime: kundër afideve. Doza e rekomanduar 0.05% (50 ml/100 L ujë). Përdoret nga fillimi deri në fund të fazës së veshit (BBCH 51-59) duke marrë parasysh pragun e dëmtimit. Sasia e rekomanduar e ujit: 200-400 lit/ha.

Vreshtari: kundër *Lobesia botrana*, *Polychrosis botrana*. Doza e rekomanduar 0.03% (30 ml/100 lit ujë). Përdoret nga fillimi deri në fund të fazës së veshit (BBCH 51-59) duke marrë parasysh pragun edëmtimit. Numri maksimal i trajtimeve në sezonin e rritjes: 1. Sasia e rekomanduar e ujit: 400-600 lit/ha.

Ullinj: kundër *Bractocera olea*. Doza e rekomanduar 300 ml/ha. Përdoret nga fillimi deri në fund të fazës së veshit (BBCH 51-59) duke marrë parasysh pragun edëmtimit. Sasia e rekomanduar e ujit: 200-600 lit/ha.

Domate, patëllxhan në fushë: kundër *Helicoverpa armigera*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Ahididae*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pas shfaqjes së dëmtuesve në bimët e reja ose kur vihet re dëmtimi i parë, nga faza e fidanit deri në fund të fazës së pjekjes së frutave (BBCH 10-89). Sasia e rekomanduar e ujit: 600 lit/ha.

Kastravec, kunguj të njomë në fushë: kundër *Delia florilega*, *Delia platura*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*.

Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pas shfaqjes së dëmtuesve në bimët e reja ose kur vërehet dëmtimi i parë, nga faza e fidanit deri në fund të fazës së pjekjes së frutave (BBCH 10-89). Sasia e rekomanduar e ujit: 600 lit/ha.

Domate, patëllxhan në serë: kundër *Trialeurodes vaporariorum*, *Thrips tabaci*, *Ahididae*, *Agromyzidae*, *Hadeninae*, *Plusia gamma*, *Helicoverpa armigera*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pas shfaqjes së dëmtuesve në bimët e reja ose kur vërehet dëmtimi i parë, nga faza e fidanit deri në fund të fazës së pjekjes së frutave (BBCH 10-89). Sasia e rekomanduar e ujit gjatë përdorimit të spërkatësve të dorës: 300-2000 lit/ha (3-20 lit/100 m²).

Kastravec, kungull i njomë në serë: kundër *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Ahididae*, *Agromyzidae*, *Trialeurodes vaporariorum*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pas shfaqjes së dëmtuesve në bimët e reja ose kur vërehet dëmtimi i parë, nga faza e fidanit deri në fund të fazës së pjekjes së frutave (BBCH 10-89). Sasia e rekomanduar e ujit kur përdorni spërkatës dore: 300-2000 lit/ha (3-20 lit/100 m²).

Duhani: kundër *Thrips tabaci*, *Myzus persicae*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pasi të shfaqen dëmtuesit në bimët e reja ose të vërehet dëmtimi i parë, që nga fazat e fidanit deri në kafe më shumë se 90% të bishtajave të farës (BBCH 10-89). Sasia e rekomanduar e ujit: 200-800 lit/ha.

Bimët zbukuruese: kundër *Trialeurodes vaporariorum*, *Thysanoptera*, *Psylloidea*, *Cecidomyiidae*, *Coccoidea*, *Otiorthynchus*, *Lepidoptera*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pas shfaqjes së dëmtuesve në bimët e reja ose kur vërehet dëmtimi i parë, BBCH 10-89. Sasia e rekomanduar e ujit: 300-2000 lit/ha (3-20 lit/100m²).

Fidanishtet e pemëve halore, fidanishtet e pemëve gjetherënëse, shkurret dekorative: kundër *Melontha melolontha*, *Amphimallon solstitiale*, *Hylobius abietis*, *Pissodes sp.*, *Dendrolimus pini*, *Diprion pini*, *Lymantia monacha*, *Celphesia spp.*, *Acantholyda spp.*, *Rhyacionia spp.*, *Aredus cinnamomeus*, *Brachyderes incanus*, *Phylopertha horticola*, *Erisoma lanigerum*, *Thysanoptera*, *Cecidomyiidae*, *Ahididae*. Doza e rekomanduar 0,1 lit/ha. Aplikoni pas shfaqjes së dëmtuesve në bimët e reja ose kur vërehet dëmtimi i parë, nga faza e fidanëve deri në fund të sezonit të rritjes (> BBCH 10). Sasia e rekomanduar e ujit: 200-800 lit/ha.

Në gjithë bimët aplikohet 1 trajtim/sezon rritje.

Vërejtje për përdorimin:

Produkti funksionon në mënyrë më efektive në temperatura nën 20 °C. Në temperatura më të larta, kryeni trajtime në fund të ditës. Kryeni trajtimin me kujdes në mënyrë që të gjitha pjesët e bimëve të mbulohen me lëngun e përdorshëm. Reshjet e dendura më herët se 6 orë pas trajtimit mund të zvogëlojnë efektivitetin e agjentit. Për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos përdorni: kur barërat e këqija të lulëzuar janë të pranishme në kulturën e mbrojtur; në vendet ku bletët janë në kullotje.

Karenca:

Molla 7 ditë; Domate, patëllxhan, kastravec, kungull i njomë 3 ditë.

Ndikimi në mjedis:

Mos e ndotni ujin me produktin ose me paketimin e tij. Mos e lani aparatën pranë ujit sipërfaqësor. Shmangni ndotjen e ujit përmes kanaleve kulluese nga fermat dhe rrugët. Shmangni lëshimin e paqëllimshëm në mjedis.

E rrezikshme për bletët. Për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos e përdorni në vendet ku bletët kanë përdorim, kur shfaqen barërat e këqija të lulëzuara si dhe gjatë periudhës së aktivitetit të bletës.

Për kultivimin e grurit dimëror dhe të repës dimërore: Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse 10 metra e gjerë nga rezervuarët dhe rrjedhat ujore..

Për të mbrojtur bimët dhe artropodët që nuk janë objektiv i produktit, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse 1m e gjerë nga zonat jo bujqësore.

Për pemëtoret e mollës: Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse nga

rezervuarët dhe rrjedhat ujore megjerësi prej: 50 m me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë rrjedhjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 75% ose 95 m.

Për të mbrojtur artropodët jo të synuar, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse 30 m e gjerë nga zonat jobujqësore.

Në rastin e domates, patëllxhanit, kastravecit, kungujve të njomë të rritur në tokë: Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse 20 m e gjerë nga rezervuarët dhe rrjedhat ujore me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë rrjedhjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 50%.

Për të mbrojtur bimët dhe artropodët që nuk janë objektivi i produktit, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me gjerësi prej: 1 m me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë lëvizjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 75% ose 5 m.

Për domate, patëllxhan, kastravec, kungull i njomë të rritur në sera: Produkti është miratuar për përdorim në serra me një strukturë të qëndrueshme, të izoluar nga toka.

Për kultivimin e duhanit, fidanishteve të pemëve halore, fidanishteve të pemëve gjetherënëse, shkurreve zbukuruese < 50 cm.

Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse 20 m e gjerë me terren nga rezervuarët dhe rrjedhat ujore.

Për të mbrojtur bimët dhe artropodët që nuk janë objektivi i produktit, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me gjerësi prej: 1 m me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë lëvizjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 75% ose 5 m.

Për kultivimin e duhanit, fidanishteve të pemëve halore, fidanishteve të pemëve gjetherënëse, shkurreve dekorative > 50 cm.

Për të mbrojtur organizmat ujorë, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me gjerësi nga rezervuarët dhe rrjedhat ujore: 40 m, duke përfshirë terrenin 20 m të gjerë me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë rrjedhjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 75%, ose 60 m, duke përfshirë terrenin 20 m të gjerë.

Për të mbrojtur bimët dhe artropodët që nuk janë objektivi i produktit, është e nevojshme të caktohet një zonë mbrojtëse me gjerësi prej: 3 m me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë rrjedhjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 90%, ose 5 m me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë rrjedhjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 75%, ose 10 m me përdorimin e njëkohshëm të teknikave që reduktojnë rrjedhjen e lëngut të përdorshëm gjatë trajtimit me 50%, ose 15 m.

Trajtimi i mbetjeve të lëngshme dhe pastrimi i aparateve

Mbetjet e lëngut të përdorshëm dhe ujit të përdorur për larjen e aparatit nëse është e mundur, pas hollimit, përdoret në sipërfaqen e trajtuar, ose të asgjësojë përdorimin e zgjidhjeve teknike që sigurojnë degradimin biologjik të substancave aktive të produkteve përmbrojtjen e bimëve, ose asgjësoni atë në një mënyrë tjetër, në përputhje me rregulloret për mbetjet. Lani pajisjen tërësisht pas përdorimit. Në rastin e larjes së aparatit me përdorimin e detergjenteve të destinuara për këtë qëllim, larjet që rezultojnë duhet të trajtohen në përputhje me udhëzimet e bashkangjitura me agjentin larës.

Ruajtja dhe magazinimi:

Ruani në vende të thata, të fresketa dhe pa ndriçim diellor, në paketim origjinal, në temperaturën 0-30° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 54; datë 9.8.2023;

Sasia neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 1000 ml;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: _____;

Data e prodhimit: _____;

Data e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: 3 vjet;

Tipi i ambalazhit bazë: HDPE/PA, HDPE/EvOH, HDPE/F;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Innvigo Sp. z o.o. **Adresa:** Al. Jerolimskie 178, Varszava, Poloni.

Emri dhe adresa e kërkuesit: Innvigo Sp. z o.o. **Adresa:** Al. Jerolimskie 178, Varszava, Poloni.

Emri dhe adresa e distributorit: Agro-Zani SHPK. Lagjia “30 Vjetori”, Rruga “Antipatrea”, Berat.