

VERTIMEC 1,8 EC

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



“KUJDES”

“Lexo etiketen para përdorimit”

I DESTINUAR VETËM PËR PËRDORUESIT PROFESIONISTË.

VERTIMEC 1,8 EC është akaricid - insekticid, me veprim të brendshëm dhe kontakti.

Lënda vepruese: Abamectin 1,8 %

Formulimi: Koncentrat i emulsionueshem (EC)

Deklaratat e rrezikut

H302: E dëmshme nëse gëlltitet.

H319: Shkakton irrim të rëndë syri.

H335: Mund të shkaktojë irrim në frymëmarrje.

H373: Mund të shkaktojë dëme në organe pas ekspozimit të tejzgatur ose të përsëritur. Përmban abamectin dhe Cyclohexanol.

EUH401: Për të shmangur risqet ndaj shëndetit njerëzor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet për përdorimin.

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P405+102: Magazinojeni të kyçur. Mbajeni larg fëmijëve.

P270: Mos hani ushqim, pini lëngje ose duhan kur përdorni këtë produkt.

P260: Mos thithni mjegullën e spërkatjes.

P264: Lani me kujdes lëkurën par trajtimit.

P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse personale për sytë/fytyrën. Vishni veshje të plota mbrojtëse, çizme dhe doreza kur përzieni/ngarkoni dhe spërkatni Vishni uniformë pune kur rihyni në parcelat e trajtuara përpara se të thahet lëngu spërkatës.

P501: Hidheni përmbajtjen/kontejnerin sipas ligjit kombëtar.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Mbani në dispozicion paketimin, etiketën ose MSDS e produktit në rast se kërkoni ndihmë nga mjeku ose nga Qendra e Helmimeve.

P314: Konsultohuni/vizitohuni tek mjeku nëse nuk ndiheni mirë.

P305+P351+P338: NË RAST KONTAKTI ME SYTË: Shpëllajini me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse kenë. Vazhdoni shpëllarjen.

P337+P313: Nëse irrimti i syve vazhdon: Konsultohuni/Vizitoni një mjek.

Në rast gëlltitje: Mos shkaktoni të vjella. Thërisni mjekun dhe tregojini etiketën.

Në rast kontakti me lëkurën: Hiqni rrobat e ndotura dhe shpëlani pjesët e prekura të trupit me ujë. Nëse acarimi vazhdon, i telefononi mjekun. Lani rrobat e ndotura përpara se ti vishni përsëri.

P304+P340: NËSE MERRET ME ORGANËT E FRYMËMARRJES: Nxireni të aksidentuarin në ajër të pastër dhe lëreni të pushojë në një pozicion që lehtëson frymëmarrjen

P312: Telefononi një QENDËR HELMINI apo një doktor nëse nuk ndiheni mirë.

ANTIDOTI: Nuk ka antidot të njohur. Ndiqni trajtim simptomatik. Evitoni dhënjën e barbiturateve, benzodiazepinave dhe acidit valproik. Në rast gëlltitje, jepni 2-3 gota ujë dhe shkaktoni të vjella, vetëm nëse pacienti nuk ka humbur ndjenjat, me irrim të faringut.

Përdorimi:

Kulturat bujqësore	Dëmtuesit	Dozat			Mënyra dhe koha e trajtimit	Nr maksimal i trajtimeve/sezon kultivimi/ Intervali i trajtimeve në ditë
		ml/dynym (max)	ml/ 100 litra ujë	Sasia e tretësirës spërkatës e/dynym		
Bimë	Këpushat:	100	75-100	100	Spërkatje gjethore në	Deri në 4

zbukuruese (S) (bimë, bulba dhe bimë bulbore me lule, pemë, shkurre dhe fidanishte të pemëve pyjore).	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eriophyes spp.</i> Liriomiza: <i>Liriomyza trifolii</i> Tripsi: <i>Frankliniella occidentalis</i> Pleshtat: <i>Psylla spp</i>				fillim të infektimeve	trajtime me interval 7 ditë
Domatja (S)	Këpushat: <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculops lycopersici</i> Liriomizat: <i>Liriomyza sp.</i> Tripset: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips sp</i>	120	80-100	50-120	Spërkatje gjethore me shfaqjen e simptomave të para. Nga shfaqja e gjethes së 2 ^{is} të vërtetë në degën kryesore deri në pjekjen e plotë të frutave. (BBCH 12-89).	Deri në 2 trajtime me interval 7 ditë
Patëllxhani (S)	Këpushat: <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculops lycopersici</i> Liriomizat: <i>Liriomyza sp.</i> Tripset: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips sp</i>	120	80-100	50-120	Spërkatje gjethore me shfaqjen e simptomave të para. Nga shfaqja e gjethes së 2 ^{is} të vërtetë në degën kryesore deri në pjekjen e plotë të frutave. (BBCH 12-89).	Deri në 4 trajtime me interval 7 ditë
Speci (S)	Këpushat: <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculops lycopersici</i> Liriomizat: <i>Liriomyza sp.</i> Tripset: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips sp</i>	120	80-100	50-120	Spërkatje gjethore me shfaqjen e simptomave të para. Nga shfaqja e gjethes së 2 ^{is} të vërtetë në degën kryesore deri në pjekjen e plotë të frutave. (BBCH 12-89).	Deri në 2 trajtime me interval 7 ditë
Kastraveci (S) Kungulli (S)	Këpusha: <i>Tetranychus urticae</i> Liriomizat: <i>Liriomyza sp.</i> Tripset: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips sp</i>	120	80-100	50-120	Spërkatje gjethore me shfaqjen e simptomave të para dhe të këpushave të para. Dozat e mëdha të përdoren për të luftuar popullatat e mëdha të dëmtuesve. Nga shfaqja e kotiledoneve deri në pjekjen e plotë të frutave (BBCH 10-89).	Deri në 2 trajtime me interval 7 ditë
Pjepri (S) Shalqiri (S)	Këpusha: <i>Tetranychus urticae</i> Liriomizat: <i>Liriomyza sp</i> Tripset: <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips sp</i>	120	80-100	50-120	Spërkatje gjethore me shfaqjen e simptomave të para dhe të këpushave të para. Dozat e mëdha të përdoren për të luftuar popullatat e mëdha të dëmtuesve. Nga shfaqja e kotiledoneve deri në pjekjen e plotë të frutave (BBCH 10-89).	Deri në 3 trajtime me interval 7 ditë
Luleshtrydhja (S)	Këpushat: <i>Tetranychus spp.</i>	30-80	60	50-120	Spërkatje gjethore me shfaqjen e simptomave të para dhe të këpushave të para.	Deri në 2 trajtime me interval 7 ditë

Mënyra e veprimit:

Produkti përmban abamectin, që i përket grupit 6 sipas IRAC (aktivizues të kanalit të klorit). Shkakton paralizë të insekteve, të cilët ndalojnë procesin e të ushqyerit dhe ngordhin pas 2-4 ditësh. Ka veprim të fuqishëm kontakti dhe translaminar dhe veprim të kufizuar sistematik.

Mënyra e përgatitjes së tretësirës spërkatëse:

Mbushni me ujë deri në mes pompën spërkatëse dhe duke vazhduar përzierjen shtoni dozën e produktit dhe aty ku rekomandohet vajin mineral. Plotësoni me sasinë tjetër të ujit duke vazhduar përzierjen.

Pastrimi i mjeteve të spërkatjes:

Zbrazni plotësisht rezervuarin e pompës spërkatëse. Sigurohuni që të jenë hequr të gjitha gjurmët e produktit Shpëlani tre (3) herë me ujë të pastër rezervuarin dhe të gjitha pjesët e makinës spërkatëse.

Udhëzime për tërheqjen e sigurt të produktit dhe paketimit:

Shishet bosh të ambalazhit shpëlahen me ujë nën presion ose shpëlahen tre herë (uji i shpëlarjes hidhet në rezervuarin e pompës spërkatëse) dhe pastaj pasi të jenë shkatërruar paraprakisht duke i shpuar, për të siguruar mos ripërdorimin, të vendosen në pikat e grumbullimit për riciklimin ose rikuperimin e energjisë.

Produkti nuk duhet të përdoret në kulturat e ngrënshme në serra të gjatë muajve të dimrit (nëntor - shkurt), duke përjashtuar kulturat e domates dhe patëllxhanit.

Periudha e sigurisë midis trajtimit dhe rifutjes së njerëzve ose të kafshëve në zonën e trajtuar:

Deri sa të thahet plotësisht tretësira spërkatëse në sipërfaqen e gjetheve.

Verejtje per përdorimin:

Nuk rekomandohet përzjerja me preparate të tjera. Lejohet vetëm për përdorime që lejojnë shkëmbimin e kontrolluar të materialit dhe energjisë me mjedisin përreth dhe parandalojnë lëshimin e produktit në mjedis, veçanërisht përdorimet në serra të përhershme.

Menaxhimi i rezistencës:

Produkti përmban abamectin, që i përket grupit 6 sipas IRAC. Për të shmangur zhvillimin e rezistencës, rekomandohet alternimi me insekticide nga grupe të tjera me mënyrë tjetër veprimi.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret në kulturat dhe dozat e rekomanduara në kete etikete.

Ndikimi në ekosistem:

H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata. Përmban cikloheksanol dhe hidroxytoluene të butilizuar. Evitoni shpërndarjen e tretësirës spërkatëse në sipërfaqet ujore.

SP1: Mos ndotni ujrën me preparatin ose me ambalazhin e tij. Mos i lani pajisjet e spërkatjes pranë ujrave sipërfaqësore.

SPe3: Për të mbrojtur organizmat ujorë dhe organizmat jo objekt luftimi të zbatohen masat e mëposhtme mbrojtëse:

- Për trajtimet në kulturat gjethegjera dhe perime, lini një zonë mbrojtëse të paspërkatur prej 10 m.

- Për trajtimet e kulturave të tjera lini një zonë 30 m të pa spërkatur ose alternativisht një zonë 15 m të paspërkatur në kombinim me përdorimin e sprucatorëve që ulin 90% shpërndarjen e lëngut spërkatës.

SPe3: Për të mbrojtur artropodët jo objekt luftimi të zbatohen masat e mëposhtme mbrojtëse:

- Për trajtimet në kulturat gjethegjera dhe perime, lini një zonë 5 m të pa spërkatur, nga tokat e papunuara.

Spe8: Mundësisht e rrezikshme për bletët. Për të mbrojtur bletët dhe insektet e tjera pjalmuese, mos e përdorni produktin në kulturat bujqësore gjatë lulëzimit ose gjatë periudhës së lulëzimit të barërave të këqija. Mos e përdorni produktin gjatë sezonit kur bletët janë duke punuar. Për të mbrojtur bletët, bletarët në zonë duhet të informohen në mënyrë që bletët të largohen nga zona për të paktën: 43 orë nga koha e trajtimit në kulturën e domates në fushë të hapur; 96 orë nga momenti i trajtimit në kulturat e serrave për të vendosur pjalmues/bletë në serra.

Trajtimi i fundit para vjeljes:

Prodhime bimore	Ditë
Domatja (S), Patëllxhani (S), Kastravec (S), Kungulli (S), Pjepri (S), Shalqiri (S), Luleshtrydhja (S)	3
Speci (S)	7
Bimë zbukuruese (S) (bimë, bulba dhe bimë bulbore me lule, pemë, shkurre dhe fidanishte të pemëve pyjore).	Nuk përcaktohet

Magazinimi:

Ai mbetet i qëndrueshëm për të paktën dy (2) vjet nëse mbahet në paketimin e tij origjinal, të mbyllur, larg zjarrit ose burimeve të tjera të nxehtësisë, në një vend të thatë, të freskët dhe të ajrosur mirë.

Nr dhe data e regjistrimit: 181/3, datë 6.12.2023;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 10 ml deri në 5 litër;

Data e prodhimit..... ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 2 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese..... ;

Tipi i ambalazhit baze: shishe HDPE (High density polyethylene) dhe f-HDPE;

Emri dhe adresa e kerkuesit: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Bazel, Switzerland;

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Bazel, Switzerland.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise):