

CUPROFIX ULTRA DISPERSS

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE

“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”



GHS07

GHS09

CUPROFIX ULTRA DISPERSS është një fungicid organik me bazë bakri në formën e granulave disperse, efektiv kundër: vrugjeve, alternariozave, antraknozave, septoriozave, bakteriozave. Ka veprim parandalues, kurues dhe antisporulant nepermjet kontaktit, duke frenuar mbirjen e sporeve dhe zhvillimin e micelit.

Permbajtja: Baker metalik 40% (400 g/Kg ne formen e Sulfatit te Bakrit Trebazik).

Formulimi: Granula të dispersueshme në ujë (WG).

GRUPI	M0	FUNGICI
	1	D

Masat parambrojtëse:

H302 I dëmshëm nëse gëlltitet;

P264 Pas përdorimit, lani tërësisht fytyrën, duart dhe çdo pjesë të ekspozuar të lëkurës;

P270 Mos hani, pini ose pini duhan gjatë përdorimit;

P273 Mos e derdhni në mjedis. P280 Vishni doreza/veshje/mbrojtje për sytë/mbrojtje për fytyrën;

P301+P312 NËSE GËLLITET: Thirrni QENDRËN/Mjekun e Helmimeve nëse nuk ndiheni mirë;

P391 Mblidhni derdhjen;

P501 Hidhni përmbajtjen/kontejnerin në përputhje me rregulloren kombëtare.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Simptomat: denatyrim i proteinave me leziona në mukozën, dëmtime hepatike dhe renale dhe të SNQ, hemolizë. Të vjella me emetim të materialit me ngjyrë të gjelbër, djegie gastroezofageale, diarre me gjak, dhimbje barku, verdhëz hemolitik, insuficiencë hepatike dhe renale, konvulsione, kolaps. Ethet e thithjes së metaleve. Iritues i lëkurës dhe i syve. Terapia: gastroluza me tretësirë lakto-albuminoze, nëse kupremia është e lartë përdor agjentë kelarues, penicilaminë nëse rruga orale është e zbatueshme ose CaEDTA intravenoze dhe BAL intramuskular; përndryshe terapi simptomatike. Paralajmërim: Konsultohuni me Qendrën e Kontrollit të Helmimeve.

Përdorimi:

Është një formulim i bazuar në sulfatin tribazik të bakrit, i përgatitur me një proces të veçantë industrial të patentuar që garanton një efikasitet shumë të lartë të jonit të bakrit dhe një selektivitet të veçantë në kulturat e trajtuara duke kryer një funksion fungicid dhe bakteriostatik optimal. Vepron edhe në sasi të reduktuara të bakrit për hektar. Formulimi special DISPERSS® ndihmon gjithashtu për ta bërë formulimin shumë të lehtë për t'u përdorur falë lehtësisë së dozimit, shpërndarjes së menjëhershme në ujë dhe karakteristikave superiore të përputhshmërisë dhe përzierjes me formulime të tjera më të përdorura.

Ne vreshtari: Kunder vrugut (*P. Viticola*) me 0.1-0.3% (1-3 kg/ha) në vartesi të kushteve klimatike dhe intensitetit të semundjes.

Ne peme frutore farore (molle, dardhe, etj.): Kunder kromave (*Venturia spp.*), bakteriozave (*Pseudomonas spp.*; *Xanthomonas spp.*; *Erwinia amylovora*), kancerit të degeve (*Nectria spp.*), njollosjes kafe (*Stemphylium vesicarium*). Në trajtimet dimerore, me doze 0.25% (1.25-3.75 kg/ha), në trajtimet pranverë-verorë, duke filluar para hapjes së luleve e deri në vjelje, me doze 0.035-0.165% (0.5-2.5 kg/ha)

Ne peme frutore berthamore (pjeshke, kumbulla, qersh, etj.): Kunder tafrinies (*T. deformans*), monilies (*Monilina spp.*), *Coryneum beijerinckii*, bakteriozave (*Pseudomonas spp.*; *Xanthomonas spp.*). Në trajtimet dimerore me doze 0.25% (2-35 kg/ha), në trajtimet pranverë-verorë, duke filluar gjatë gjithë vegjetacionit, me doze 0.085-0.165% (1.25- 2.5 kg/ha)

Ne agrume: Kunder fitoftores (*Phytophthora spp.*), alternaries (*Alternaria spp.*), bakteriozave (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*), me doze 0.1-0.125% (2-2.5kg/ha).

Ne aktinidie: kunder bakteriozes (*Pseudomonas spp.*) në trajtimet dimerore me doze 0.27-0.35%, ndërsa në trajtimet gjatë vegjetacionit me doze 0.05-0.125% (0.5-1.25 kg/ha).

Ne ullinj: kunder syrit te palloit (*Spilocaea oleaginea*), antraknozes (*Gloeosporium olivarum/Colletotrichum acutatum*), bakteriozes (*Pseudomonas savastanoi*), me doze 0.08-0.2% (1.25-3 kg/ha).

Ne lajthi: kunder alternares (*Alternaria spp.*), antraknozes (*Colletotrichum spp.*), citospores (*Cytospora corylicola*), bakteriozave (*Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.*), me doze 0.1-0.2% (1.5-3 kg/ha).

Ne arre: kunder bakteriozes (*Xanthomonas spp.*) me doze 0.125-0.5%, me fillimin e vegjetacionit deri ne lulezim (1.25-5 lit/ha)..

Ne solanace (domate per industri dhe konsum, patllixhan, patate): kunder vrugut (*P. infestans*), alternaries (*A. solani*), antraknozes (*Colletotrichum spp.*), bakteriozave (*Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.*), me doze 0.125-0.25%; ne patate me doze 0.18-0.3% (1.7-3 kg/ha).

Ne kungullore (kungull, shalqi, pjepër, trangull): kunder vrugut (*Psudoperonospora cubensis*), bakteriozave (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*), me doze 0.125-0.25% (1.25-2.5 kg/ha).

Ne angjinat dhe asparagus: kunder vrugut (*Bremia spp.*); bakteriozave (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*), alternaries (*Alternaria spp.*), me doze 0.125-0.2% (1.25-2 kg/ha).

Ne laker, lule laker, brokoli: kunder vrugut (*Peronospora brassicae*), bakteriozave (*Xanthomonas spp.*), me doze 0.125-0.25% (1.25-2.5 kg/ha).

Ne sallate, rukola, endivia, valeriana dhe perime te tjera gjithore: kunder vrugut (*Bremia lactucae*), alternaries (*Alternaria spp.*), bakteriozave (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*), me doze 0.17-0.25% (1.75-2.5 kg/ha).

Ne perime frutrenjore: (karote, repe, panxhar i kuq, selino, etj.) kunder alternaries (*Alternaria spp.*), cercospores (*Cercospora beticola*), vrugut (*Peronospora crustosa*), bakteriozave (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*), me doze 0.125-0.25% (1.25-2.5 kg/ha).

Ne leguminoze (fasule, bizele, qiqra, thierza), kunder antraknozes (Colletotrichum spp.), vrugut (Peronospora spp.), bakteriozes (Pseudomonas spp.), me doze 0.125-0.25% (1.25-2.5 kg/ha).

Ne perime bulbore (qepe, hudhra, etj.), kunder vrugut (Peronospora destructor), bakteriozes (Pseudomonas spp.), me doze 0.17-0.25% (1.7-2.5 kg/ha).

Ne lule shtrydhe: kunder njollosjes se kuqe (*Mycosphaerella spp.*), antraknozes (*Colletotrichum spp.*), bakteriozes (*Xanthomonas spp.*), me doze 0.19-0.25% (1.9-2.5 kg/ha).

Panxhar sheqeri: kunder cercospores (*Cercospora beticola*), me doze 0.25-0.3% (2.5-3 kg/ha).

Ne bime zbukuresh ornamentale: kunder antraknozes (*Colletotrichum spp.*), bakteriozes (*Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.*), me doze 0.17-0.25% (1.7-2.5 kg/ha).

Dozat e rekomanduara i referohen perdorimit me nje volum uji nominal (psh. ne vresh 1000 lit/ha, peme frutore 1500 lit/ha. Ndersa ne perime ne vartesi te fazes vegjetative 400-1000 lit/ha. Ne rastet kur aplikojme volume te ndryshme do ti referohemi gjithmone sasise se produktit per hektar por pa tejkualuar sasite e rekomanduara me siper.

Fitotoksiciteti:

Mos e trajtoni gjate lulëzimit. Në varietetet e mollës dhe dardhës të ndjeshme ndaj bakrit, produkti mund të jetë fitotoksik. Në raste të tilla, përdorimi i tij nuk rekomandohet pas rritjes së plotë vegjetative. Mollët e ndjeshme: Belford Abundance, Black Stayman, Grupi Golden Delicious group, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Dardha të ndjeshme: Good Louise of Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dr. Jules Guyot, i preferuari i Clapp, Santa Maria, Dekani i Komitetit, Butirra Giffard. Për siguri të mëtejshme dhe/ose në rastin e një varieteti të futur së fundmi, këshillohet që të kryhet një test paraprak në një pjesë të kufizuar të bimësisë. Për të minimizuar akumulimin e mundshëm në tokë dhe ekspozimin ndaj organizmave jo të synuar duke marrë parasysh kushtet agroklimatike, mos e tejkalo ni aplikimin kumulativ të 28 kg bakër për hektar gjatë 7 viteve. Rekomandohet të respektohet sasia mesatare e aplikuar prej 4 kg bakër për hektar në vit.

Ndikimi në ekosistem:

H410 Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata;

EUH401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim;

Mos ndotni ujrat e rjedhshme ose basenet me produktin ose enën e tij. Mos pastroni mjetet e aplikimit pranë ujrave sipërfaqësor. Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit ne ferma dhe rrugë. Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një brez sigurie nga basenet ujorë sipërfaqësorë prej: - 5 metra per perimet, frutat, lulet zbukuruese, luleshtrydhet, panxhar sheqer, bishtajoret dhe patatet; - 10 metra për në hardhi (trajtime të hershme); - 20 metra ne ulli dhe agrume; - 20 metra kur përdoret 75% masa zbutëse të solucionit për aplikime në peme frutore farore dhe berdhamore (trajtime të hershme); - 10 metra duke përdorur masa zbutëse 50% ose 15 metra për aplikime në peme frutore farore dhe berdhamore (trajtime të vonshme), aktinidie, hardhi (trajtimet e vonshme) dhe lajthi; - 20 metra duke përdorur 50% masa zbutëse të solucionit ne trajtimet ne kulturat e arave.

Karenca:

Në rrush, fruta farore dhe berthemore, shalqi, pjeper, patate, sallatat 7 dite; agrume, ullinj, arra, lulelaker, laker, brokoli, fruttrrenjoret, panxhar sheqeri dhe lajthi 14 dite; aktinide 15 dite; domate e fresket, patllixhan, kungullore, karcof, bishtajore, bulore, luleshtrydhe 3 dite; domate per industri 10 dite;

Magazinimi:

Magazinohet në vende të fresketa, pa lageshti, në temperaturë 0-40⁰ C.

Numri dhe data e regjistrimit: 784, datë 29.4.2022;

Sasinë neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 1kg;

Numrin e serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;

Data e prodhimit:_____;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 2 vjet;

Llojin e ambalazhit bazë: Material 3-shtresor për mbrojtjen nga lagështia;

Emri dhe adresa e kërkuesi: UPL Europe Ltd. **Adresa:** Warrington, Cheshire, Mbretëria e Bashkuar;

Emri dhe adresa e prodhuesit: UPL Europe Ltd. **Adresa:** Warrington, Cheshire, Mbretëria e Bashkuar;