SYLLIT 544 SC

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

"Lexo fletudhëzuesin para përdorimit"

GHS07 **GHS08** **GHS09**

Fungicid organik per kontorllin e kromes ne peme frutor, fleteperdredheses ne pjeshke, syrit te palloit dhe antraknozes ne ulli dhe fletebirueseve ne berthamore

Permbajtja: *Doden e pastër 52.9 g (544 gr/lit);*
Formulimi: *Koncentrat i suspensueshëm (SC).*

GRUPI **U12** FUNGICID

Masat parambrojtëse:
H302+H332: I dëmshme nëse gëlltitet ose thithet;
H315: Shkakton acarim të lëkurës;
H318: Shkakton dëmtime serioze të syve;
H410: Shumë toksike për organizmat ujorë dhe me efekt të gjatë;
EUH208: Përmban 1,2- benzisothiazol-3 (2H) – një;
EUH401: Për te shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe për mjedisit, ndiqni udhëzimet për përdorim.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:
P261: Shmangni frymëmarrjen e avujve;
P270: Mos hani, pini ose pini duhan gjatë përdorimit;
P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje/Mbroni sytë tuaj/Mbroni fytyrën tuaj;
P302+P352: NË RAST KONTAKTI ME LEKUREN: I lani me ujë të bollshëm e sapun;
P305+P351+P338: NË RAST TË KONTAKTI ME SY: shpëlarje me kujdes për disa minuta. Hiqen lentet e kontaktit nëse është e lehtë për ta bërë këtë. Vazhdoni shpëlarjen;
P310: Kontaktoni menjëherë një QENDËR HELMIMI ose një mjek;
P501: Asgjesoni produkti/enë në përputhje merregulloret lokale ne fuqi;
Simptomat: Ne sistemin gastrointestinale: dhimbje barku, djegie gastroezofageale, diarre; Ne sisitemin kardiovaskular: hipotension, cianozë, aritmi, acarim të lëkurës dhe membranat mukoze (dermatiti, konjuktiviti, nazofaringiti). Dermatiti shfaqet për shkak të kontaktit të përsëritur rëndohet nga fotosensibilizimi, rezistent ndaj terapisë. Terapia: simptomatike.

Përdorimi:
SYLLIT 544 SC është një fungicid me veprim parandalues dhe kurues i formuluar në suspension te koncentruar, i karakterizuar nga ngjitshmëria e lartë, uniformiteti i shpërndarjes në bimësi dhe rezistenca ndaj shplarjes.
Ne peme frutore: (mollë, dardhë, ftua, nespull) kundër kromes (*Venturia spp.*). Perdoret me doze 1,25 l/ha, e cila mund te shperndahet me 200-1500 l/ha ujë (zakonisht 1000-1500). Trajtimet duhet të kryhen në mënyrë parandaluese duke filluar me cfaqien e vegjetacionit deri para vjeljes. Mund të përdoret edhe në trajtimet kurative brenda 24 orëve nga fillimi i infeksionit (48 orë me temp të ulëta). Në mollë rekomandohet te kryhen 2 trajtime ne interval jo me pake se 7 ditore. Preferohen trajtimet ne fazen e vesheve te miut e deri para lulezimit, pasi eshte shume efektiv edhe ne temperaturat e uleta te kesaj faze.
Ne Qershi: kundër *Cilindrosporiosi dhe Apiognomonia*. Perdoret me doze 1.25 l/ha, duke përdorur 500-1500 l / ha ujë (zakonisht 1000-1500). Trajtimet duhet të kryhen preventive duke filluar nga fillimi i lulëzimit deri në vjelje. Nuk duhet te kryeni me shumë se 2 trajtime në vit ne intervale jo me pake se 7 ditore.
Ne Pjeshkë, nektarina dhe hibride të ngjashme: kunder flete perdredheses (*T.deformans*). Perdoret me doze 1,65 l/ha, duke përdorur 500-1500 l/ha ujë (zakonisht 1000-1500). Trajtimet duhet të kryhen nga faza e fryrjes se sythave deri në rënien e petaleve dhe/ose pas vjeljes me renien e 50% te gjetheve deri në renien e plotë te gjetheve. Nuk duhet te kryeni me shumë se 2 trajtime në vit.

Ne Ulli (ullinj tavoline): kundër antraknozes *(Colletotrichum gloesporioides*) dhe syrit të palloit. Perdoret me doze 1,65 l/ha, duke u shperndare me 1000 l/ha. uje. Trajtimet duhet të kryhen në mënyrë parandaluese vetëm në vjeshtë pas vjeljes. Kryen jo me shume se 2 trajtime në vit ne nje distancë jo me pake se 7 ditore.
Ne Ulli (ullinj per vaj): kundër antraknozes dhe syrit të palloit. Perdoret me doze 1,65 l/ha, duke u shperndare me 1000 l/ha. uje. Trajtimet duhet të kryhen paraprakisht duke filluar nga faza e zhvillimit të gjetheve deri në fund të lulëzimit dhe/ose në vjeshtë. Kryen jo me shume se 2 trajtime në vit ne nje distancë jo me pake se 7 ditore.
Ne plepa në fidanishte dhe plantacion: kundër *Marssonina*. Perdoret me doze 1.3-1,65 l/ha, duke u shperndare me 1000 l/ha. Trajtimet duhet të kryhen paraprakisht nga qershori në gusht. Kryen jo me shume se 2 trajtime në vit ne nje distancë jo me pake se 20 ditë.

Verejtje per perdorimin:
Përgatitja e përzierjes: Mbushni rezervuarin e spërkatës me gjysmën e sasise se ujit qe do përdorni duke mbajtur te aktivizuar perziersin. Hidh sasinë e kërkuar të SYLLIT 544 SC duke e perzier fuqishëm dhe shtoni ujin e mbetur, duke filluar shpërndarjen menjëherë pas mbushjes dhe duke mbajtur perzieresin aktiv gjate gjithe kohes deri ne zbrazje te depozites.

Fitotoksiciteti:
Ne varietetin e mollës *Golden Delicious* rekomandojmë mos e aplikoni produktin në periudhën ndërmjet formimit të frutave derisa fruti arin madhesine e kokres se arres. Kontaktoni me perfaqesuesit lokal per cdo paqartesi. Rekomandohet të kryhen testet paraprake në rast të përdorimit në varietete të reja ose ne përzierje me produkte të tjera fitosanitare.
Perputhshmeria: Nuk është i përputhshëm me squfurin, lengun bordolese, kaptan, zink, bakër dhe kalcium.

Ndikimi në ekosistem:
Pak helmues për bletët. Mos ndotni ujrat me produktin ose enën e tij. Mos pastroni mjetet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësore. Shmangni ndotjet përmes sistemeve të kullimit të ujit ne fermat bujqësore dhe rrugë. Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një brez sigurie të patrajtuara te distancuar nga basenet ujorë:
- 12 metra duke aplikuar një reduktim total prej 90% te hedhjes për peme frutore (në dozën më të ulët);
- 4 metra për ullinj (duke perdorur dozat më e ulëta).

Karenca:
7 dite per ullirin, 14 dite per qershine, 28 dite per mollen, 60 dite per faroret; 75 dite per pjeshket.

Magazinimi:
Magazinohet në vende të fresketa, pa lageshti, në temperaturë 5-40^0 C;

Numri dhe data e regjistrimit: 787, datë 29.4.2022;
Sasia neto e PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 1l;
Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;
Data e prodhimit:_____;
Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 2 vjet;
Lloji i ambalazhit bazë: Shishe HDPE dhe COEX;
Emri dhe adresa e kërkuesi: Arysta LifeScience Benelux SPRL. **Adresa:** Ougrée, Belgjikë;
Emri dhe adresa e prodhuesit: Arysta LifeScience Benelux SPRL. **Adresa:** Ougrée, Belgjikë.