

MILSAJ

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE
LEXONI ETIKETEN PARA PERDORIMIT

GRUPI

5

INSEKTICID



GHS09

Fjale sinjalizuese : KUJDES

Permbajtja : 480 g/lit Spinosad

Formulimi : Suspension i Koncentruar (SC)

MILSAJ është një insekticid me baze Spinosad, një përbërës aktiv i ekstraktuar prej bakterit *Saccharopolyspora spinosa* i cili është i pranishëm në mënyrë natyrale në mjedis.

MILSAJ kontrollon në mënyrë efektive tripset, tenjat, larvat e lepidoptereve dhe larvat e noktuideve. Duke qarkulluar në bime në mënyrë translaminare ai vepron si me kontak ashtu edhe me ngrenie.

Deklaratat e rrezikut:

H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata

EUH208: Përmban benzisothiazol-3(2H)-on. Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet e përdorimit.

Deklaratat paraprake:

P101: Nëse nevojitet këshilla mjekësore, mbani afër enën ose etiketën e produktit.

P102: Mbajeni larg fëmijëve.

P273: Shmangni lëshimin në mjedis.

P391: Mblidhni derdhjet.

P501: Hidhni përmbajtjen/enën në përputhje me rregulloret kombëtare në vendet e caktuara të asgjësimit të mbeturinave të rrezikshme ose të veçanta.

Etiketim shpeshtë:

SP1: Mos lejoni që ky produkt për mbrojtjen e bimëve (PPP) ose ena e tij të ndotë ujin. (Mos i pastroni pajisjet e aplikimit të pesticideve pranë ujërave sipërfaqësore./Shmangni kontaminimin përmes kanaleve të fermave ose rrugëve).

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 15 metrash ose 10 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 50% për aplikime të vona në vreshta prane ujërave sipërfaqësore për të mbrojtur organizmat ujorë.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 10 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 75% ose 20 metra me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 50% ose sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 90% për aplikime të hershme në vreshta prane ujërave sipërfaqësore për të mbrojtur organizmat ujorë.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 10 metrash ose 5 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 50% për aplikime në domate, specat dhe patëllxhan prane ujërave sipërfaqësore për të mbrojtur organizmat ujorë.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 20 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 90% për aplikime të hershme në kulturat e frutave farore dhe berthamore prane ujërave sipërfaqësore për të

mbrojtur organizmat ujorë. Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 10 metrash me gryka që zvogëlojnë zhvendosjen me 90% ose 20 metra me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 75% për aplikime të vona në kulturat e frutave farore dhe berthamore prane ujrave sipërfaqësore për të mbrojtur organizmat ujorë.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 5 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 50% për aplikime në perime gjethore prane ujrave sipërfaqësore për të mbrojtur organizmat ujorë.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 5 metrash ose sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 75% kur aplikohet në domate, patëllxhan, specia dhe perime gjethore në fushë për të mbrojtur artropodët jo-target ne tokar jobujqësore.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 10 metrash ose sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 75% kur aplikohet herët në vreshta prane tokave jo-bujqësore për të mbrojtur artropodët jo-target. Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 15 metrash ose 5 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 90% kur aplikohet vonë në vreshta prane tokave jobujqësore për të mbrojtur artropodët jo-target.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 15 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 90% për aplikime të hershme në kulturat e frutave sprucatore prane tokave jobujqësore për të mbrojtur artropodët jo-target.

Spe3: Siguroni një zonë tampon të patrajtuar prej 10 metrash me sprucatore që zvogëlojnë zhvendosjen me 90% për aplikime të vona në kulturat e frutave sprucatore prane tokave jobujqësore për të mbrojtur artropodët jo-target.

Spe8: I rrezikshëm për bletët./ Mos e aplikoni në kultura gjatë lulëzimit për të mbrojtur bletët./ Mos e përdorni aty ku bletët kullosin në mënyrë aktive./ Zhvendosni ose mbuloni koshere bletësh gjatë trajtimit./ Mos e aplikoni në barërat e këqija që lulëzojnë./ Hiqni barërat e këqija para lulëzimit.

Udhëzime për ndihmen e pare:

Mbajeni larg fëmijëve. Shmangni kontaktin me sytë, lëkurën dhe rrobat ose thithjen e produktit. Gjate punes mosh hani, pini ose tymosni duhan. Përdorni pajisje mbrojtëse personale - doreza mbrojtëse dhe rroba pune (që mbulojnë duart, trupin dhe këmbët) gjatë përzierjes/ngarkimit dhe aplikimit të produktit.

Në rast kontakti me lëkurën: Lani plotësisht zonën e prekur me ujë dhe sapun neutral. Në rast shenjash në lëkurë (skuqje, flluska,), kërkonte ndihmë mjekësore. Merni me vete fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

Në rast kontakti me sytë: Ky produkt nuk përmban substanca të klasifikuara si të rrezikshme në rast kontakti me sytë. Shpëlani sytë plotësisht për të paktën 15 minuta me ujë të vakët, duke u siguruar që viktima të mos i fërkojë ose mbyllë sytë.

Në rast gëlltitjeje: Kërkoni ndihmë të menjëhershme mjekësore. Merni me vete fletën e të dhënave të sigurisë së produktit. Produkti nuk ka antidot specifik. Mjekimi kryhet sipas simptomave.

Përdorni pajisje mbrojtëse personale – doreza mbrojtëse dhe rroba pune (që mbulojnë duart, trupin dhe këmbët) gjatë përzierjes/ngarkimit dhe aplikimit të produktit.

Vishni rroba pune (që mbulojnë duart, trupin dhe këmbët) kur hyni përsëri në zonat e trajtuara.

Rregulli standard: Mos hyni në zonat e trajtuara para se tretësira e punës në sipërfaqet e gjetheve të jetë tharë plotësisht.

Asgjësimi i sigurt i mbetjeve të produktit:

Pas përdorimit, shpëlajeni paketimin tri herë me dorë ose me një pajisje me ujë të presionuar. Hidhni ujin e shpëlarjes në rezervuarin e spërkatësit. Paketimi bosh duhet të bëhet i papërdorshëm dhe nuk duhet të ripërdoret për asnjë qëllim. Ky material dhe paketimi i tij duhet të trajtohen si mbetje të rrezikshme dhe të hidhen vetëm në pikat e grumbullimit të mbetjeve të rrezikshme ose të veçanta. Mos i hidhni pesticidet, mbetjet e pesticideve dhe ujin e larjes së mbeturinave së bashku me mbetjet shtëpiake. Pesticidet, mbetjet e pesticideve ose paketimi bosh duhet të asgjësohen sipas rregullave lokale në fuqi.

KARAKTERISTIKAT:

Produkti përmban spinosad, i cili i përket grupit kimik të modulatorëve alosterikë të receptorit nikotinik të acetilkolinës (nAChR) - vendi I (grupi 5 IRAC). Spinosad shkakton ngacmim të sistemit nervor të insektit, gjë që çon në tkurrje të pavullnetshme të muskujve, përkulje me dridhje dhe në fund paralizë. Spinosad vepron me anë të kontaktit dhe gëlltitjes dhe ka aktivitet translaminar. Është efektiv për kontrollin e një game të gjerë dëmtuesish (insekte thithëse dhe kafshuese) në një numër të madh të kulturave.

PËRDORIMI:

Doza e përgjithshme e përdorimit : 158-200 ml produkt/ha

Numri maksimal i aplikimeve në vit: 1

Ne vreshtari per kultivaret e veres the tavolines kunder tenjes (*Lobesia botrana*) me 15.8-20 ml/dy.(ne fenofazen BBCH 53 – 89) dhe tripsit (*Frankliniella occidentalis*) me doze 15.8-20 ml/dy (ne fenofazen BBCH 11 – 89). Sasi e solucionit sperkates 50-100 lit/dy.

Ne domate, specat, patllixhan, (ne fenofazen BBCH 14-89) kunder larvave te lepidoptereve (*Helicoverpa armigera*) , (*Spodoptera littoralis*), *Minueses* (*Tuta absoluta*), *Tripsit* (*Frankliniella occidentalis*)me , *Lyromiza spp.*, me doze 15.8-20 ml/dy. Sasi e solucionit sperkates 50-100 lit/dy.

Ne molle dhe dardhe kunder krimbit te molles (*Cydia pomonella*).); (ne fenofazen BBCH 71-89) doza e përdorimit 15.8-20 ml/dy, Sasi e solucionit sperkates 80-100 lit/dy.

Ne pjeshke dhe kajsi , kunder tenjes (*Cydia molesta*) dhe tripsit (*Frankliniella occidentalis*). (ne fenofazen BBCH 31-89) me doze 15.8-20 ml/dy. Sasi e solucionit sperkates 80-100 lit/dy.

Ne sallate, rukola dhe perime te tjera gjethore kunder larvave te lepidoptereve si, (*Spodoptera littoralis*) (*Helicoverpa armigera*) tripsit (*Frankliniella occidentalis*) (ne fenofazen BBCH 31-89) me doze 15.8-20 ml/dy. Sasi e solucionit sperkates 40-80 lit/dy.

Verejtje per përdorimin : Aplikohet me spërkatje gjethore, duke siguruar mbulim të plotë të pjesës së gjelbër të kulturës. Menaxhimi i rezistencës: - Ndiqni me përpikëri rekomandimet e prodhuesit;- Shmangni aplikimet e shumëfishta. Kryeni rotacion ose përzierjen me insekticide me mënyrë të ndryshme veprimi; aplikoni në fillim të infeksionit.Produkti i reziston shplarjeve nga rreshjet 4 ore pas trajtimit. Per te ritur shkallen e efikasitetit mund te kombinohet me vajra minerale ose adjuvant.

Përputhshmëria me produkte te tjera. - Gjatë përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohen karencat e produktit me priteshmeri me te gjate. Nëse ndodhin raste helmimi, informoni mjekun tuaj për përzierjen.

Ndikimi ne mjedis.Mesatarisht helmues per gjitarët. Mesatarisht helmues per zogjtë. Helmues per bletet, prandaj nuk duhet te trajtohet ne kohen e lulezimit dhe ne oret e mesdites kur eshte aktiviteti me i madh i bletes. Mesatarisht helmues per peshqit. Helmues per jovertobroret ujore.

Magazinimi : Ruajeni larg fëmijëve, në enën origjinale të mbyllur në një vend të thatë, të freskët dhe të ajrosur mirë, larg rrezeve të diellit. Mbajeni larg ushqimit, pijeve, ushqimit për kafshë, farave dhe plehrave. Mos kontaminoni produkte të tjera në depo ose në zonën e magazinimit kur trajtoni ose ruani këtë produkt. Shmangni burimet e nxehtësisë, rrezatimit, elektricitetit statik.**Karenca:** 14 ditë për hardhitë; 7 ditë për frutat farore dhe berthamore, 3 dite për domate, specat, patllixhanë, sallatë jeshile, rukola dhe perime te tjera gjethore.

Përgatitja e tretësirës së punës:

Shtoni sasinë e kërkuar të produktit në rezervuarin e spërkatësit në fillim të mbushjes së tij me ujë dhe shtoni sasinë e kërkuar të ujit, duke marrë parasysh sipërfaqen e kulturës që do të trajtohet. Mbani një lëvizje të vazhdueshme të rezervuarit gjatë përgatitjes së tretësirës së punës dhe trajtimit. Mos përgatitni më shumë tretësirë spërkatëse sesa është e nevojshme.

MENAXHIMI I REZISTENCËS

Strategjia e propozuar e menaxhimit të rezistencës për këtë formulim është qasja e integruar e menaxhimit të dëmtuesve. Strategjitë kryesore të menaxhimit të rezistencës që rekomandohen aktualisht janë:

- Ndiqni me përpikëri rekomandimet e prodhuesit dhe të IRAC;
- Shmangni aplikimet e shumëfishta. Rekomandohet rotacioni ose përzierja me insekticide me një mënyrë të ndryshme veprimi; kufizoni numrin dhe kohën e aplikimeve; aplikoni në fillim të sulmit dhe në dëmtuesit e ndjeshëm;

Respektoni dozën e autorizuar. Alternoni me metoda jo-kimike.

Kur është e mundur, duhet të përdoren së bashku disa strategji. Disa janë ende kryesisht teorike dhe nevojiten të dhëna të mëtejshme eksperimentale mbi sjelljen themelore gjenetike dhe epidemiologjike të

formave rezistente dhe mbi efektet e strategjive të ndryshme. Mos e aplikoni MILSAJ më shumë se një herë në vit.

KUJDES: Të gjitha rekomandimet e dhëna më sipër janë rezultat i një kërkimi të gjerë dhe të plotë. Megjithatë, një numër faktorësh përtej kontrollit tonë (përgatitja e përzierjes, aplikimi, klima, etj.) mund të ndikojnë në efekte. Kompania garanton përbërjen dhe formulën e produktit. Përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar (mungesë efikasiteti, toksicitet në përgjithësi, mbetje, etj.) për shkak të mosrespektimit të plotë ose të pjesshëm të udhëzimeve në etiketë.

Numri dhe data e regjistrimit: 57, datë 03.07.2026

Sasinë neto të PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri 5 liter

Numrin e serisë:

Data e prodhimit:

Afati i ruajtjes: 2 vjet

Llojin e ambalazhit bazë: COEX, HDPE

Emri dhe adresa e kërkuesi: LAINCO, S.A. Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona SPANJE

Emri dhe adresa e prodhuesit: LAINCO, S.A. Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona SPANJE

Linjat e prodhimit: LAINCO, S.A. Avda. De Bizet, 8-12 08191 Rubi Barcelona SPANJE