

KARATE ZEON 5 SC
PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE
“KLASA: 2”, Xn, Xi



“IDËMSHËM”, “IRRITUES”. I RREZIKSHEM PER MJEDISIN-N.

Frazat e rrezikut: **R22**-I demshem nese gelltitet. **R38**-Irritues per lekuren. **R43**- • Mund të shkaktoj reaksion alergjik në lëkurë. **R50/53**- Shumë toksike për organizmat ujorë me efekte afatgjata

Frazat e sigurise: **S2**-Ruajeni larg femijeve. **S13**-Ruajeni larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve te blegtorise. **S20/21**-Gjate punes mos hani dhe mos pini lengje ose duhan. **S35**-Ky material dhe ambalazhi i tij duhet te asgjesohen ne menyre te sigurt. **S36/37**-Vishni veshje mbrojtese dhe doreza te pershtatshme. **S57**-Perdorni paketim te pershtatshem per te evituar ndotjen e mjedisit.

KARATE ZEON 5 SC është një pirethrin sintetik, vepron nëpërmjet kontaktit dhe aparatit tretës, që kontrollon një numër të madh insektesh në doza të ulta. Paralelisht ul popullatat e këpushave tek pjeshka, vreshti, pambuku, perimet dhe shumë shpesh edhe tek molla.

Lënda vepruese: *Lambda cyhalothrin 5%*

Formulimi: *Concentrat i suspendueshem (SC).*

Pamja: *Leng me ngjyre kashte.*

Masat parambrojtëse:

- Evitoni kontaktin me sytë dhe lëkurën.
- Evitoni thithjen e pluhurit/tymit/gazit/mjegullës/avullit/aerosolit.
- Gjatë përdorimit mos hani dhe mos pini ujë e duhan.
- Të ruhet në vende të sigurta dhe larg fëmijëve.
- Të ruhet larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimëve për blegtorinë.
- Gjatë trajtimit vishni pajisjet mbrojtëse dhe i lani ato para se ti ripërdorni.
- Lani duart dhe pjesët e pambuluara të trupit para se të hani, të pini lëngje e duhan si dhe me përfundimin e spërkatjes.
- Lani pajisjet mbrojtëse pas përfundimit të punës.
- Shkatërroni ambalazhin bosh sipas rregullave në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Këshilla të përgjithshme:

- Merrni ambalazhin, etiketën apo SDS me vete kur thërrisni numrin e urgjencës, qendër e kontrollit të helmimeve ose mjekun, ose kur shkoni trajtim.
- Në rast se mirret me organet e frymëmarrjes , nxireni te aksidentuarin në vend të ajrosur mirë, nëse frymëmarrja është e çrregulluar ose ndaluar, stimuloni frymëmarrje artificiale. Mbani pacientin ngrohtë dhe në qetësi. Telefononi menjëherë mjekun ose qendrën e kontrollit të helmimeve.
- Në rast kontakti me lëkurën, hiqni menjëherë rrobat e ndotura, lani pjesët e trupit të kontaminuar me ujë të bollshëm e të pastër. Nëse acarim i lëkurës vazhdon, thërrisni mjekun. Lani rrobat e ndotura para se ti rivishni.
- Në rast kontakti me sytë i lani menjëherë me ujë të bollshëm e të pastër për të paktën 15 minuta. Hiqni lentet dhe kërkoni ndihmë mjekësore.
- Në rast gëlltitje kërkoni menjëherë këshillë mjekësore dhe i tregoni shishën ose etiketën. Mos provokoni të vjella.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik. Tel. Urgjence: +44 1484 538 444.
- Mos ndotni ujrë me preparatin ose me ambalazhin e tij.
- Pas trajtimit bletët duhet të qëndrojnë në koshere për një ditë duke u siguruar ushqim dhe ujë në koshere ose të largohen kosheret.
- Shumë toksike për pjalmuesit, insektet dhe marimangat e dobishme që përdoren në serra.
- Për të mbrojtur organizmat ujorë, lini një zonë mbrojtëse të patrajtuar prej 30 metrash nga ujërat sipërfaqësore për pemët frutore, 20 metrash për perimet dhe 10 metrash për kulturat e tjera

bujqësore.

- Për të mbrojtur artropodët jo objekt kontrolli, lini një zonë mbrojtëse të patrajtuar prej 10 metrash
- nga toka jo bujqësore për pemët frutore dhe 5 metrash për kulturat tjera bujqësore.
- E rrezikshme për bletët.
- Për të mbrojtur bletët dhe pjalmuesit e tjerë, mos e përdorni produktin në kulturat bujqësore gjatë lulëzimit të tyre ose gjatë lulëzimit të barërave të këqia.
- Hiqni ose shkatërroni barërat e këqia para lulëzimit të tyre. Mos e përdorni preparatin në kohën që bletët janë në aktivitet.

Përdorimi:

a) **kulturat bujqësore:** Pemë frutore, ulli, agrume, vresht, bimë të arave dhe perime.

b) **dëmtuesit:** Përdoret për kontrollin e insekteve që futen në rendet: *Coleoptera*, *Lepidoptera*, *Hemiptera*, *Diptera*, *Orthoptera* dhe *Thysanoptera*. Vepron nëpërmjet kontaktit dhe aparatit tretës.

c) **doza:** Zakonisht përdoret 20 ml preparat/100 lit ujë. Për kontrollin e buburecit të patates dhe tenjës së ullirit doza ulet në 15 ml preparat/100 lit ujë. Për kontrollin e pleshtit të dardhës doza rritet në 40 ml preparat/100 lit ujë. Doza më e lartë 40-50 ml preparat/100 lit ujë përdoret për kontrollin e krimbit të boçes dhe krimbit të kuq në pambuk dhe në perimet.

ç) sasia e tretësirës spërkatëse për 1 dynym:

Në pemët frutore, ulli, agrume dhe vreshta, në varësi me fazën e vegjetacionit, nga 100-200 lit. Në kulturat e tjera nga 50-100 lit.

Mënyra e përdorimit: Me spërkatje, gjatë së cilës duhet të sigurohet lagje e mirë bimëve (deri sa të fillojë të pikojë në tokë).

Koha e spërkatjes: Spërkatjet duhet të bëhen sapo të duken shënjat e para të infeksionit, ose sipas përvojës së agronomëve të zonës. Kohëzgjatja e veprimit në kushte infeksioni mesatar deri i madh zakonisht është 21 ditë.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik nëse përdoret me dozën e rekomanduar.

Verejtje për përdorimin:

Përzihet me sukses me insekticidet dhe fungicidet e zakonshme.

Ndikimi në ekosistem:

Mesatarisht helmues për bletët. KARATE i largon bletët. Mos spërkatni bimët, pjalmimi i të cilave varet nga bletët, 1 javë para lulëzimit. Helmues për peshqit. Mos ndotni pellgjet dhe rrugët e ujit me produktin, tepricat e tretësirës spërkatëse ose ambalazhin bosh.

Karenca:

Në perime, pemë frutore, vresht dhe agrume 7 ditë. Patate dhe grurë 1 ditë. Misër, sojë, pambuk dhe ulli 15 ditë. Lule dielli 21 ditë.

Magazini:

Preparati ruhet në ambalazhin original, në vende të ajrosura, pa lagështi dhe jo në kontakt me rrezet e diellit. Evitoni ruajtjen në temperatura mbi 35 ° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 87/1; date 14.11.2008.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: : nga 10 ml deri 1 L (PET); 25 ml (coex HDPE/PA); 25 ml (HDPE);

Data e prodhimit ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesëve të përcaktuara): 2 vjet;

Numri i partise së mallit (serise) ose shenja të tjera identifikuese ;

Tipi i ambalazhit baze: PET, HDPE/PA, HDPE

Emri dhe adresa e Aplikantit: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Basel, Switzerland.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: Syngenta Limited. **Adresa:** Fernhurst, Haslemere, Surrey, Angli.

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet në Republikën e Shqipërisë):

