

SIGNUM

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



GHS 09

“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”

SIGNUM është fungicid sistemik që përdoret kundër një numri të madh sëmundjesh të kulturave bujqësore. Bllokon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit si dhe sporifikimin e patogjeneve. Ka veprim parambrojtës.

Lënda vepruese: 26.7 % Boscalid (BAS 510 F)+6.7 % Pyraclostrobin (BAS 500 F);

Formulumi: Granula të dispergueshme në ujë (WG).

Masat parambrojtëse:

Deklarata rreziku

EUH401:Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit, në përpuethshmëri me instruksionet për përdorim.

P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.

P102: Mbajeni në vende të sigurt, larg fëmijëve.

P103: Lexoni etiketën para përdorimit.

P391 Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet.

P501: Shkatërroni ose largoni përmbajtjen/ambalazhin në përputhje me rregullat në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Nëse je ekspozuar dhe je i shqetësuar: Largojeni personin në ajër të pastër dhe vendoseni në pozicion që të marrë frymë lirisht. Dërgojeni të dëmtuarin në qendrën spitalore më të afërt, tregojini mjekut etiketën e produktit. Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik

Perdorimi:

Nr.	Kultura	Sëmundjet	Doza kg/ha	Vëllimi solucionit	Nr. trajtimeve	Karenca/ditë
1.	Vresht	<i>Hiret, kalbezimet</i>	1.5	400-1000	2-3	14
2.	Sallatë	<i>Botrytis spp., Sclerotinia spp.</i>	1.5	500	2	14
3.	Karrotë	<i>Alternaria spp., hiri</i>	0.75	400	2	28
4.	Lakër	<i>Alternaria, Sclerotinia, Botrytis</i>	1	300	3	14
5.	Domate	<i>Leveillula spp., Botrytis</i>	1.5	1000	3	3
6.	Spec	<i>Leveillula spp., Botrytis</i>	1.5	1000	3	3
7.	Presh, qepë	<i>Stemphilium, Cladosporium, Phytophthora</i>	1.5	300	3	14
8.	Pemë frutorë	<i>Monilia, hiret</i>	0.75	1000	3	7
9	Luleshtrydhe	<i>Hiri, Botrytis</i>	1.8	1000	2	7

Vërejtje për përdorimin:

Përzihet me shumicën e fungicideve, insekticideve, akaricideve, rregullatorët e rritjes dhe ushqimeve gjethore. Nuk përzihet me lëngun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

Ndikimi ne mjedis:

Nuk është helmues për bletët. H400: Shumë toksik për gjallesat ujore. H410: Shumë toksik për jetën ujore duke

shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos ndotni ujrat dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Karenca:

Sipas tabelës së mësipërme.

Magazini:

Ruhet në vënde të errta, të fresketa dhe në ambalazh origjinal.

Nr dhe data e regjistrimit: Nr. 141, datë 12.02.2008;

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 kg.

Bar kodi përkatës ;

Data e prodhimit:Printuar nga makineria në ambalazh ;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 5 vjet;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: Printuar nga makineria në ambalazh .. ;

Tipi i ambalazhit bazë: Material i papershkueshëm nga lagështia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH. **Adresa:** Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH.. **Adresa:** Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani.