SIGNUM

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE



GHS 08 GHS 09

"*Lexo fletëudhezuesin para përdorimit*"

SIGNUM është fungicid sistemik që përdoret kundër një numri të madh sëmundjesh të kulturave bujqësore. Bllokon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit si dhe sporifikimin e patogjeneve. Ka veprim parambrojtës.

Lënda vepruese: *26.7 % Boscalid (BAS 510 F)+6.7 % Pyraclostrobin (BAS 500 F);*
Formulumi: *Granula të dispergueshme në ujë (WG).*

Masat parambrojtëse:
Deklarata rreziku
H361d: Dyshohet se ose mund të dëmtojë riprodhueshmërinë dhe fetusin e palindur. H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.
H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.
H410: Shumë toksik për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
EUH401:Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit, në përpuethshmëri me instruksionet për përdorim.

Deklarata parandaluese (Parandalimi)
P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.
P102: Mbajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve.
P103: Lexoni etiketën para përdorimit.
P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.
P202: Mos trajto derisa të keni lexuar dhe
kuptuar masat e sigurisë.
P280: Vishni doreza mbrojtëse/ veshje
mbrojtëse/ pajisje mbrojtëse për fytyrën/
pajisje mbrojtëse për sytë.
P391 Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet.
P501: Shkatërroni ose largoni përmbajtjen/ambalazhin në përputhje me rregullat në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:
P308+P313 Nëse je ekspozuar dhe je i shqetësuar: Largojeni personin në ajër të pastër dhe vendoseni në pozicion që të marrë frymë lirisht. Dërgojeni të dëmtuarin në qendrën spitalore më të afërt, tregojini mjekut etiketën e produktit. Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik

Deklarata parandaluese (Ruajtja)
P405: Mbajeni të kyçur.

Perdorimi:

Nr.	Kultura	Sëmundjet	Doza kg/ha	Vëllimi solucionit	Nr. trajtimeve	Karenca/ ditë
1.	Vresht	*Hiret, kalbezimet*	1.5	400-1000	2-3	14
2.	Sallatë	*Botrytis spp., Sclerotinia spp.*	1.5	500	2	14
3.	Karrotë	*Alternaria spp., hiri*	0.75	400	2	28
4.	Lakër	*Alternaria, Sclerotinia, Botrytis*	1	300	3	14

5.	Domate	*Leveillula spp., Botrytis*	1.5	1000	3	3
6.	Spec	*Leveillula spp., Botrytis*	1.5	1000	3	3
7.	Presh, qepë	*Stemphilium, Cladosporium, Phytophora*	1.5	300	3	14
8.	Pemë frutorë	*Monilia, hiret*	0.75	1000	3	7
9	Luleshtrydhe	*Hiri, Botrytis*	1.8	1000	2	7

Vërejtje për përdorimin:
Përzihet me shumicen e fungicideve, insekticideve, akaricideve, rregullatorët e rritjes dhe ushqimeve gjethore. Nuk përzihet më lëngun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline.

Fitotoksiciteti:
Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

Ndikimi ne mjedis:
Nuk është helmues për bletët. H400: Shumë toksik për gjallesat ujore. H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos ndotni ujrat dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Karenca:
Sipas tabelës së mësipërme.

Magazinimi:
Ruhet në vënde të errta, të fresketa dhe në ambalazh origjinal.

Nr dhe data e regjistrimit: Nr. 141, datë 12.02.2008;
Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 kg.
Bar kodi përkatës.....;
Data e prodhimit: .....Printuar nga makineria në ambalazh .....;
Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 5 vjet;
Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: Printuar nga makineria në ambalazh .. ;
Tipi i amballazhit bazë: Material i papershkueshëm nga lagështia.
Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH**. Adresa:** Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani.
Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH**.. Adresa:** Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani.