STOMP AQUA

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



GHS 07 GHS08 GHS 09

"Lexo fletëudhësuesin para përdorimit"

STOMP AQUA eshte herbicid selektiv, me veprim sistemik, i para dhe pas mbirjes se hershme, për kontrollin e një spektri të gjërë të barërave të këqia gjethengushta dhe shumë barërave gjethegjëra në shume kultura bujqesore. Vepron përmes thithjes prej gjetheve dhe rrënjëve. Vepron tek bimët e b. këqia menjëherë pas bulëzimit ose daljes mbi tokë.

Përmban: *455 gr/lit Pendimethalin (lende vepruese e paster).*

Formulimi: *Capsula te suspendueshme (CS).*

Masat parambrojtëse:
Mbajeni ne vende te sigurta dhe te paarritshme nga fëmijët.
Ruajeni ne vende te thata dhe te freskëta, larg ushqimeve dhe pijeve për njerëzit si dhe ushqimeve për blegtorinë.
Evitoni kontaktin e produktit me lëkurën dhe sytë.
Gjate punës mos hani dhe mos pini lëngje e duhan.
Para fillimit të punës vishni rrobat e punës dhe pajisjet mbrojtëse për sytë e fytyrën (doreza, syza, skafandër, maskë, etj.).
Lani duart dhe pjesët e ekspozuara të lëkurës me uje dhe sapun.
Pas përfundimit të punës lani te gjitha pajisjet

Deklaratat e rrezikut
H317: Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës.
H361d: Dyshohet se ose mund të dëmtojë riprodhueshmërinë dhe fetusin e palindur.
H411: Toksik për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
EUH401: Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit, në përputhshmëri me instruksionet për përdorim.

Deklarata parandaluese (Parandalimi)
P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.
P102: Mbajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve.
P103: Lexoni etiketën para përdorimit.
P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.
P202: Mos trajto derisa të keni lexuar dhe kuptuar masat e sigurisë.
P261: Shmangni thithjen e pluhurit / tymit / gazeve / mjegullës / avujve / solucionit gjatë frymëmarrjes.
P272: Veshjet e kontaminuara të punës nuk duhet të lejohen jashtë vendit të punës.
P280: Vishni doreza mbrojtëse/ veshje mbrojtëse/ pajisje mbrojtëse për fytyrën/ pajisje mbrojtëse për sytë.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese (Reagimi)
Përmban Pendimethalin. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.
Në rast marrje me organet e frymëmarrjes, nxirreni të aksidentuarin në ajër të pastër.
Në rast kontakti me sytë: shplajini ata me ujë të bollshëm.
Në rast se produkti është gëlltitur, mos shkaktoni të vjella. Shpëlani menjëherë gojën.
Nëse i aksidentuari ka dëmtime serioze, kërkoni ndihmë mjekësore ne qendrën spitalore më të afërt duke I treguar mjekut etiketën e preparatit.

Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi sipas simptomave
P302+P352: NË RAST KONTAKTI NË LËKURË : Lajeni me ujë të bollshëm.
P308+P313: NËSE JE EKSPOZUAR DHE JE I SHQETËSUAR: Merrni këshilla / kujdes mjekësor.
P333+P313: Në rast irritimi ose skuqje të lëkurës: Merrni këshilla / kujdes mjekësor.
P362+P364: Hiqni veshjet e ndotura dhe lani veshjet e ndotura para ripërdorimit.
P391: Mblidhni rrjedhjet.
Deklarata parandaluese (Ruajtja)
P405: Mbajeni të kyçur.
Deklarata parandaluese (Shkatërrimi)
P501: Shkatërroni ose largoni përmbajtjen /ambalazhin në përputhje me rregullat në fuqi.

Përdorimi:
Përdoret pas mbirjes për kontrollin e barërave të këqia në shume kultura bujqesore si: perime (Qepe, asparag, karrote, laker, patellxhan, spec), luledielli, miser, patate, duhan, fasule, soje, vresht, bime zbukuruese. Trajtohet kur barërat e këqia janë të reja dhe në ritje intensive.
Përdoret me 0.4-2 lit preparat, në 200-400 lit tretësirë spërkatëse për ha. Përdoret vetëm 1 herë gjatë të njëjtit sezon.
Ka spektër të gjërë veprimi. Kontrollon:
- ***Barëra të këqia gjethengushta:*** bisht dhelpra (*Alopecorus ssp.*), *Agrostis gigantea, Apera spica-venti,* loliumi *(Lolium ssp.), Echinochloa ssp., Panicum ssp*., sorgumi *(Sorghum ssp.), Poa ssp.*
- ***Barëra të këqia gjethegjëra:*** *Adonis ssp., Amaranthus ssp.**,** Anagallis arvensis, Anthemis ssp., Aphanes arvensis, Atriplex ssp., Bifora radians, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chepalaria ssp, Chenopodium album, Chrysanthemum ssp., Cirsium arvense, Emex australis, Erophila verna, Galeopsis ssp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Galium tricornotum, Helianthus annuus, Lamium ssp, Malva ssp.,*

Matricaria spp., *Medicago ssp, melilotua ssp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonium ssp., Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rapistrum rugosum, Rumex ssp., Senecio vulgaris, Silene gallica, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Sonchus ssp., Spergula arvensis, Stellaria media, Trifolium ssp., Vicia ssp., Viola ssp.*

Vërejtje për përdorimin:
Kerkon toke te pergatitur e te niveluar mire, me lageshti; mbjellje uniforme te fares, ne thellesi 3-4 cm; per kulturat e trapiantuara (perimet, etj.) kryhet trajtim uniform duke e shoqeruar me vaditje ne forme shiu, 7-8 dite para trapiantimit pas se cilit kryhet nje vaditje tjeter e lehte.
Vepron kryesisht nëpërmjet gjetheve. Në kushtet e tokës me lagështi, lufton edhe barërat e këqia që janë në mbirje. Efektiviteti më i lartë arrihet kur barërat e këqia trajtohen në fazat e hershme të zhvillimit dhe kur janë në rritje intensive.

Fitotoksiciteti:
Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat e rekomanduara në të lashta. Kultura pasardhese mund te mbillet 6 muaj pas trajtimit.

Ndikimi në ekosistem:
H400: Shumë toksik për gjallesat ujore. H410: Shumë toksik për gjallesat ujore, duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni paisjet e punës në afërsi të ujërave sipërfaqësore. Shmangni kontaminimin përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.
Për të mbrojtur organizmat ujore respektoni një rrip sigurie prej 20 m të pa trajtuar nga kanalet e ujërave sipërfaqësore. Për të mbrojtur bimët që nuk janë objekt i trajtimit, respektoni një brez mbrojtës prej 5 m nga zona e trajtuar.

Ruajtja dhe magazinimi:
Ruhet në vende të thata, të ajrosura, larg rrezeve direkte të diellit, në temperatura deri 35° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 543, date 14.6.2013.
Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 lit.
Data e prodhimit ..... ;
Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 5 vjet;
Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese..... ;
Tipi i amballazhit baze: shishe HDPE.
Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agro BV. **Adresa:** Zyrih, Zvicër.
Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: BASF Agro BV. **Adresa:** Arnhem (NL), Zyrih, Zvicër.
Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise): ...